



エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV感染者の調査研究

平成25年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

研究班の構成

班長	白 阪 琢 磨	国立大阪医療センター
班員	岡 慎 一	国立国際医療研究センター
	川 戸 美由紀	藤田保健衛生大学
	橋 本 修 二	藤田保健衛生大学
	日 笠 聡	兵庫医科大学
	福 武 勝 幸	東京医科大学
	八 橋 弘	国立長崎医療センター

目 次

はじめに

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目的	1
第2章 結果の概要	2
1. 臨床・日常生活の現状	2
2. 治療の現状	6
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討	10

第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法	19
1. 集計の対象者	19
2. 集計の基礎資料	19
3. データの取り扱い	19
4. 結果表の作成方法	20
5. 集計結果を見る上での注意	24
第4章 結果表	27
1. 臨床・日常生活・治療の現状	27
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移	46
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）	61
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）	71
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）	81
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）	91
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連	101
8. AIDS発病・死亡と臨床・治療状況との関連	116

第Ⅲ部 資料

1. 対象者用健康状態報告書	127
2. 日常報告書	131

はじめに

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進展しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることも可能となった。また、これらの進展は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いわば「管理可能な慢性疾患」に近づきつつあるといえるが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることによって、これまでとは別の課題も表面化してきている。以前にもまして、臨床、日常生活と治療の現状や推移を的確に把握し、治療法変更の影響や AIDS 発病の関連要因の検討などを通して、HIV 感染者の QOL 向上を目指すことの重要性が大きくなってきている。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている（厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書）。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

本報告書は平成 25 年度までの本事業により集積された情報に基づいて、臨床・日常生活・治療の現状および推移を示したものである。肝炎の現状や治療法変更の影響の検討も試みている。「第Ⅰ部 目的、結果の概要」、「第Ⅱ部 集計方法、結果表」と「第Ⅲ部 資料」の 3 部から構成されている。第Ⅰ部には目的と結果の概要を示している。ここでは、本報告書の概要を理解したい読者を想定し、コンパクトかつ視覚的に提示することに留意した。第Ⅱ部には本報告書をより詳細に理解したい読者のために、詳細な集計方法を示すとともに、集計結果のすべてを結果表として提示した。第Ⅲ部には事業への報告書を資料として添付した。HIV 感染者やその家族、医師や医療関係者、行政関係者、研究者などの今後の活動において、本報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目 的

第2章 結果の概要

1. 臨床・日常生活の現状
2. 治療の現状
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

第1章 目 的

抗 HIV 治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることに伴って、HIV 感染者の QOL 維持・向上において、臨床・日常生活・治療の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」(以下、本事業)は、血液製剤による HIV 感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成 5 年度から開始され、その対象者は血液製剤による HIV 感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。なお、AIDS を発病すると、本事業の対象から外れることになる。

研究目的は、血液製剤による HIV 感染者において、臨床・日常生活・治療についての平成 25 年度の現状および平成 5～25 年度の推移を明らかにすることにある。臨床状況としては CD4 値、CD4/CD8 比、HIV-RNA 量、および、肝炎の状況などである。日常生活状況としては身体状況と日常生活動作などである。治療状況としては、抗 HIV 薬の併用状況、服用状況と副作用とともに、ニューモシスチス肺炎予防薬の投与と眼底検査実施の状況などである。

HIV 感染者において、抗 HIV 治療法変更の影響、AIDS 発病の関連要因などが注目されていることから、これらの課題の検討を試みる。

第2章 結果の概要

平成25年度事業対象者は528人であった。25年度の開始者は2人、AIDS発病・死亡などに伴う中止者は7人であった。5～25年度では、事業対象者の実人数は945人であり、AIDS発病・死亡などに伴う中止者が421人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 臨床・日常生活の現状」、「2. 治療の現状」と「3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

1. 臨床・日常生活の現状

平成25年度第4期（26年1～3月）事業対象者528人において、CD4値、HIV-RNA量、身体状況と日常生活動作および肝炎の状況を観察した。なお、第4期データが未報告の場合、第1～3期のものを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、23年度と24年度の第4期の結果を付記）。CD4値は200／ μ l未満が8%、200～350未満が19%、350～500未満が27%、500以上が46%であった。HIV-RNA量は400コピー／ml未満が95%を占め、その中で、50未満（検出限界50以下）が91%であり、10,000以上は1%であった。23・24年度の結果と比べて、CD4値は500以上が、HIV-RNA量は50未満が顕著な増加であった。

図2-1-3～4にCD4値別、身体状況と日常生活動作の良い者の割合を示す（表4-1-18～19を参照）。なお、身体状況の良い者とは食欲や疲れなどの13項目の平均が「どちらともいえない」よりも良い状態であり、日常生活動作の良い者とは「全く健康」または「軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる」である（「第3章 集計方法」を参照）。身体状況の良い者の割合は64%、日常生活動作の良い者の割合は52%であった。日常生活動作の良い者の割合はCD4値が200未満で低い傾向であった。

図2-1-5～6に肝炎ウイルスと肝炎の状況を示す（表4-2-1～2を参照、23年度と24年度の第4期の結果を付記）。HCV抗体陽性は91%であった。肝炎の状況としては、肝がんが2%、肝硬変が12%、慢性肝炎が53%に見られた。23・24年度の結果と比べて、肝がんと肝硬変が若干の増加であった。

以上、CD4値とHIV-RNA量の良好な状態にある者が多かったが、身体状況と日常生活動作の良好な状態にある者はそれほど多くなかった。肝がんや肝硬変が一部に見られ、慢性肝炎が多かった。

図2-1-1. CD4値の分布（平成23～平成25年度第4期事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（平成23～平成25年度第4期事業対象者）




図2-1-3. CD4値別、身体状況（平成25年度第4期事業対象者）

身体状況

良い者の割合
(%)




図2-1-4. CD4値別、日常生活動作（平成25年度第4期事業対象者）

日常生活動作

良い者の割合
(%)




図2-1-5. 肝炎ウイルスの状況（平成25年度第4期事業対象者）





図2-1-6. 肝炎の状況（平成23～平成25年度第4期事業対象者）



2. 治療の現状

平成25年度第4期事業対象者において、抗HIV薬の併用区分、服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査の状況を観察した。図2-2-1にCD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照）。抗HIV薬の併用区分としては、「INSTI」（RALを含む薬剤の組み合わせ）が45%と最も多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が22%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が17%、それ以外の投与状況が10%であった。投与なしは過去の投与歴なしが5%、過去の投与歴ありが2%であり、合計で7%であった。CD4値が350未満の者とHIV-RNA量が50未満の者では「INSTI」が多い傾向であった。なお、投与歴なしは本事業の対象者となった時点以降に抗HIV薬の投与がないことを指し、それ以前の投与ありが一部含まれている可能性がある。

図2-2-2に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の組み合わせは多種多様であったが、その中で、7組が10人以上に投与され、投与者全体の47%を占めていた。

「NRTI2剤+NNRTI」ではTDF+FTC+EFVが41人、「INSTI」ではTDF+FTC+RALが84人と3TC+ABC+RALが56人と多く、これら3つの組み合わせが181人（投与者全体の37%）であった。RALを含む組み合わせ、または、1日1回投与の組み合わせが多かった。なお、この併用区分は各期間内に投与された薬剤に基づくものであり、同時併用と異なるケースも若干含まれることに注意を要する。

図2-2-3～4に抗HIV薬の併用区分別、服用状況と副作用を示す（表4-1-7～8を参照）。「全部服用」の割合が97%と高く、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」ごとにみても同様に高い状況であった。副作用としては、リポジストロフィーが多く、それ以外は「NRTI2剤+PI1・2剤」の下痢の6%と黄疸の5%などであった。なお、副作用は各期間またはそれ以前に投与された薬剤に基づくものであり、投与中の薬剤によらないもの（副作用によって薬剤が変更される場合など）が含まれることに注意を要する。図2-2-5にCD値別、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を示す（表4-1-12～13を参照）。CD4値が200未満では、ニューモシスチス肺炎予防薬が25%に投与されていた。

以上、抗HIV薬の様々な組み合わせが投与されているものの、いくつかの組み合わせに集中していた。服薬状況はきわめて良好であったが、一方、リポジストロフィーなどの副作用もみられた。最新の知見に基づく適切な治療がおおむね実施されているように思われる。HIV-RNA量とCD4値、服用状況と副作用に留意しつつ、「抗HIV治療ガイドライン（2014年3月）」（平成25年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）による「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班」）を参考にして、一層の適切な治療へ向かうことを望みたい。

図2-2-1. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成25年度第4期事業対象者）







図2-2-2. 抗HIV薬の併用の主な組み合わせ（平成25年度第4期事業対象者）



* 10例以上のみ表示


図2-2-3. 抗HIV薬の併用区分別、服薬状況（平成25年度第4期事業対象者）



抗 HIV 薬の併用区分

図2-2-4. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成25年度第4期事業対象者）

ありの割合（％）



ありの割合（％）





図2-2-5. CD4値別、ニューモシスチス肺炎(PCP)予防薬と眼底検査(平成25年度第4期事業対象者)



3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

平成5年度第4期当初の事業対象者417人と9年度第1期当初の事業対象者605人において、[図2-3-1～2](#)にAIDS発病・死亡者数の推移を示す。AIDS発病・死亡者数は5～8年度に多かったが、9年度以降に著しく減少し、さらに23～25年度で減少傾向がみられた。

[図2-3-3～6](#)にCD4値とHIV-RNA量の推移を示す（[表4-5-1、5](#)を参照）。CD4値の中央値について、AIDS未発病の生存者では、9～13年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいであったが、最近に上昇傾向がみられた。AIDS発病・死亡者を最悪値とみて含めると、CD4値の中央値は14～17年度に低下傾向、その後ほぼ横ばいであった。CD4値350以上の割合もほぼ同様の傾向であった。HIV-RNA量の中央値は9年度第1期以降急激に低下し、11年度第3期から400未満（検出限界以下）であった。400未満の割合は上昇を継続しており、AIDS未発病の生存者では90%以上であった。[図2-3-7～8](#)に身体状況と日常生活動作の推移を示す（[表4-5-3～4](#)を参照）。身体状況と日常生活動作の良い者の割合は9年度から低下したが、AIDS未発病の生存者では14～16年度以降に横ばいまたは若干の低下傾向であった。

[図2-3-9](#)に抗HIV薬の併用区分の推移を示す（[表4-5-6](#)を参照）。「NRTI2剤+PI1・2剤」の割合は11年度まで急激に上昇した。その後は低下と上昇を経て、最近、再び低下傾向であった。

「NRTI2剤+NNRTI」の割合は15年度まで急激に上昇したが、その後、ほぼ横ばい傾向であった。最近、「INSTI」の割合が急激な増加を継続し、24年度には最も多くなった。[図2-3-10](#)に9年度第2期～24年度第3期の間で抗HIV薬の併用区分が変更された主なケース（変更なしは参考）について、変更前後のCD4値の中央値を示す（[表4-6-2](#)を参照）。CD4値の中央値は、「投与なし（投与歴なし）」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により100程度の上昇、「投与なし（投与歴あり）」と「NRTI2剤」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により50程度の上昇が見られた。また、「NRTI2剤+PI1・2剤」からの変更は「NRTI2剤」からの変更に比べてCD4値の良い状況で変更されていた。[図2-3-11](#)に観察当初のCD4値別、非発病生存割合を示す（[表4-8-1](#)を参照）。観察当初のCD4値別の非発病生存割合をみると、16年度以降の低下が比較的類似していた。

以上、最近、CD4値とHIV-RNA量の改善が進み、身体状況と日常生活動作の悪化に鈍化傾向がみられ、また、AIDS発病・死亡はやや減少傾向であった。抗HIV薬の併用区分として、最近「INSTI」が急激に増加し、「NRTI2剤+PI1・2剤」を超えて最も多くなった。抗HIV薬の変更とCD4値の変化との間には強い関連性が示唆された。今後、さらに推移観察を継続するとともに、推移の関連要因の検討を進めることが重要であろう。

図2-3-1. AIDS発病・死亡者数の推移（平成5年度第4期事業対象者）


AIDS 発病・
死亡者数

図2-3-2. AIDS発病・死亡者数の推移（平成9年度第1期事業対象者）


AIDS 発病・
死亡者数

図2-3-3. CD4 値の中央値の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-4. HIV-RNA量の中央値の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-5. CD4値350以上の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-6. HIV-RNA量400未満の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-7. 身体状況の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-8. 日常生活動作の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-9. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-10. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）





図2-3-11. 観察当初のCD4値別、非発病生存割合（平成9年度第1期事業対象者）

非発病生存割合



第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法

1. 集計の対象者
2. 集計の基礎資料
3. データの取り扱い
4. 結果表の作成方法
5. 集計結果を見る上での注意

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連
8. AIDS発病・死亡と臨床・治療状況との関連

第3章 集計方法

1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～25年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、9年度以降はその制限がなくなっている。また、AIDSを発病すると、本事業の対象から外れることになる。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。5～25年度に一度でも本事業の対象になった実人数は945人である。その中で、5年度に本事業の対象となった者が48%、6～9年度が8～12%、10～16年度が1～3%、17～25年度が1%未満であった。本事業の中止者は421人であり、中止理由のほとんどはAIDS発病・死亡に伴うものである。その中で、8年度末までの中止者が177人であり、42%を占めている。25年度第4期での本事業対象者は528人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（AIDS既発症者と死亡者を除く）は2013年5月時点で580人とされており、その91%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は5～25年度に本事業対象者から提出された調査票である。調査票には「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」があり、いずれも四半期ごとに提出される（「日常報告書」は5～8年度には毎月提出された）。

「対象者用健康状態報告書」の主な項目は、年齢、CD4値、CD4/CD8比、抗HIV薬の投与状況などである。9年度以降にはHIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用などが追加されている。肝炎ウイルスと肝炎に関係する項目は14年度以降に順次拡充されている。抗HIV薬の投与状況としては5～8年度ではAZTとddlを挙げて、それ以外は薬剤名を記入する方式になっていた。9年度以降では抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名を追加し、それ以外は薬剤名を記入する方式となっている（記入された薬剤名もすべて計上した）。副作用としては14年度には中枢神経症状とリポシトロフィー（13年度までは「その他」に含む）、16年度にはすべての副作用の有無が追加された。

「日常報告書」の主な項目は、体重、身体状況、日常生活動作などである。身体状況と日常生活動作は5～8年度と9年度以降で一部変更がある。25年度の「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」を「第Ⅲ部 資料」に付けた。

3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化した。CD4値のカテゴリーは200未満、200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。臨床・日常生活・治療の現状の集計（「4. 結果表の作成方法」を参照）では、HIV-RNA量について、最近の検査法の検出限界50を考慮して、400未

満を、検出せず、50未満と50～400未満に細分した。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」に区分した。投与ありについては、「NRTI1剤」、「NRTI2剤」、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」と「その他」に区分した。「NRTI2剤+PI1・2剤」とはNRTI2剤とPI1剤または2剤とした。「NRTI2剤+NNRTI」とはNRTI2剤とNNRTI1剤とした。「INSTI」とはRALを含む薬剤の組み合わせとした。なお、コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

身体状況は食欲や疲れなどの項目からなり、5～8年度では11項目、9年度以降では13項目である。各項目は「とてもある」などから「全くない」などまでの5段階の選択肢であり、項目ごとに好ましい選択肢から順に「1」～「5」までのスコアを与えた。また、項目全体の総合スコアとして、項目全体の平均スコアを算出し、1～2未満、2～3未満、3～4未満、4～5の4カテゴリーまたは1～3未満とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、総合スコアのCronbachの α 係数は9年度第1期～第4期で0.90～0.91であり、高い内的整合性を示した。総合スコアの4カテゴリーは9年度第1期と第2期の κ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者451人）が0.80（重み付き κ 係数0.84）であり、高い再現性を示した。

日常生活動作は5～8年度では「無症状で、通常の活動が可能」から「過去1か月間、日中の半分以上、床上安静生活を行った」までの4段階の選択肢であり、9年度以降では「全く健康」から「重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある」までの8段階の選択肢である。好ましい選択肢の順に「1」からスコアを与え、1、2、3、4以上の4カテゴリーまたは1・2とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、この4カテゴリーは9年度第1期と第2期の κ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者420人）が0.87（重み付き κ 係数0.91）であり、高い再現性を示した。

4. 結果表の作成方法

本集計は7つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も7つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

（1）臨床・日常生活・治療の現状

本集計は本事業対象者の臨床・日常生活・治療の現状把握を目指したものである。集計対象者は25年度第4期の事業対象者528人とした。基礎資料は同時点（最新）のものとし、抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量が未報告の場合、第1～3期の最も新しい時点に変更した（表3-4-1）。集計対象項目は基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、抗HIV薬の投与・服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬、眼底検査、体重、身体状況と日常生活動作のすべてを取り上げた。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した（表4-1-1～2）。CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した（表4-1-3～4）。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した（表4-1-5）。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した（表4-1-6）。抗HIV薬の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。また、CD4値別に、ニューモシスチス肺炎予防薬と

眼底検査を集計した（表4-1-12～13）。

体重、身体状況、日常生活動作はCD4値別に基礎統計量を示した（表4-1-14）。身体状況と日常生活動作は年齢別の分布（表4-1-15～16）を示した。CD4値と抗HIV薬の併用区分別に、体重、身体状況と日常生活動作の分布（表4-1-17～19）を示した。CD4値別または抗HIV薬の併用区分別に、身体状況の各項目を集計した（表4-1-20～21）。疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、高血圧・糖尿病）を集計した（表4-1-22）。

（2）臨床（肝炎関連）の現状と推移

本集計は本事業対象者の臨床（肝炎関連）の現状と推移の把握を目指したものである。現状の把握では、集計対象者は25年度第4期の事業対象者とし、基礎資料は最新のもので「(1)」と同じとした。推移の把握では、集計対象者は17年第1期当初（17年4月1日）の事業対象者629人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。集計対象項目は肝炎の状況、肝炎ウイルス（HBs抗原、HCV抗体、HCV-RNA定性、HCV-RNA定量）、血小板数と総ビリルビン、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植、および、インターフェロン製剤等の現在の投与状況とし、それ以外にCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況などを取り上げた。

肝炎関連の現状として、肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-2-1～2）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-2-3）。肝炎の状況別に、HCV-RNA定量検査の実施状況、HCV-RNA定量、血小板数、ALT(GPT)と総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、AFP、クレアチニンの分布を示した（表4-2-4～12）。肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植歴、インターフェロン製剤等の現在の投与状況の分布を示した（表4-2-13～15）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、抗HIV薬、身体状況、日常生活動作の分布を集計した（表4-2-16～21）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分を組み合わせて集計した（表4-2-22）。

肝炎関連の推移として、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-23）。観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況のそれぞれ別に、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-24～26）。

（3）臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本集計は各時点の本事業対象者の臨床・日常生活・治療状況の把握を目指したものである。集計対象者は各時点の事業対象者とし、各時点の基礎資料を用いた。結果表には5～22年度の各第1期と23～25年度の各四半期の結果を示した。CD4値、CD4/CD8比は各時点の分布と中央値を示した（表4-3-1～2）。身体状況は総合スコアの各時点の分布と割合（スコア1～3未満の割合）を示した（表4-3-3）。日常生活動作は各時点の分布と割合（スコア1と2の割合）を示した（表4-3-4）。また、HIV-RNA量は各時点（平成9年度以降）の分布と中央値を示した（表4-3-5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-3-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は各時点（平成9年度以降）の分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-3-7～8）。

この集計では、各時点の事業対象者に出入りがあることに注意を要する。また、身体状況と日常生活動作では5～8年度と9年度以降で調査内容が異なる。

（4）臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象

者は5年度第4期当初（6年1月1日時点）の事業対象者417人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には5年度第4期、6～22年度の各第1期と23～25年度の各四半期の結果を示した。なお、観察開始を5年度第4期としたのは、より長い期間の推移を観察することを目指し、事業対象者がある程度の人数になった時点を選んだものである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-4-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-4-7～8）。HIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用は9年度以降である。

本集計対象者にはAIDS発病・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、AIDS発病・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。AIDS発病・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。AIDS発病・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。AIDS発病・死亡の割合は、測定値の不明者を除くと、15年度以降では40％程度以上と大きいことから、中央値と割合の精度が高くないことに注意を要する。なお、集計対象者および中央値の計算方法が異なる以外は「(3)」の集計方法と同じである。

(5) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者605人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には9～22年度の各第1期と23～25年度の各四半期の結果を示した。9年度第1期としたのは、その時点で調査項目の大幅な変更（HIV-RNA量などの追加、身体状況などの項目の変更）があったためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-5-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-5-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-5-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。一方、AIDS発病・死亡の割合は25年度第4期でも40％未満程度であることから、「(4)」と異なり、AIDS発病・死亡を含めた場合の中央値と割合の精度はそれほど低くない。

(6) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本集計は、同一集団の臨床・日常生活・治療状況について、最近の推移把握を目指したものである。集計対象者は19年度第1期当初（19年4月1日時点）の事業対象者601人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。19年度第1期としたのは、最近の抗HIV治療の進展を考慮したためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-6-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-6-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-6-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」と「(5)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。

(7) 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本集計では、抗HIV薬の併用区分・併用薬剤の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連について検討を試みた。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。

9年度第2期～25年度第4期までの時点ごとに、前の時点と当該時点の抗HIV薬の併用区分の組み合わせ別に該当する人数を集計した（表4-7-1）。また、9年度第2期～25年度第3期に生じた抗HIV薬の併用区分の変更状況別の延べ対象者について、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」のCD4値とHIV-RNA量の中央値を算定するとともに、「前の時点」と「後の時点」の間の差を符号付きWilcoxon検定により検定した（表4-7-2～3）。「前の時点」におけるCD4値が500未満の者、HIV-RNA量が400以上の者に限定した集計、および、3期間（9～13年度、14～18年度、19～25年度）別の集計も行った。同様に、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」における服用状況、副作用、身体状況、日常生活動作について集計した（表4-7-4～7）。なお、HIV-RNA量について、中央値の算定では、検出限界の検査結果は検出限界区間の半分（400未満では200、50未満では25など）とし、また、検出せずの検査結果は0とした。

集計対象について詳しく説明する。たとえば、9年度第2期において、抗HIV薬の併用区分が「NRTI2剤」であって、かつ、その前の時点（9年度第1期）のそれが「投与なし（投与歴あり）」であれば、抗HIV薬の併用区分の変更は「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に分類され、また、「前の時点」が9年度第1期、「その時点」が第2期、「後の時点」が第3期となる。本集計では「延べ対象者」と呼んでいるが、これは、たとえば「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」の者が「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に2人、「NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）」に1人と数えられるためである。なお、「NRTI2剤+PI1・2剤→NRTI2剤+PI1・2剤」の分類には前後の抗HIV薬の比較により「変更薬剤なし」、「変更薬剤1剤」と「変更薬剤2剤以上」の細分類も加えた。

(8) AIDS発病・死亡と臨床・治療状況との関連

本集計では、AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の併用区分との関連について検討を試みた。集計対象者は、AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値との関連では、5年度第4期当初の事業対象者および9年度第1期当初の事業対象者とし、それ以外では9年度第1期当初の事業対象者とした。その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には18年度以前の年度の結果および19～25年度の各四半期の結果を示した。ここで、AIDS発病・死亡は本事業対象者から外れた事由である。死亡者についてのその時点のAIDS発病状況は不明であり、また、AIDS発病者についてのその後の死亡状況は不明である。

5年度第4期における観察当初のCD4値の区分ごとに、その後のAIDS非発病生存割合、および、AIDS発病者数と死亡者数を示した（表4-8-1～2）。9年度第1期における観察当初のCD4値とHIV-RNA量の区分および抗HIV薬の併用区分ごとに、その後のAIDS非発病生存割合、および、AIDS発病者数と死亡者数を示した（表4-8-3～8）。

5年度第4期における観察当初のCD4値について、比例ハザードモデルを用いて、各区分のハザード比、95%信頼区間とp値を算定した（表4-8-9）。観察期間は5年度第4期～23年度末、および、5年度第4期～8年度末と9年度～25年度末の3通りとした。9年度第1期におけるCD4値とHIV-RNA量および抗HIV治療の併用区分について、比例ハザードモデルに、1変数ずつと変数の組み合わせごとに、各区分のハザード比、95%信頼区間とp値を算定した（表4-8-10）。比

例ハザードモデルの適用にあたっては、AIDS発病・死亡では観察当初から発生時点（または観察終了）までの日数、AIDS非発病生存者では観察当初から観察終了までの日数を用いた。変数を組み合わせたモデルでは、全体のカテゴリー数を減少させるために、各変数のカテゴリーを2つにまとめた。ハザード比の参照カテゴリーとしては、CD4値では500以上、HIV-RNA量では400未満、抗HIV治療の併用区分では「投与なし（投与歴なし）」を用い、カテゴリーをまとめた場合はそれに準じた。

5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第2章 結果の概要」と「第4章 結果表」に示した。これらの集計結果を見る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関わる注意点として、データの正確性と精度などがある。データの正確性としては、たとえば、データの記載間違い、データのコンピュータ媒体への入力段階での誤りなどの可能性がある。AIDSの診断には基準があるが、すべての例が完全にその基準に従っている保証はない。また、本事業対象者のAIDS発病・死亡がすべて把握されているとは限らない。なお、死亡原因、AIDS発病者のその後の死亡状況、および、死亡者の死亡時点でのAIDS発病状況は不明である。データの精度としては、たとえば、CD4値やHIV-RNA量などは四半期内の1回の測定によるものであり、測定精度が関係する。抗HIV薬の併用区分は「対象者用健康状態報告書」に記載された抗HIV薬の投与状況によって分類しているが、5～8年度と9年度以降では調査票の形式が異なる。投与歴の有無は、あくまでも、本事業対象者になった時点以降の抗HIV薬の投与状況に基づいており、それ以前の投与状況は考慮されていない。副作用は抗HIV薬に限って調査したものではなく、その関係もあって「投与なし」にも副作用は若干存在する。身体状況と日常生活動作は先に述べた通り5～8年度と9年度以降では調査内容が異なることから、この2つの期間では厳密な比較ができない。HIV-RNA量の測定において、最近、新しい方法が導入されているが、方法の違いによる測定値への影響を考慮していない。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表4-4-1～5、表4-5-1～5などでは、2通りの中央値または割合を示している。これはAIDS発病・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。さらに、治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連（表4-7-1～7）については、それ以外の表とは全く集計方法が異なるが、結果表を見る上では、その集計方法を十分に理解することが大切である（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

それ以外の注意点として、たとえば、表4-1-6にCD4値とHIV-RNA量別の抗HIV薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4値とHIV-RNA量によって抗HIV薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗HIV薬の併用によってCD4値とHIV-RNA量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗HIV薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況（集計対象者）

		全体	各期ごと			
			第1期	第2期	第3期	第4期
平成5年度	事業対象者数	453	385	384	415	438
	開始者数	453	385	0	35	33
	中止者数	23	1	4	10	8
平成6年度	事業対象者数	530	463	489	487	492
	開始者数	100	33	34	13	20
	中止者数	55	8	15	15	17
平成7年度	事業対象者数	552	490	498	496	510
	開始者数	77	15	20	16	26
	中止者数	50	12	18	12	8
平成8年度	事業対象者数	603	553	554	558	561
	開始者数	101	51	21	13	16
	中止者数	49	20	9	13	7
平成9年度	事業対象者数	667	621	633	642	654
	開始者数	113	67	16	15	15
	中止者数	18	4	6	3	5
平成10年度	事業対象者数	672	658	656	662	661
	開始者数	23	9	2	7	5
	中止者数	15	4	1	6	4
平成11年度	事業対象者数	682	666	667	674	676
	開始者数	25	9	3	8	5
	中止者数	9	2	1	3	3
平成12年度	事業対象者数	682	677	673	668	662
	開始者数	9	4	4	1	0
	中止者数	20	8	6	6	0
平成13年度	事業対象者数	670	666	664	663	662
	開始者数	8	4	1	3	0
	中止者数	9	3	4	1	1
平成14年度	事業対象者数	673	666	666	666	664
	開始者数	12	5	2	2	3
	中止者数	16	2	2	5	7
平成15年度	事業対象者数	663	662	661	657	652
	開始者数	6	5	1	0	0
	中止者数	20	2	4	5	9
平成16年度	事業対象者数	648	645	646	646	641
	開始者数	5	2	1	1	1
	中止者数	15	0	1	6	8
平成17年度	事業対象者数	634	633	628	625	620
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	18	5	3	6	4
平成18年度	事業対象者数	618	617	614	609	605
	開始者数	2	1	0	0	1
	中止者数	17	3	5	5	4
平成19年度	事業対象者数	603	601	598	593	586
	開始者数	2	0	0	1	1
	中止者数	19	3	6	8	2
平成20年度	事業対象者数	586	586	578	575	571
	開始者数	2	2	0	0	0
	中止者数	20	8	3	4	5
平成21年度	事業対象者数	566	566	565	563	560
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	8	1	2	3	2
平成22年度	事業対象者数	562	558	559	555	553
	開始者数	4	0	4	0	0
	中止者数	15	3	4	2	6
平成23年度	事業対象者数	547	547	546	545	542
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	1	1	3	2
平成24年度	事業対象者数	540	540	537	535	534
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	9	3	2	1	3
平成25年度	事業対象者数	533	531	530	527	528
	開始者数	2	0	1	0	1
	中止者数	9	2	3	0	4

表3-4-1. 臨床・日常生活・治療の現状の平成25年度集計における基礎資料の時点

基礎資料の報告状況	集計に用いた時点					
	第1期	第2期	第3期	第4期	なし	計
1. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量の報告あり	1	6	69	442	—	518
2. 抗HIV薬、CD4値の報告あり	0	0	0	1	—	1
3. 抗HIV薬、HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	3	—	3
4. 抗HIV薬の報告あり	0	0	0	0	—	0
5. CD4値、HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
6. CD4値の報告あり	0	0	0	0	—	0
7. HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
8. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量以外の報告あり	0	0	0	1	—	1
9. データなし	—	—	—	—	5	5
計	1	6	69	447	5	528

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状

本節では、以下の表を示した。

表4-1-1.	基礎疾患	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-2.	性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布	
表4-1-3.	年齢別、CD4値	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-4.	年齢別、HIV-RNA量	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-5.	CD4値別、HIV-RNA量	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-6.	CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-7.	抗HIV薬の併用区分別、服用状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-8.	抗HIV薬の併用区分別、副作用	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-9.	抗HIV薬の併用薬剤	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-10.	抗HIV薬別、服用状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-11.	抗HIV薬別、副作用	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-12.	CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-13.	CD4値別、眼底検査	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-14.	CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-15.	年齢別、身体状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-16.	年齢別、日常生活動作	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-17.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-18.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-19.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-20.	CD4値別、身体状況の各項目	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-21.	抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-1-22.	疾患の有無	(平成25年度第4期事業対象者)

表4-1-1. 基礎疾患（平成25年度第4期事業対象者）

基礎疾患	人数	(%)
血友病A	382	(72.3)
血友病B	112	(21.2)
von Willebrand 病	3	(0.6)
二次感染	20	(3.8)
三次感染	2	(0.4)
その他	9	(1.7)
計	528	

表4-1-2. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（平成25年度第4期事業対象者）

		人数	(%)			人数	(%)
性別	男	501	(94.9)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	2	(0.4)
	女	27	(5.1)		0.10～0.50 未満	86	(17.6)
	計	528			0.50～1.00 未満	229	(46.7)
年齢	0～10 歳未満	1	(0.2)		1.00～1.50 未満	106	(21.6)
	10～20 歳未満	1	(0.2)		1.50 以上	67	(13.7)
	20～30 歳未満	3	(0.6)		不明	38	—
	30～40 歳未満	177	(33.5)		計	528	
	40～50 歳未満	235	(44.5)		平均値 0.903 (標準偏差 0.491) 中央値 0.800		
	50～60 歳未満	81	(15.3)	HIV-RNA 量	検出せず ^a	272	(52.2)
	60 歳以上	30	(5.7)		50 未満*	202	(38.8)
	計	528			50～400 未満	23	(4.4)
平均値 43.6 歳 (標準偏差 8.6 歳) 中央値 42.0 歳			400～1000 未満		7	(1.3)	
CD4 値	～200 未満	43	(8.3)		1000～5000 未満	11	(2.1)
	200～350 未満	98	(18.9)		5000～10000 未満	1	(0.2)
	350～500 未満	142	(27.4)		10000～50000 未満	2	(0.4)
	500 以上	236	(45.5)		50000 以上	3	(0.6)
	不明	9	—		不明	7	-
	計	528			計	528	
	平均値 513.6 (標準偏差 259.4) 中央値 482.0				中央値 検出せず ^a		

() : 計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表4-1-3. 年齢別、CD4値（平成25年度第4期事業対象者）

年齢	CD4 値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
20～30歳未満	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
30～40歳未満	15 (8.6)	33 (18.9)	48 (27.4)	79 (45.1)	2	177
40～50歳未満	21 (9.1)	37 (16.0)	63 (27.3)	110 (47.6)	4	235
50歳以上	7 (6.5)	25 (23.1)	31 (28.7)	45 (41.7)	3	111
計	43 (8.3)	98 (19.0)	142 (27.5)	234 (45.3)	9	526

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-4. 年齢別、HIV-RNA量（平成25年度第4期事業対象者）

年齢	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
20～30歳未満	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
30～40歳未満	152 (87.4)	10 (5.7)	3 (1.7)	5 (2.9)	4 (2.3)	3	177
40～50歳未満	215 (92.3)	8 (3.4)	3 (1.3)	6 (2.6)	1 (0.4)	2	235
50歳以上	102 (93.6)	5 (4.6)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	2	111
計	473 (91.1)	23 (4.4)	7 (1.3)	12 (2.3)	4 (0.8)	7	526

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-5. CD4値別、HIV-RNA量（平成25年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満†	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	34 (79.1)	3 (7.0)	0 (0.0)	4 (9.3)	2 (4.7)	0	43
200～350未満	92 (93.9)	3 (3.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	0	98
350～500未満	127 (90.1)	4 (2.8)	5 (3.5)	4 (2.8)	1 (0.7)	1	142
500以上	218 (92.4)	13 (5.5)	1 (0.4)	3 (1.3)	1 (0.4)	0	236
不明	3 —	0 —	0 —	0 —	0 —	6	9
計	474 (91.0)	23 (4.4)	7 (1.3)	12 (2.3)	5 (1.0)	7	528

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-6. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成25年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	1 (2.9)	4 (11.8)	5 (14.7)	21 (61.8)	3 (8.8)	0	34
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
	10000 以上	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	1 (2.3)	2 (4.7)	6 (14.0)	6 (14.0)	25 (58.1)	3 (7.0)	0	43
200 ～350未満	50 未満*	2 (2.2)	1 (1.1)	12 (13.0)	14 (15.2)	53 (57.6)	10 (10.9)	0	92
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	2 (2.0)	1 (1.0)	15 (15.3)	14 (14.3)	55 (56.1)	11 (11.2)	0	98
350 ～500未満	50 未満*	3 (2.4)	0 (0.0)	25 (19.7)	26 (20.5)	60 (47.2)	13 (10.2)	0	127
	50～400 未満†	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
	400～1000 未満	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0	5
	1000～10000 未満	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	10000 以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	10 (7.0)	3 (2.1)	26 (18.3)	27 (19.0)	62 (43.7)	14 (9.9)	0	142
500以上	50 未満*	2 (0.9)	1 (0.5)	66 (30.3)	40 (18.3)	88 (40.4)	21 (9.6)	0	218
	50～400 未満†	7 (53.8)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	2 (15.4)	2 (15.4)	0	13
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	11 (4.7)	2 (0.8)	68 (28.8)	40 (16.9)	92 (39.0)	23 (9.7)	0	236
不明	50 未満*	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	6	6
	計	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	6	9
計	50 未満*	8 (1.7)	4 (0.8)	107 (22.6)	86 (18.1)	222 (46.8)	47 (9.9)	0	474
	50～400 未満†	7 (30.4)	2 (8.7)	4 (17.4)	1 (4.3)	7 (30.4)	2 (8.7)	0	23
	400～1000 未満	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0	7
	1000～10000 未満	5 (41.7)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	3 (25.0)	0 (0.0)	0	12
	10000 以上	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0	5
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6	7
	計	25 (4.8)	9 (1.7)	115 (22.0)	88 (16.9)	234 (44.8)	51 (9.8)	6	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（平成25年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	106 (92.2)	5 (4.3)	2 (1.7)	1 (0.9)	1 (0.9)	0	115
NRTI 2剤+NNRTI	88 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	88
INSTI	229 (97.9)	2 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.9)	0	234
その他	50 (98.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0	51
計	473 (96.9)	7 (1.4)	2 (0.4)	2 (0.4)	4 (0.8)	0	488

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成25年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	30 (26.1)	81 (70.4)	4	115
NRTI 2剤+NNRTI	15 (17.0)	73 (83.0)	0	88
INSTI	50 (21.4)	178 (76.1)	6	234
その他	8 (15.7)	43 (84.3)	0	51
計	103 (21.1)	375 (76.8)	10	488

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (0.9)	7 (6.1)	0 (0.0)	2 (1.7)	0 (0.0)	1 (0.9)
NRTI 2剤+NNRTI	1 (1.1)	3 (3.4)	1 (1.1)	2 (2.3)	1 (1.1)	2 (2.3)
INSTI	5 (2.1)	5 (2.1)	0 (0.0)	2 (0.9)	1 (0.4)	4 (1.7)
その他	0 (0.0)	3 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	7 (1.4)	18 (3.7)	1 (0.2)	6 (1.2)	2 (0.4)	7 (1.4)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (0.9)	2 (1.7)	2 (1.7)	8 (7.0)	6 (5.2)	3 (2.6)
NRTI 2剤+NNRTI	2 (2.3)	2 (2.3)	4 (4.5)	9 (10.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	2 (0.9)	4 (1.7)	5 (2.1)	24 (10.3)	5 (2.1)	13 (5.6)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	3 (5.9)	2 (3.9)
計	5 (1.0)	8 (1.6)	12 (2.5)	42 (8.6)	14 (2.9)	18 (3.7)

(): 投与者数より不明を除いた数にのめる%

表4-1-9. 抗HIV薬の併用薬剤（平成25年度第4期事業対象者）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	NRTI 2 剤+NNRTI	件数
TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 21 例)	21 (18.3)	TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 40 例)	41 (46.6)
TDF+FTC +RTV+ATV (ツルバダ服用 14 例)	14 (12.2)	TDF+FTC +RPV (ツルバダ服用 11 例)	12 (13.6)
3TC+ABC +RTV+DRV (エブジコム服用 13 例)	13 (11.3)	3TC+ABC +EFV (エブジコム服用 8 例)	9 (10.2)
3TC+ABC +RTV+LPV (エブジコム服用 6 例)	8 (7.0)	3TC+ABC +RPV (エブジコム服用 6 例)	6 (6.8)
AZT+3TC +RTV+LPV (コンビビル服用 2 例)	7 (6.1)	AZT+3TC +EFV	5 (5.7)
TDF+FTC +RTV+FPV (ツルバダ服用 6 例)	6 (5.2)	3TC+ABC +ETR (エブジコム服用 3 例)	3 (3.4)
TDF+FTC +RTV+LPV (ツルバダ服用 6 例)	6 (5.2)	3TC+TDF +EFV	3 (3.4)
3TC+ABC +ATV (エブジコム服用 5 例)	5 (4.3)	AZT+3TC +NVP (コンビビル服用 2 例)	3 (3.4)
3TC+ABC +RTV+ATV (エブジコム服用 3 例)	4 (3.5)	3TC+ABC +NVP (エブジコム服用 2 例)	2 (2.3)
3TC+TDF +RTV+LPV	4 (3.5)	3TC+d4T +EFV	2 (2.3)
AZT+3TC +NFV	3 (2.6)	3TC+ABC +DLV (エブジコム服用 1 例)	1 (1.1)
TDF+FTC +ATV (ツルバダ服用 3 例)	3 (2.6)	ddl+3TC +EFV	1 (1.1)
3TC+ABC +RTV+FPV (エブジコム服用 2 例)	2 (1.7)	計 (12 通り)	88 (100.0)
TDF+FTC +DRV (ツルバダ服用 2 例)	2 (1.7)	INSTI (RAL/STB を含む組み合わせ)	件数
TDF+FTC +FPV (ツルバダ服用 2 例)	2 (1.7)	TDF+FTC +RAL (ツルバダ服用 83 例)	84 (35.9)
3TC+ABC +NFV	1 (0.9)	3TC+ABC +RAL (エブジコム服用 45 例)	56 (23.9)
3TC+TDF +ATV	1 (0.9)	ETR +RAL	7 (3.0)
3TC+TDF +FPV	1 (0.9)	RTV+DRV +RAL	7 (3.0)
3TC+TDF +RTV+FPV	1 (0.9)	TDF+FTC +EVG+COBI (スタリビルド服用)	7 (3.0)
3TC+d4T +NFV	1 (0.9)	RTV+DRV +ETR +RAL	6 (2.6)
3TC+d4T +SQV+RTV	1 (0.9)	3TC+TDF +RAL	5 (2.1)
ABC+TDF +ATV	1 (0.9)	3TC +ETR +RAL	3 (1.3)
ABC+TDF +RTV+ATV	1 (0.9)	ABC+TDF +RAL	3 (1.3)
ABC+TDF +RTV+LPV	1 (0.9)	AZT+3TC +RAL (コンビビル服用 2 例)	3 (1.3)
AZT+3TC +ATV	1 (0.9)	TDF+FTC +ETR +RAL (ツルバダ服用 3 例)	3 (1.3)
AZT+3TC +FPV	1 (0.9)	TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 3 例)	3 (1.3)
AZT+3TC +RTV	1 (0.9)	3TC +RPV +RAL	2 (0.9)
AZT+3TC +RTV+FPV	1 (0.9)	3TC +RTV+ATV +RAL	2 (0.9)
TDF+FTC +SQV+RTV (ツルバダ服用 1 例)	1 (0.9)	3TC+ABC +ETR +RAL (エブジコム服用 2 例)	2 (0.9)
ddl+ABC +RTV+LPV	1 (0.9)		
計 (30 通り)	115 (100.0)	(次ページへ続く)	

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-9 (続き)。抗HIV薬の併用薬剤 (平成25年度第4期事業対象者)

INSTI (続き)	件数	その他 (続き)	件数
ETR +RAL +MVC	2 (0.9)	3TC +RTV+DRV +MVC	1 (2.0)
FTC +RAL	2 (0.9)	3TC+ABC +ETR +MVC (エブリコム服用 1例)	1 (2.0)
RPV +RAL	2 (0.9)	3TC+ABC +MVC	1 (2.0)
RTV+LPV +RAL	2 (0.9)	AZT+ddl+3TC +SQV +MVC (コンビビル服用 1例)	1 (2.0)
TDF +ETR +RAL	2 (0.9)	RTV+DRV +ETR +MVC	1 (2.0)
TDF +RAL	2 (0.9)	TDF +ETR +MVC	1 (2.0)
TDF+FTC +RAL +MVC (ツルバダ服用 2例)	2 (0.9)	TDF+FTC +ETR +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
TDF+FTC +RPV +RAL (ツルバダ服用 2例)	2 (0.9)	-----	-----
TDF+FTC +RTV+DRV +RAL +MVC (ツルバダ服用 2例)	2 (0.9)	3TC +NFV	3 (5.9)
3TC +RTV+DRV +RAL	1 (0.4)	TDF+FTC +DRV +RPV (ツルバダ服用 2例)	2 (3.9)
3TC+ABC +RAL +MVC (エブリコム服用 1例)	1 (0.4)	3TC +EFV	1 (2.0)
3TC+ABC +RTV+DRV +RAL (エブリコム服用 1例)	1 (0.4)	3TC +RTV+DRV	1 (2.0)
3TC+ABC+TDF+FTC +RAL (エブリコム・ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	3TC +RTV+FPV	1 (2.0)
ABC +EFV +RAL	1 (0.4)	3TC +RTV+LPV +ETR	1 (2.0)
ABC +ETR +RAL	1 (0.4)	3TC +SQV+RTV	1 (2.0)
ABC+FTC +RAL	1 (0.4)	3TC+ABC +ATV +RPV (エブリコム服用 1例)	1 (2.0)
AZT+3TC +ETR +RAL	1 (0.4)	3TC+ABC +RTV+DRV +ETR (エブリコム服用 1例)	1 (2.0)
DRV +ETR +RAL	1 (0.4)	3TC+ABC +RTV+LPV +EFV (エブリコム服用 1例)	1 (2.0)
DRV +RPV +RAL	1 (0.4)	3TC+ABC +SQV +NVP (エブリコム服用 1例)	1 (2.0)
EFV +RAL	1 (0.4)	ABC +RTV+ATV	1 (2.0)
RAL +MVC	1 (0.4)	ABC +RTV+LPV	1 (2.0)
RTV+DRV +EFV +RAL	1 (0.4)	AZT+3TC +DRV +RPV (コンビビル服用 1例)	1 (2.0)
RTV+DRV +RAL +MVC	1 (0.4)	AZT+3TC+TDF +RTV+LPV (コンビビル服用 1例)	1 (2.0)
SQV+RTV +RAL	1 (0.4)	AZT+ddl+3TC	1 (2.0)
TDF +RTV+ATV +RAL	1 (0.4)	RTV+DRV +RPV	1 (2.0)
TDF+FTC +ATV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	RTV+LPV +EFV	1 (2.0)
TDF+FTC +EFV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	RTV+LPV+DRV	1 (2.0)
TDF+FTC +ETR +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	TDF +RTV+ATV +EFV	1 (2.0)
TDF+FTC +RTV+ATV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	TDF +RTV+ATV +RPV	1 (2.0)
TDF+FTC +RTV+DRV +ETR +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	TDF +RTV+LPV+FPV	1 (2.0)
TDF+FTC +RTV+FPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	TDF+FTC +ATV +RPV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.4)	TDF+FTC +NFV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
計 (47 通り)	234 (100.0)	TDF+FTC +RTV+DRV +RPV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
-----	-----	TDF+FTC +RTV+FPV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
その他	件数	TDF+FTC +RTV+LPV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
AZT+3TC (コンビビル服用 1例)	7 (13.7)	TDF+FTC +RTV+LPV+DRV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.0)
AZT+d4T	1 (2.0)	d4T +RTV+LPV +NVP	1 (2.0)
RTV+DRV +MVC	2 (3.9)	計 (33 通り)	51 (100.0)
TDF+FTC +MVC (ツルバダ服用 2例)	2 (3.9)		

(右上へ続く)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-10. 抗 HIV 薬別、服用状況（平成25年度第4期事業対象者）

抗 HIV 薬	服 用 状 況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
AZT	28 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	28
ddl	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
ddC	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
3TC	80 (98.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	0	81
d4T	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	6
AZT/3TC	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
ABC	28 (96.6)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	29
TDF	40 (97.6)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	41
3TC/ABC	101 (97.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.9)	0	104
FTC	13 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	13
TDF/FTC	216 (97.7)	2 (0.9)	2 (0.9)	1 (0.5)	0 (0.0)	0	221
IDV	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
SQV	5 (83.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0	6
RTV	104 (94.5)	3 (2.7)	2 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.9)	0	110
NFV	9 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
LPV	39 (97.5)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	40
ATV	37 (92.5)	2 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.5)	0	40
FPV	18 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	18
DRV	70 (94.6)	1 (1.4)	2 (2.7)	0 (0.0)	1 (1.4)	0	74
NVP	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
EFV	72 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	72
DLV	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
ETR	39 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	39
RPV	33 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	33
RAL	222 (97.8)	2 (0.9)	1 (0.4)	0 (0.0)	2 (0.9)	0	227
STB	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
MVC	21 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	21

() : 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-11. 抗HIV薬別、副作用（平成25年度第4期事業対象者）

抗HIV薬	副作用			投与者数	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
AZT	11 (39.3)	17 (60.7)	0	28	1 (3.6)	3 (10.7)	1 (3.6)	2 (7.1)
ddl	1 (25.0)	3 (75.0)	0	4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ddC	—	—	—	0	—	—	—	—
3TC	23 (28.8)	57 (71.3)	1	81	1 (1.3)	4 (5.0)	1 (1.3)	2 (2.5)
d4T	0 (0.0)	6 (100.0)	0	6	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	0 (0.0)	9 (100.0)	1	10	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	8 (27.6)	21 (72.4)	0	29	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF	8 (20.0)	32 (80.0)	1	41	0 (0.0)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC/ABC	26 (26.0)	74 (74.0)	4	104	1 (1.0)	5 (5.0)	0 (0.0)	1 (1.0)
FTC	3 (23.1)	10 (76.9)	0	13	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	37 (17.1)	180 (82.9)	4	221	2 (0.9)	4 (1.8)	0 (0.0)	2 (0.9)
IDV	—	—	—	0	—	—	—	—
SQV	0 (0.0)	6 (100.0)	0	6	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	26 (24.1)	82 (75.9)	2	110	2 (1.9)	4 (3.7)	0 (0.0)	2 (1.9)
NFV	3 (33.3)	6 (66.7)	0	9	0 (0.0)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	13 (34.2)	25 (65.8)	2	40	0 (0.0)	6 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
ATV	12 (30.8)	27 (69.2)	1	40	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
FPV	3 (16.7)	15 (83.3)	0	18	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)
DRV	19 (26.0)	54 (74.0)	1	74	3 (4.1)	5 (6.8)	0 (0.0)	2 (2.7)
NVP	1 (14.3)	6 (85.7)	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)
EFV	14 (19.4)	58 (80.6)	0	72	1 (1.4)	3 (4.2)	0 (0.0)	1 (1.4)
DLV	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ETR	7 (17.9)	32 (82.1)	0	39	1 (2.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)
RPV	5 (15.2)	28 (84.8)	0	33	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RAL	48 (21.7)	173 (78.3)	6	227	5 (2.3)	5 (2.3)	0 (0.0)	2 (0.9)
STB	2 (28.6)	5 (71.4)	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
MVC	3 (14.3)	18 (85.7)	0	21	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.8)

抗HIV薬	副作用（項目別）							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボストロフィー	黄疸	その他
AZT	0 (0.0)	2 (7.1)	1 (3.6)	1 (3.6)	2 (7.1)	3 (10.7)	2 (7.1)	0 (0.0)
ddl	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
ddC	—	—	—	—	—	—	—	—
3TC	0 (0.0)	4 (5.0)	1 (1.3)	2 (2.5)	2 (2.5)	10 (12.5)	3 (3.8)	2 (2.5)
d4T	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (17.2)	3 (10.3)	1 (3.4)
TDF	0 (0.0)	1 (2.5)	0 (0.0)	1 (2.5)	0 (0.0)	2 (5.0)	3 (7.5)	1 (2.5)
3TC/ABC	1 (1.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	4 (4.0)	3 (3.0)	11 (11.0)	4 (4.0)	6 (6.0)
FTC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)
TDF/FTC	1 (0.5)	1 (0.5)	4 (1.8)	1 (0.5)	5 (2.3)	15 (6.9)	3 (1.4)	6 (2.8)
IDV	—	—	—	—	—	—	—	—
SQV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	0 (0.0)	1 (0.9)	1 (0.9)	2 (1.9)	2 (1.9)	9 (8.3)	6 (5.6)	3 (2.8)
NFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	4 (10.5)	0 (0.0)	4 (10.5)
ATV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	3 (7.7)	8 (20.5)	0 (0.0)
FPV	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	2 (2.7)	1 (1.4)	8 (11.0)	0 (0.0)	4 (5.5)
NVP	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EFV	1 (1.4)	2 (2.8)	1 (1.4)	1 (1.4)	4 (5.6)	7 (9.7)	0 (0.0)	2 (2.8)
DLV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ETR	0 (0.0)	2 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	5 (12.8)	0 (0.0)	2 (5.1)
RPV	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	1 (3.0)	2 (6.1)	2 (6.1)	1 (3.0)	0 (0.0)
RAL	1 (0.5)	4 (1.8)	2 (0.9)	4 (1.8)	5 (2.3)	23 (10.4)	4 (1.8)	13 (5.9)
STB	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)
MVC	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	1 (4.8)	2 (9.5)	1 (4.8)	0 (0.0)	3 (14.3)

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-12. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬（平成25年度第4期事業対象者）

CD4 値	ニューモシスチス肺炎予防薬						計
	あり	ニューモシスチス肺炎予防薬の種類			なし	不明	
		ST 合剤	ペンタミジン吸入	ペンタミジン点滴			
～200未満	10 (25.0)	6 (15.0)	4 (10.0)	0 (0.0)	30 (75.0)	3	43
200～350未満	4 (4.1)	4 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	94 (95.9)	0	98
350～500未満	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)	0 (0.0)	139 (98.6)	1	142
500以上	2 (0.9)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	230 (99.1)	4	236
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	6	9
計	18 (3.5)	13 (2.5)	5 (1.0)	0 (0.0)	496 (96.5)	14	528

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-13. CD4値別、眼底検査（平成25年度第4期事業対象者）

CD4 値	眼底検査			計
	あり	なし	不明	
～200未満	1 (2.4)	41 (97.6)	1	43
200～350未満	4 (4.2)	91 (95.8)	3	98
350～500未満	5 (3.6)	134 (96.4)	3	142
500以上	5 (2.1)	229 (97.9)	2	236
不明	0 (0.0)	4 (100.0)	5	9
計	15 (2.9)	499 (97.1)	14	528

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-14. CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量（平成25年度第4期事業対象者）

	CD4 値	人 数	平 均	標準偏差
体重*	～200 未満	43	59.8	10.9
	200～350 未満	91	60.2	9.9
	350～500 未満	133	60.9	10.0
	500 以上	219	61.9	9.1
	不明	2	68.0	33.9
	全体	488	61.2	9.8
身体状況の総合スコア	～200 未満	43	2.6	0.8
	200～350 未満	96	2.6	0.8
	350～500 未満	141	2.5	0.9
	500 以上	233	2.5	0.8
	不明	3	2.9	1.7
	全体	516	2.5	0.9
日常生活動作	～200 未満	39	3.1	1.5
	200～350 未満	97	2.7	1.4
	350～500 未満	139	2.7	1.5
	500 以上	231	2.5	1.4
	不明	4	4.8	3.3
	全体	510	2.6	1.5

* 体重の集計対象：20 歳以上男性

表4-1-15. 年齢別、身体状況の総合スコア（平成25年度第4期事業対象者）

年齢	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
20～30 歳未満	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)
30～40 歳未満	56 (32.4)	65 (37.6)	45 (26.0)	7 (4.0)	4	177	121 (69.9)
40～50 歳未満	57 (24.7)	80 (34.6)	82 (35.5)	12 (5.2)	4	235	137 (59.3)
50 歳以上	24 (22.4)	45 (42.1)	36 (33.6)	2 (1.9)	4	111	69 (64.5)
計	138 (26.8)	191 (37.2)	164 (31.9)	21 (4.1)	12	526	329 (64.0)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-16. 年齢別、日常生活動作（平成25年度第4期事業対象者）

年齢	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
20～30 歳未満	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)
30～40 歳未満	46 (27.1)	51 (30.0)	39 (22.9)	34 (20.0)	7	177	97 (57.1)
40～50 歳未満	63 (27.4)	65 (28.3)	57 (24.8)	45 (19.6)	5	235	128 (55.7)
50 歳以上	19 (17.9)	18 (17.0)	29 (27.4)	40 (37.7)	5	111	37 (34.9)
計	130 (25.5)	134 (26.3)	126 (24.8)	119 (23.4)	17	526	264 (51.9)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-17. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重（平成25年度第4期事業対象者）

CD4値	抗HIV薬の併用区分	体重							計
		～40未満	40～50未満	50～60未満	60～70未満	70～80未満	80以上	不明	
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (33.3)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	6
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (66.7)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	6
	INSTI	0 (0.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	10 (40.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	0	25
	その他	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	7 (16.3)	15 (34.9)	15 (34.9)	3 (7.0)	3 (7.0)	0	43
200～350未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (14.3)	5 (35.7)	6 (42.9)	0 (0.0)	1 (7.1)	0	14
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	2 (16.7)	5 (41.7)	3 (25.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	0	12
	INSTI	0 (0.0)	7 (13.7)	20 (39.2)	14 (27.5)	8 (15.7)	2 (3.9)	0	51
	その他	1 (9.1)	0 (0.0)	4 (36.4)	5 (45.5)	1 (9.1)	0 (0.0)	0	11
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (1.1)	11 (12.1)	35 (38.5)	28 (30.8)	12 (13.2)	4 (4.4)	0	91
350～500未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (40.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0	10
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (8.7)	10 (43.5)	8 (34.8)	3 (13.0)	0 (0.0)	1	24
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (4.0)	3 (12.0)	9 (36.0)	8 (32.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	1	26
	INSTI	0 (0.0)	4 (6.9)	18 (31.0)	21 (36.2)	13 (22.4)	2 (3.4)	0	58
	その他	0 (0.0)	4 (28.6)	5 (35.7)	5 (35.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	14
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.8)	13 (9.8)	46 (34.6)	48 (36.1)	21 (15.8)	4 (3.0)	2	135
500以上	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (27.3)	4 (36.4)	2 (18.2)	1 (9.1)	0	11
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	6 (9.2)	25 (38.5)	27 (41.5)	7 (10.8)	0 (0.0)	1	66
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	1 (2.8)	10 (27.8)	17 (47.2)	5 (13.9)	3 (8.3)	1	37
	INSTI	1 (1.2)	7 (8.1)	26 (30.2)	34 (39.5)	15 (17.4)	3 (3.5)	3	89
	その他	0 (0.0)	1 (5.0)	5 (25.0)	11 (55.0)	2 (10.0)	1 (5.0)	0	20
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.5)	16 (7.3)	70 (32.0)	93 (42.5)	31 (14.2)	8 (3.7)	5	224
不明	投与なし（投与歴なし）	0	0	0	0	0	0	1	1
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	0	0	0	0	0	0	0
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	INSTI	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	5	5
	計	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	6	8
計	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	2 (8.3)	8 (33.3)	9 (37.5)	4 (16.7)	1 (4.2)	1	25
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	2 (25.0)	0	8
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	12 (11.1)	41 (38.0)	44 (40.7)	10 (9.3)	1 (0.9)	2	110
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (1.3)	6 (7.5)	28 (35.0)	30 (37.5)	9 (11.3)	6 (7.5)	2	82
	INSTI	1 (0.5)	20 (9.1)	73 (33.2)	79 (35.9)	38 (17.3)	9 (4.1)	3	223
	その他	1 (2.1)	7 (14.6)	15 (31.3)	21 (43.8)	3 (6.3)	1 (2.1)	0	48
	不明	0	0	0	0	0	0	5	5
	計	3 (0.6)	48 (9.8)	166 (34.0)	184 (37.7)	67 (13.7)	20 (4.1)	13	501

対象：20歳以上男性

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-18. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況（平成25年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
		1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
～200 未満	投与なし（投与歴なし）	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)
	投与なし（投与歴あり）	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (33.3)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	0	6	3 (50.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0	6	4 (66.7)
	INSTI	5 (20.0)	11 (44.0)	7 (28.0)	2 (8.0)	0	25	16 (64.0)
	その他	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3	1 (33.3)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	12 (27.9)	15 (34.9)	14 (32.6)	2 (4.7)	0	43	27 (62.8)
200 ～350 未満	投与なし（投与歴なし）	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	3 (20.0)	4 (26.7)	8 (53.3)	0 (0.0)	0	15	7 (46.7)
	NRTI 2剤+NNRTI	2 (14.3)	6 (42.9)	6 (42.9)	0 (0.0)	0	14	8 (57.1)
	INSTI	8 (15.1)	25 (47.2)	18 (34.0)	2 (3.8)	2	55	33 (62.3)
	その他	3 (27.3)	2 (18.2)	6 (54.5)	0 (0.0)	0	11	5 (45.5)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	18 (18.8)	38 (39.6)	38 (39.6)	2 (2.1)	2	98	56 (58.3)
350 ～500 未満	投与なし（投与歴なし）	4 (40.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	10 (100.0)
	投与なし（投与歴あり）	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3	3 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (30.8)	5 (19.2)	11 (42.3)	2 (7.7)	0	26	13 (50.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	10 (37.0)	9 (33.3)	5 (18.5)	3 (11.1)	0	27	19 (70.4)
	INSTI	16 (25.8)	26 (41.9)	17 (27.4)	3 (4.8)	0	62	42 (67.7)
	その他	1 (7.7)	3 (23.1)	8 (61.5)	1 (7.7)	1	14	4 (30.8)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	42 (29.8)	49 (34.8)	41 (29.1)	9 (6.4)	1	142	91 (64.5)
500 以上	投与なし（投与歴なし）	8 (72.7)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	0	11	10 (90.9)
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	14 (20.9)	26 (38.8)	25 (37.3)	2 (3.0)	1	68	40 (59.7)
	NRTI 2剤+NNRTI	10 (25.0)	17 (42.5)	12 (30.0)	1 (2.5)	0	40	27 (67.5)
	INSTI	24 (26.7)	37 (41.1)	27 (30.0)	2 (2.2)	2	92	61 (67.8)
	その他	10 (43.5)	7 (30.4)	5 (21.7)	1 (4.3)	0	23	17 (73.9)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	66 (28.3)	90 (38.6)	70 (30.0)	7 (3.0)	3	236	156 (67.0)
不明	投与なし（投与歴なし）	0	—	0	—	1	1	0
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1	0 (0.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	—	0	—	0	0	0
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)
	INSTI	0	—	0	—	0	0	0
	その他	0	—	0	—	0	0	0
	不明	0	—	1	—	5	6	0
	計	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	6	9	1 (33.3)
計	投与なし（投与歴なし）	15 (62.5)	8 (33.3)	0 (0.0)	1 (4.2)	1	25	23 (95.8)
	投与なし（投与歴あり）	4 (44.4)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	0	9	7 (77.8)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	27 (23.7)	36 (31.6)	47 (41.2)	4 (3.5)	1	115	63 (55.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	25 (28.4)	34 (38.6)	25 (28.4)	4 (4.5)	0	88	59 (67.0)
	INSTI	53 (23.0)	99 (43.0)	69 (30.0)	9 (3.9)	4	234	152 (66.1)
	その他	15 (30.0)	12 (24.0)	21 (42.0)	2 (4.0)	1	51	27 (54.0)
	不明	0	—	1	—	5	6	0
	計	139 (26.9)	192 (37.2)	164 (31.8)	21 (4.1)	12	528	331 (64.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-19. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作（平成25年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4 (4~8)	不明		
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)
	投与なし（投与歴あり）	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2	6	2 (50.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	1 (16.7)	2 (33.3)	3 (50.0)	0	6	1 (16.7)
	INSTI	3 (13.0)	5 (21.7)	7 (30.4)	8 (34.8)	2	25	8 (34.8)
	その他	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3	1 (33.3)
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	計	6 (15.4)	8 (20.5)	12 (30.8)	13 (33.3)	4	43	14 (35.9)
200 ～350未満	投与なし（投与歴なし）	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	4 (26.7)	4 (26.7)	5 (33.3)	2 (13.3)	0	15	8 (53.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	3 (21.4)	3 (21.4)	5 (35.7)	3 (21.4)	0	14	6 (42.9)
	INSTI	8 (14.8)	15 (27.8)	18 (33.3)	13 (24.1)	1	55	23 (42.6)
	その他	4 (36.4)	3 (27.3)	1 (9.1)	3 (27.3)	0	11	7 (63.6)
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	計	20 (20.6)	26 (26.8)	30 (30.9)	21 (21.6)	1	98	46 (47.4)
350 ～500未満	投与なし（投与歴なし）	5 (50.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	0	10	6 (60.0)
	投与なし（投与歴あり）	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3	3 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (36.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	5 (20.0)	1	26	11 (44.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	7 (26.9)	7 (26.9)	3 (11.5)	9 (34.6)	1	27	14 (53.8)
	INSTI	15 (24.2)	13 (21.0)	17 (27.4)	17 (27.4)	0	62	28 (45.2)
	その他	0 (0.0)	5 (38.5)	4 (30.8)	4 (30.8)	1	14	5 (38.5)
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	計	39 (28.1)	28 (20.1)	37 (26.6)	35 (25.2)	3	142	67 (48.2)
500以上	投与なし（投与歴なし）	6 (54.5)	2 (18.2)	1 (9.1)	2 (18.2)	0	11	8 (72.7)
	投与なし（投与歴あり）	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	17 (25.0)	23 (33.8)	14 (20.6)	14 (20.6)	0	68	40 (58.8)
	NRTI 2剤+NNRTI	9 (23.1)	15 (38.5)	7 (17.9)	8 (20.5)	1	40	24 (61.5)
	INSTI	23 (25.8)	23 (25.8)	20 (22.5)	23 (25.8)	3	92	46 (51.7)
	その他	9 (40.9)	8 (36.4)	4 (18.2)	1 (4.5)	1	23	17 (77.3)
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	計	65 (28.1)	72 (31.2)	46 (19.9)	48 (20.8)	5	236	137 (59.3)
不明	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1	0 (0.0)
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1	0 (0.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)
	INSTI	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	その他	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0	0 -
	不明	0 -	0 -	1 -	0 -	5	6	0 -
	計	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	5	9	1 (25.0)
計	投与なし（投与歴なし）	12 (48.0)	4 (16.0)	6 (24.0)	3 (12.0)	0	25	16 (64.0)
	投与なし（投与歴あり）	5 (55.6)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0	9	7 (77.8)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	31 (27.7)	30 (26.8)	28 (25.0)	23 (20.5)	3	115	61 (54.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	20 (23.3)	26 (30.2)	17 (19.8)	23 (26.7)	2	88	46 (53.5)
	INSTI	49 (21.5)	56 (24.6)	62 (27.2)	61 (26.8)	6	234	105 (46.1)
	その他	14 (28.6)	16 (32.7)	11 (22.4)	8 (16.3)	2	51	30 (61.2)
	不明	0 -	0 -	1 -	0 -	5	6	0 -
	計	131 (25.7)	134 (26.3)	126 (24.7)	119 (23.3)	18	528	265 (52.0)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20. CD4値別、身体状況の各項目（平成25年度第4期事業対象者）

身体状況の項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	～200未満	14 (32.6)	14 (32.6)	10 (23.3)	5 (11.6)	0 (0.0)	0	43	28 (65.1)
	200～350未満	22 (22.4)	44 (44.9)	27 (27.6)	5 (5.1)	0 (0.0)	0	98	66 (67.3)
	350～500未満	54 (38.0)	49 (34.5)	32 (22.5)	6 (4.2)	1 (0.7)	0	142	103 (72.5)
	500以上	87 (37.0)	84 (35.7)	53 (22.6)	10 (4.3)	1 (0.4)	1	236	171 (72.8)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	178 (34.1)	191 (36.6)	124 (23.8)	27 (5.2)	2 (0.4)	6	528	369 (70.7)
味覚	～200未満	21 (48.8)	7 (16.3)	12 (27.9)	3 (7.0)	0 (0.0)	0	43	28 (65.1)
	200～350未満	45 (46.4)	17 (17.5)	23 (23.7)	11 (11.3)	1 (1.0)	1	98	62 (63.9)
	350～500未満	72 (50.7)	18 (12.7)	39 (27.5)	9 (6.3)	4 (2.8)	0	142	90 (63.4)
	500以上	111 (47.2)	57 (24.3)	52 (22.1)	9 (3.8)	6 (2.6)	1	236	168 (71.5)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	250 (48.0)	99 (19.0)	128 (24.6)	33 (6.3)	11 (2.1)	7	528	349 (67.0)
口乾	～200未満	7 (16.3)	11 (25.6)	17 (39.5)	7 (16.3)	1 (2.3)	0	43	18 (41.9)
	200～350未満	21 (21.4)	13 (13.3)	29 (29.6)	25 (25.5)	10 (10.2)	0	98	34 (34.7)
	350～500未満	41 (28.9)	23 (16.2)	25 (17.6)	36 (25.4)	17 (12.0)	0	142	64 (45.1)
	500以上	60 (25.6)	42 (17.9)	55 (23.5)	59 (25.2)	18 (7.7)	2	236	102 (43.6)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	5	9	1 (25.0)
	計	130 (25.0)	89 (17.1)	126 (24.2)	129 (24.8)	47 (9.0)	7	528	219 (42.0)
口内炎・ 口の中の痛み	～200未満	15 (34.9)	9 (20.9)	10 (23.3)	8 (18.6)	1 (2.3)	0	43	24 (55.8)
	200～350未満	39 (39.8)	17 (17.3)	16 (16.3)	23 (23.5)	3 (3.1)	0	98	56 (57.1)
	350～500未満	48 (33.8)	27 (19.0)	28 (19.7)	32 (22.5)	7 (4.9)	0	142	75 (52.8)
	500以上	85 (36.2)	51 (21.7)	47 (20.0)	41 (17.4)	11 (4.7)	1	236	136 (57.9)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	188 (36.0)	104 (19.9)	101 (19.3)	107 (20.5)	22 (4.2)	6	528	292 (55.9)
下痢	～200未満	9 (20.9)	13 (30.2)	10 (23.3)	9 (20.9)	2 (4.7)	0	43	22 (51.2)
	200～350未満	24 (24.5)	17 (17.3)	21 (21.4)	27 (27.6)	9 (9.2)	0	98	41 (41.8)
	350～500未満	35 (24.6)	29 (20.4)	28 (19.7)	35 (24.6)	15 (10.6)	0	142	64 (45.1)
	500以上	35 (14.9)	56 (23.8)	63 (26.8)	50 (21.3)	31 (13.2)	1	236	91 (38.7)
	不明	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	6	9	1 (33.3)
	計	104 (20.0)	115 (22.1)	122 (23.4)	122 (23.4)	58 (11.1)	7	528	219 (42.0)
体重減少	～200未満	14 (32.6)	6 (14.0)	16 (37.2)	5 (11.6)	2 (4.7)	0	43	20 (46.5)
	200～350未満	29 (29.6)	23 (23.5)	35 (35.7)	7 (7.1)	4 (4.1)	0	98	52 (53.1)
	350～500未満	61 (43.3)	29 (20.6)	40 (28.4)	10 (7.1)	1 (0.7)	1	142	90 (63.8)
	500以上	103 (44.0)	46 (19.7)	59 (25.2)	21 (9.0)	5 (2.1)	2	236	149 (63.7)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	208 (40.0)	104 (20.0)	152 (29.2)	44 (8.5)	12 (2.3)	8	528	312 (60.0)
息切れ	～200未満	4 (9.3)	8 (18.6)	14 (32.6)	11 (25.6)	6 (14.0)	0	43	12 (27.9)
	200～350未満	13 (13.4)	15 (15.5)	19 (19.6)	34 (35.1)	16 (16.5)	1	98	28 (28.9)
	350～500未満	29 (20.4)	16 (11.3)	31 (21.8)	46 (32.4)	20 (14.1)	0	142	45 (31.7)
	500以上	48 (20.4)	33 (14.0)	62 (26.4)	70 (29.8)	22 (9.4)	1	236	81 (34.5)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	5	9	1 (25.0)
	計	95 (18.2)	72 (13.8)	127 (24.4)	162 (31.1)	65 (12.5)	7	528	167 (32.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20 (続き). CD4値別、身体状況の各項目 (平成25年度第4期事業対象者)

身体状況の 項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	～200未満	1 (2.3)	7 (16.3)	12 (27.9)	15 (34.9)	8 (18.6)	0	43	8 (18.6)
	200～350未満	9 (9.2)	8 (8.2)	17 (17.3)	39 (39.8)	25 (25.5)	0	98	17 (17.3)
	350～500未満	20 (14.1)	21 (14.8)	22 (15.5)	37 (26.1)	42 (29.6)	0	142	41 (28.9)
	500以上	27 (11.5)	30 (12.8)	52 (22.1)	83 (35.3)	43 (18.3)	1	236	57 (24.3)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	5	9	1 (25.0)
	計	58 (11.1)	66 (12.6)	104 (19.9)	174 (33.3)	120 (23.0)	6	528	124 (23.8)
手足のしびれ・ 痛み	～200未満	13 (30.2)	10 (23.3)	7 (16.3)	8 (18.6)	5 (11.6)	0	43	23 (53.5)
	200～350未満	27 (27.6)	11 (11.2)	25 (25.5)	24 (24.5)	11 (11.2)	0	98	38 (38.8)
	350～500未満	47 (33.1)	13 (9.2)	30 (21.1)	33 (23.2)	19 (13.4)	0	142	60 (42.3)
	500以上	73 (31.1)	30 (12.8)	44 (18.7)	57 (24.3)	31 (13.2)	1	236	103 (43.8)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	161 (30.8)	64 (12.3)	108 (20.7)	123 (23.6)	66 (12.6)	6	528	225 (43.1)
37℃以上の 発熱	～200未満	11 (25.6)	9 (20.9)	15 (34.9)	8 (18.6)	0 (0.0)	0	43	20 (46.5)
	200～350未満	38 (38.8)	23 (23.5)	20 (20.4)	15 (15.3)	2 (2.0)	0	98	61 (62.2)
	350～500未満	60 (42.3)	29 (20.4)	34 (23.9)	11 (7.7)	8 (5.6)	0	142	89 (62.7)
	500以上	87 (37.0)	56 (23.8)	61 (26.0)	27 (11.5)	4 (1.7)	1	236	143 (60.9)
	不明	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	5	9	2 (50.0)
	計	198 (37.9)	117 (22.4)	130 (24.9)	62 (11.9)	15 (2.9)	6	528	315 (60.3)
皮膚の湿疹・ かゆみ・ できもの	～200未満	6 (14.0)	5 (11.6)	15 (34.9)	10 (23.3)	7 (16.3)	0	43	11 (25.6)
	200～350未満	16 (16.3)	10 (10.2)	23 (23.5)	38 (38.8)	11 (11.2)	0	98	26 (26.5)
	350～500未満	35 (24.6)	15 (10.6)	16 (11.3)	58 (40.8)	18 (12.7)	0	142	50 (35.2)
	500以上	56 (23.8)	36 (15.3)	48 (20.4)	62 (26.4)	33 (14.0)	1	236	92 (39.1)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	5	9	1 (25.0)
	計	114 (21.8)	66 (12.6)	102 (19.5)	170 (32.6)	70 (13.4)	6	528	180 (34.5)
視野	～200未満	18 (41.9)	9 (20.9)	13 (30.2)	1 (2.3)	2 (4.7)	0	43	27 (62.8)
	200～350未満	46 (46.9)	14 (14.3)	25 (25.5)	13 (13.3)	0 (0.0)	0	98	60 (61.2)
	350～500未満	78 (54.9)	19 (13.4)	28 (19.7)	16 (11.3)	1 (0.7)	0	142	97 (68.3)
	500以上	118 (50.2)	37 (15.7)	48 (20.4)	25 (10.6)	7 (3.0)	1	236	155 (66.0)
	不明	2 (50.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5	9	2 (50.0)
	計	262 (50.2)	79 (15.1)	116 (22.2)	55 (10.5)	10 (1.9)	6	528	341 (65.3)
睡眠	～200未満	11 (25.6)	9 (20.9)	15 (34.9)	7 (16.3)	1 (2.3)	0	43	20 (46.5)
	200～350未満	22 (22.4)	20 (20.4)	26 (26.5)	30 (30.6)	0 (0.0)	0	98	42 (42.9)
	350～500未満	42 (29.6)	27 (19.0)	32 (22.5)	31 (21.8)	10 (7.0)	0	142	69 (48.6)
	500以上	76 (32.3)	44 (18.7)	50 (21.3)	59 (25.1)	6 (2.6)	1	236	120 (51.1)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	5	9	1 (25.0)
	計	152 (29.1)	100 (19.2)	124 (23.8)	129 (24.7)	17 (3.3)	6	528	252 (48.3)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21. 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目（平成25年度第4期事業対象者）

身体状況の項目	抗 HIV 薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	投与なし(投与歴なし)	15 (60.0)	7 (28.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	25	22 (88.0)
	投与なし(投与歴あり)	6 (66.7)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0	9	7 (77.8)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	33 (28.7)	42 (36.5)	33 (28.7)	7 (6.1)	0 (0.0)	0	115	75 (65.2)
	NRTI 2剤+NNRTI	36 (40.9)	29 (33.0)	19 (21.6)	4 (4.5)	0 (0.0)	0	88	65 (73.9)
	INSTI	72 (30.9)	96 (41.2)	52 (22.3)	12 (5.2)	1 (0.4)	1	234	168 (72.1)
	その他	16 (31.4)	16 (31.4)	15 (29.4)	3 (5.9)	1 (2.0)	0	51	32 (62.7)
	不明	0	0	1	0	0	5	6	0
	計	178 (34.1)	191 (36.6)	124 (23.8)	27 (5.2)	2 (0.4)	6	528	369 (70.7)
味覚	投与なし(投与歴なし)	19 (76.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0	25	22 (88.0)
	投与なし(投与歴あり)	5 (55.6)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0	9	7 (77.8)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	42 (36.5)	33 (28.7)	37 (32.2)	2 (1.7)	1 (0.9)	0	115	75 (65.2)
	NRTI 2剤+NNRTI	45 (51.1)	18 (20.5)	19 (21.6)	3 (3.4)	3 (3.4)	0	88	63 (71.6)
	INSTI	115 (49.6)	36 (15.5)	57 (24.6)	19 (8.2)	5 (2.2)	2	234	151 (65.1)
	その他	24 (47.1)	7 (13.7)	11 (21.6)	7 (13.7)	2 (3.9)	0	51	31 (60.8)
	不明	0	0	1	0	0	5	6	0
	計	250 (48.0)	99 (19.0)	128 (24.6)	33 (6.3)	11 (2.1)	7	528	349 (67.0)
口乾	投与なし(投与歴なし)	13 (52.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	4 (16.0)	1 (4.0)	0	25	17 (68.0)
	投与なし(投与歴あり)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	0	9	5 (55.6)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	26 (22.6)	16 (13.9)	32 (27.8)	32 (27.8)	9 (7.8)	0	115	42 (36.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	20 (22.7)	21 (23.9)	21 (23.9)	20 (22.7)	6 (6.8)	0	88	41 (46.6)
	INSTI	53 (22.8)	42 (18.1)	61 (26.3)	53 (22.8)	23 (9.9)	2	234	95 (40.9)
	その他	15 (29.4)	4 (7.8)	8 (15.7)	18 (35.3)	6 (11.8)	0	51	19 (37.3)
	不明	0	0	0	0	1	5	6	0
	計	130 (25.0)	89 (17.1)	126 (24.2)	129 (24.8)	47 (9.0)	7	528	219 (42.0)
口内炎・ 口の中の痛み	投与なし(投与歴なし)	14 (56.0)	7 (28.0)	0 (0.0)	4 (16.0)	0 (0.0)	0	25	21 (84.0)
	投与なし(投与歴あり)	4 (44.4)	2 (22.2)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	0	9	6 (66.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	27 (23.5)	33 (28.7)	28 (24.3)	21 (18.3)	6 (5.2)	0	115	60 (52.2)
	NRTI 2剤+NNRTI	31 (35.2)	19 (21.6)	21 (23.9)	14 (15.9)	3 (3.4)	0	88	50 (56.8)
	INSTI	93 (39.9)	36 (15.5)	46 (19.7)	49 (21.0)	9 (3.9)	1	234	129 (55.4)
	その他	19 (37.3)	7 (13.7)	6 (11.8)	16 (31.4)	3 (5.9)	0	51	26 (51.0)
	不明	0	0	0	1	0	5	6	0
	計	188 (36.0)	104 (19.9)	101 (19.3)	107 (20.5)	22 (4.2)	6	528	292 (55.9)
下痢	投与なし(投与歴なし)	12 (50.0)	6 (25.0)	4 (16.7)	2 (8.3)	0 (0.0)	1	25	18 (75.0)
	投与なし(投与歴あり)	2 (22.2)	4 (44.4)	1 (11.1)	0 (0.0)	2 (22.2)	0	9	6 (66.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	12 (10.4)	22 (19.1)	27 (23.5)	34 (29.6)	20 (17.4)	0	115	34 (29.6)
	NRTI 2剤+NNRTI	13 (14.8)	22 (25.0)	27 (30.7)	17 (19.3)	9 (10.2)	0	88	35 (39.8)
	INSTI	52 (22.3)	57 (24.5)	51 (21.9)	55 (23.6)	18 (7.7)	1	234	109 (46.8)
	その他	13 (25.5)	4 (7.8)	12 (23.5)	13 (25.5)	9 (17.6)	0	51	17 (33.3)
	不明	0	0	0	1	0	5	6	0
	計	104 (20.0)	115 (22.1)	122 (23.4)	122 (23.4)	58 (11.1)	7	528	219 (42.0)
体重減少	投与なし(投与歴なし)	16 (64.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	25	21 (84.0)
	投与なし(投与歴あり)	8 (88.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0	9	8 (88.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	36 (31.6)	25 (21.9)	36 (31.6)	14 (12.3)	3 (2.6)	1	115	61 (53.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	38 (43.2)	17 (19.3)	28 (31.8)	5 (5.7)	0 (0.0)	0	88	55 (62.5)
	INSTI	94 (40.3)	49 (21.0)	64 (27.5)	19 (8.2)	7 (3.0)	1	234	143 (61.4)
	その他	16 (32.0)	8 (16.0)	19 (38.0)	5 (10.0)	2 (4.0)	1	51	24 (48.0)
	不明	0	0	1	0	0	5	6	0
	計	208 (40.0)	104 (20.0)	152 (29.2)	44 (8.5)	12 (2.3)	8	528	312 (60.0)
息切れ	投与なし(投与歴なし)	10 (40.0)	3 (12.0)	9 (36.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0	25	13 (52.0)
	投与なし(投与歴あり)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	0	9	4 (44.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	20 (17.4)	16 (13.9)	24 (20.9)	41 (35.7)	14 (12.2)	0	115	36 (31.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	15 (17.0)	16 (18.2)	22 (25.0)	28 (31.8)	7 (8.0)	0	88	31 (35.2)
	INSTI	35 (15.1)	28 (12.1)	64 (27.6)	69 (29.7)	36 (15.5)	2	234	63 (27.2)
	その他	12 (23.5)	8 (15.7)	7 (13.7)	19 (37.3)	5 (9.8)	0	51	20 (39.2)
	不明	0	0	0	0	1	5	6	0
	計	95 (18.2)	72 (13.8)	127 (24.4)	162 (31.1)	65 (12.5)	7	528	167 (32.1)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21 (続き). 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目 (平成25年度第4期事業対象者)

身体状況の項目	抗 HIV 薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	投与なし(投与歴なし)	6 (24.0)	6 (24.0)	8 (32.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	0	25	12 (48.0)
	投与なし(投与歴あり)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	4 (44.4)	0	9	3 (33.3)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	14 (12.2)	12 (10.4)	25 (21.7)	42 (36.5)	22 (19.1)	0	115	26 (22.6)
	NRTI 2剤+NNRTI	11 (12.5)	14 (15.9)	15 (17.0)	32 (36.4)	16 (18.2)	0	88	25 (28.4)
	INSTI	18 (7.7)	29 (12.4)	50 (21.5)	75 (32.2)	61 (26.2)	1	234	47 (20.2)
	その他	7 (13.7)	4 (7.8)	5 (9.8)	21 (41.2)	14 (27.5)	0	51	11 (21.6)
	不明	0	—	0	—	1	—	5	6
	計	58 (11.1)	66 (12.6)	104 (19.9)	174 (33.3)	120 (23.0)	6	528	124 (23.8)
手足のしびれ・ 痛み	投与なし(投与歴なし)	12 (48.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	5 (20.0)	0	25	16 (64.0)
	投与なし(投与歴あり)	5 (55.6)	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	0	9	5 (55.6)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	32 (27.8)	13 (11.3)	32 (27.8)	28 (24.3)	10 (8.7)	0	115	45 (39.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	26 (29.5)	6 (6.8)	25 (28.4)	26 (29.5)	5 (5.7)	0	88	32 (36.4)
	INSTI	66 (28.3)	38 (16.3)	38 (16.3)	54 (23.2)	37 (15.9)	1	234	104 (44.6)
	その他	20 (39.2)	3 (5.9)	8 (15.7)	13 (25.5)	7 (13.7)	0	51	23 (45.1)
	不明	0	—	1	—	0	—	5	6
	計	161 (30.8)	64 (12.3)	108 (20.7)	123 (23.6)	66 (12.6)	6	528	225 (43.1)
37℃以上の 発熱	投与なし(投与歴なし)	15 (60.0)	4 (16.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0	25	19 (76.0)
	投与なし(投与歴あり)	5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	0	9	6 (66.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	38 (33.0)	30 (26.1)	40 (34.8)	7 (6.1)	0 (0.0)	0	115	68 (59.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	35 (39.8)	17 (19.3)	22 (25.0)	12 (13.6)	2 (2.3)	0	88	52 (59.1)
	INSTI	80 (34.3)	54 (23.2)	54 (23.2)	35 (15.0)	10 (4.3)	1	234	134 (57.5)
	その他	24 (47.1)	11 (21.6)	8 (15.7)	6 (11.8)	2 (3.9)	0	51	35 (68.6)
	不明	1	—	0	—	0	—	5	6
	計	198 (37.9)	117 (22.4)	130 (24.9)	62 (11.9)	15 (2.9)	6	528	315 (60.3)
皮膚の湿疹・ かゆみ・ できもの	投与なし(投与歴なし)	7 (28.0)	8 (32.0)	1 (4.0)	8 (32.0)	1 (4.0)	0	25	15 (60.0)
	投与なし(投与歴あり)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	3 (33.3)	0	9	5 (55.6)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	23 (20.0)	19 (16.5)	22 (19.1)	39 (33.9)	12 (10.4)	0	115	42 (36.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	17 (19.3)	9 (10.2)	19 (21.6)	30 (34.1)	13 (14.8)	0	88	26 (29.5)
	INSTI	49 (21.0)	26 (11.2)	51 (21.9)	73 (31.3)	34 (14.6)	1	234	75 (32.2)
	その他	15 (29.4)	2 (3.9)	8 (15.7)	19 (37.3)	7 (13.7)	0	51	17 (33.3)
	不明	0	—	0	—	0	—	5	6
	計	114 (21.8)	66 (12.6)	102 (19.5)	170 (32.6)	70 (13.4)	6	528	180 (34.5)
視野	投与なし(投与歴なし)	18 (72.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0	25	23 (92.0)
	投与なし(投与歴あり)	7 (77.8)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	8 (88.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	46 (40.0)	24 (20.9)	29 (25.2)	14 (12.2)	2 (1.7)	0	115	70 (60.9)
	NRTI 2剤+NNRTI	48 (54.5)	11 (12.5)	19 (21.6)	8 (9.1)	2 (2.3)	0	88	59 (67.0)
	INSTI	118 (50.6)	30 (12.9)	51 (21.9)	28 (12.0)	6 (2.6)	1	234	148 (63.5)
	その他	24 (47.1)	8 (15.7)	15 (29.4)	4 (7.8)	0 (0.0)	0	51	32 (62.7)
	不明	1	—	0	—	0	—	5	6
	計	262 (50.2)	79 (15.1)	116 (22.2)	55 (10.5)	10 (1.9)	6	528	341 (65.3)
睡眠	投与なし(投与歴なし)	13 (52.0)	4 (16.0)	6 (24.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0	25	17 (68.0)
	投与なし(投与歴あり)	5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	0 (0.0)	0	9	6 (66.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	27 (23.5)	18 (15.7)	32 (27.8)	34 (29.6)	4 (3.5)	0	115	45 (39.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	31 (35.2)	13 (14.8)	24 (27.3)	17 (19.3)	3 (3.4)	0	88	44 (50.0)
	INSTI	59 (25.3)	55 (23.6)	49 (21.0)	61 (26.2)	9 (3.9)	1	234	114 (48.9)
	その他	17 (33.3)	9 (17.6)	12 (23.5)	12 (23.5)	1 (2.0)	0	51	26 (51.0)
	不明	0	—	0	—	0	—	5	6
	計	152 (29.1)	100 (19.2)	124 (23.8)	129 (24.7)	17 (3.3)	6	528	252 (48.3)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-22. 疾患の有無（平成25年度第4期事業対象者）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	24 (4.6)	496 (95.4)	8	528
(内訳) 脳出血	19 (3.7)			
脳梗塞	2 (0.4)			
その他の脳血管疾患	3 (0.6)			
虚血性心疾患	5 (1.0)	515 (99.0)	8	528
(内訳) 心筋梗塞	2 (0.4)			
その他の虚血性心疾患	3 (0.6)			
肝以外の悪性新生物	7 (1.3)	513 (98.7)	8	528
高血圧・糖尿病	119 (23.0)	398 (77.0)	11	528
(内訳) 高血圧	90 (17.4)			
糖尿病	41 (7.9)			

2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移

本節では、以下の表を示した。

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量検査の実施状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-5. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-6. 肝炎の状況別、血小板数	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-7. 肝炎の状況別、ALT(GPT)	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-8. 肝炎の状況別、総ビリルビン	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-9. 肝炎の状況別、アルブミン	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-10. 肝炎の状況別、プロトロンビン	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-11. 肝炎の状況別、AFP	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-12. 肝炎の状況別、クレアチニン	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-13. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-14. 肝炎の状況別、肝移植歴	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-15. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-16. 肝炎の状況別、CD4値	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-17. 肝炎の状況別、HIV-RNA量	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-19. 肝炎の状況別、抗HIV薬	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-20. 肝炎の状況別、身体状況	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-21. 肝炎の状況別、日常生活動作	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-22. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ	(平成25年度第4期事業対象者)
表4-2-23. 肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-24. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-25. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-26. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況（平成25年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	1 (4.8)	1 (4.8)	11 (52.4)	8 (38.1)	0	21
陰性	7 (1.6)	55 (12.8)	229 (53.4)	138 (32.2)	4	433
不明	2 (2.9)	8 (11.8)	34 (50.0)	24 (35.3)	6	74
計	10 (1.9)	64 (12.4)	274 (52.9)	170 (32.8)	10	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況（平成25年度第4期事業対象者）

HCV 抗体の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	10 (2.2)	61 (13.7)	256 (57.5)	118 (26.5)	5	450
陰性	0 (0.0)	1 (2.2)	4 (8.9)	40 (88.9)	0	45
不明	0 (0.0)	2 (7.1)	14 (50.0)	12 (42.9)	5	33
計	10 (1.9)	64 (12.4)	274 (52.9)	170 (32.8)	10	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況（平成25年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	HCV 抗体の保有状況			計
	陽性	陰性	不明	
陽性	17 (81.0)	4 (19.0)	0	21
陰性	373 (90.3)	40 (9.7)	20	433
不明	60 (98.4)	1 (1.6)	13	74
計	450 (90.9)	45 (9.1)	33	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量検査の実施状況（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HCV-RNA 定量						計
	実施	検査方法(重複あり)			未実施	不明	
		プローブ法	RT-PCR 法	TaqMan 法			
肝がんあり	6 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (66.7)	3 (33.3)	1	10
肝硬変あり	54 (90.0)	0 (0.0)	4 (6.7)	50 (83.3)	6 (10.0)	4	64
慢性肝炎あり	232 (89.9)	0 (0.0)	22 (8.5)	211 (81.8)	26 (10.1)	16	274
いずれもなし	103 (68.7)	0 (0.0)	1 (0.7)	102 (68.0)	47 (31.3)	20	170
不明	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	6	10
計	399 (83.0)	0 (0.0)	27 (5.6)	373 (77.5)	82 (17.0)	47	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-5. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HCV-RNA 量 (RT-PCR 法) ($\times 10^3$ IU/ml)					計
	0～5 未満	5～100 未満	100～1000 未満	1000～5000 未満	5000 以上	
肝がんあり	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0
肝硬変あり	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4
慢性肝炎あり	4 (16.0)	16 (64.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	3 (12.0)	25
いずれもなし	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0
計	5 (15.6)	20 (62.5)	2 (6.3)	2 (6.3)	3 (9.4)	32

(): 各行の計に対する%

肝炎の状況	HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (LogIU/ml)					計
	検出せず	～3.7 未満	3.7～6.0 未満	6.0～6.7 未満	6.7 以上	
肝がんあり	4 (66.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	6
肝硬変あり	18 (36.0)	1 (2.0)	11 (22.0)	10 (20.0)	10 (20.0)	50
慢性肝炎あり	104 (49.3)	3 (1.4)	25 (11.8)	35 (16.6)	44 (20.9)	211
いずれもなし	98 (96.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	2 (2.0)	0 (0.0)	102
不明	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	4
計	225 (60.3)	6 (1.6)	37 (9.9)	51 (13.7)	54 (14.5)	373

(): 各行の計に対する%

表4-2-6. 肝炎の状況別、血小板数（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	血小板数 ($\times 10^4/\text{mm}^3$)					計
	～15 未満	15～20 未満	20～25 未満	25 以上～	不明	
肝がんあり	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	50 (78.1)	11 (17.2)	2 (3.1)	1 (1.6)	0	64
慢性肝炎あり	85 (31.3)	96 (35.3)	62 (22.8)	29 (10.7)	2	274
いずれもなし	28 (16.6)	47 (27.8)	47 (27.8)	47 (27.8)	1	170
不明	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5	10
計	175 (33.7)	156 (30.0)	112 (21.5)	77 (14.8)	8	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-7. 肝炎の状況別、ALT(GPT)（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	ALT(GPT) (IU/L)					計
	～40 未満	40～80 未満	80～120 未満	120 以上～	不明	
肝がんあり	6 (60.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	30 (46.9)	23 (35.9)	8 (12.5)	3 (4.7)	0	64
慢性肝炎あり	146 (53.7)	82 (30.1)	24 (8.8)	20 (7.4)	2	274
いずれもなし	132 (78.6)	26 (15.5)	6 (3.6)	4 (2.4)	2	170
不明	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5	10
計	316 (60.9)	137 (26.4)	39 (7.5)	27 (5.2)	9	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-8. 肝炎の状況別、総ビリルビン（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	総ビリルビン（mg/dl）					計
	～0.7 未満	0.7～1.3 未満	1.3～1.6 未満	1.6 以上～	不明	
肝がんあり	3 (30.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	0	10
肝硬変あり	19 (30.2)	17 (27.0)	10 (15.9)	17 (27.0)	1	64
慢性肝炎あり	109 (41.3)	115 (43.6)	10 (3.8)	30 (11.4)	10	274
いずれもなし	89 (55.3)	55 (34.2)	4 (2.5)	13 (8.1)	9	170
不明	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5	10
計	222 (44.1)	193 (38.4)	25 (5.0)	63 (12.5)	25	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-9. 肝炎の状況別、アルブミン（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	アルブミン（g/dL）					計
	～3.0 未満	3.0～3.5 未満	3.5～4.0 未満	4.0 以上～	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	0	10
肝硬変あり	4 (6.7)	10 (16.7)	18 (30.0)	28 (46.7)	4	64
慢性肝炎あり	2 (0.8)	3 (1.2)	22 (9.1)	215 (88.8)	32	274
いずれもなし	3 (2.3)	3 (2.3)	6 (4.5)	120 (90.9)	38	170
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	6	10
計	11 (2.5)	17 (3.8)	49 (10.9)	371 (82.8)	80	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-10. 肝炎の状況別、プロトロンビン（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	プロトロンビン PT 活性％（％）					計
	～50 未満	50～70 未満	70～100 未満	100 以上～	不明	
肝がんあり	1 (16.7)	2 (33.3)	2 (33.3)	1 (16.7)	4	10
肝硬変あり	4 (8.0)	11 (22.0)	30 (60.0)	5 (10.0)	14	64
慢性肝炎あり	1 (0.6)	10 (5.8)	124 (72.5)	36 (21.1)	103	274
いずれもなし	2 (2.6)	1 (1.3)	41 (53.9)	32 (42.1)	94	170
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	7	10
計	8 (2.6)	24 (7.8)	200 (65.4)	74 (24.2)	222	528

肝炎の状況	プロトロンビン PT（秒）					計
	～10 未満	10～20 未満	20～30 未満	30 以上～	不明	
肝がんあり	0 —	0 —	0 —	0 —	10	10
肝硬変あり	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	60	64
慢性肝炎あり	1 (16.7)	5 (83.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	268	274
いずれもなし	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	167	170
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	10	10
計	1 (7.7)	12 (92.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	515	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-11. 肝炎の状況別、AFP（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	AFP（ng/mL）					計
	～3 未満	3～6 未満	6～20 未満	20 以上～	不明	
肝がんあり	2 (25.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	3 (37.5)	2	10
肝硬変あり	16 (32.0)	12 (24.0)	14 (28.0)	8 (16.0)	14	64
慢性肝炎あり	75 (43.1)	62 (35.6)	22 (12.6)	15 (8.6)	100	274
いずれもなし	23 (62.2)	12 (32.4)	1 (2.7)	1 (2.7)	133	170
不明	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	8	10
計	116 (42.8)	89 (32.8)	39 (14.4)	27 (10.0)	257	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-12. 肝炎の状況別、クレアチニン（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	クレアチニン (mg/dL)					計
	～0.6 未満	0.6～1.2 未満	1.2～1.8 未満	1.8 以上～	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	13 (20.6)	41 (65.1)	4 (6.3)	5 (7.9)	1	64
慢性肝炎あり	41 (15.8)	203 (78.4)	11 (4.2)	4 (1.5)	15	274
いずれもなし	35 (21.5)	121 (74.2)	3 (1.8)	4 (2.5)	7	170
不明	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7	10
計	91 (18.3)	376 (75.5)	18 (3.6)	13 (2.6)	30	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-13. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤での治療歴						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	7 (70.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0	10
肝硬変あり	40 (63.5)	31 (49.2)	6 (9.5)	3 (4.8)	23 (36.5)	1	64
慢性肝炎あり	168 (62.2)	136 (50.4)	20 (7.4)	12 (4.4)	102 (37.8)	4	274
いずれもなし	54 (32.1)	42 (25.0)	10 (6.0)	2 (1.2)	114 (67.9)	2	170
不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	6	10
計	270 (52.4)	214 (41.6)	38 (7.4)	18 (3.5)	245 (47.6)	13	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-14. 肝炎の状況別、肝移植歴（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	肝移植歴			計
	あり	なし	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	10 (100.0)	0	10
肝硬変あり	1 (1.6)	63 (98.4)	0	64
慢性肝炎あり	2 (0.7)	266 (99.3)	6	274
いずれもなし	3 (1.8)	160 (98.2)	7	170
不明	0 (0.0)	3 (100.0)	7	10
計	6 (1.2)	502 (98.8)	20	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-15. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤の現在の投与状況						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)	0	10
肝硬変あり	4 (6.3)	1 (1.6)	3 (4.7)	0 (0.0)	60 (93.8)	0	64
慢性肝炎あり	17 (6.2)	9 (3.3)	7 (2.6)	1 (0.4)	256 (93.8)	9	282
いずれもなし	2 (1.2)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	167 (98.8)	3	172
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)	6	11
計	23 (4.4)	11 (2.1)	10 (1.9)	2 (0.4)	498 (95.6)	18	539

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

肝炎の状況	インターフェロン製剤の種類（重複あり）						投与あり
	α	コンセンサス	β	ペグ	シメプレビル	不明	
肝がんあり	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
肝硬変あり	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
慢性肝炎あり	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (86.7)	2 (13.3)	2	17
いずれもなし	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1	2
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
計	3 (14.3)	0 (0.0)	1 (4.8)	16 (76.2)	2 (9.5)	3	23

() : 各行のインターフェロン製剤投与ありの数より種類が不明を除いた数を分母とする%

表4-2-16. 肝炎の状況別、CD4値（平成25年度第4期事業対象者）

	CD4 値					計
	～200 未満	200～350 未満	350～500 未満	500 以上	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	0	10
肝硬変あり	13 (20.6)	22 (34.9)	15 (23.8)	13 (20.6)	1	64
慢性肝炎あり	19 (7.0)	46 (16.8)	76 (27.8)	132 (48.4)	1	274
いずれもなし	9 (5.4)	27 (16.1)	48 (28.6)	84 (50.0)	2	170
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	5	10
計	43 (8.3)	98 (18.9)	142 (27.4)	236 (45.5)	9	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-17. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HIV-RNA 量						計
	50 未満*	50～400 未満†	400～1000 未満	1000～10000 未満	10000 以上	不明	
肝がんあり	9 (90.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	63 (98.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	0	64
慢性肝炎あり	245 (89.7)	15 (5.5)	3 (1.1)	6 (2.2)	4 (1.5)	1	274
いずれもなし	153 (90.5)	7 (4.1)	3 (1.8)	5 (3.0)	1 (0.6)	1	170
不明	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5	10
計	475 (91.2)	23 (4.4)	7 (1.3)	12 (2.3)	4 (0.8)	7	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬の併用区分							計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	7 (70.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	0 (0.0)	2 (3.1)	11 (17.2)	13 (20.3)	33 (51.6)	5 (7.8)	0	64
慢性肝炎あり	13 (4.7)	6 (2.2)	56 (20.4)	47 (17.2)	127 (46.4)	25 (9.1)	0	274
いずれもなし	12 (7.1)	1 (0.6)	45 (26.6)	26 (15.4)	66 (39.1)	19 (11.2)	1	170
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5	10
計	25 (4.8)	9 (1.7)	115 (22.0)	88 (16.9)	234 (44.8)	51 (9.8)	6	528

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-19. 肝炎の状況別、抗HIV薬（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬							
	AZT	ddl	ddC	3TC	d4T	AZT/3TC	ABC	TDF
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)
肝硬変あり	1 (1.6)	1 (1.6)	0 (0.0)	13 (20.3)	1 (1.6)	0 (0.0)	6 (9.4)	4 (6.3)
慢性肝炎あり	15 (5.5)	2 (0.7)	0 (0.0)	39 (14.2)	5 (1.8)	7 (2.6)	11 (4.0)	27 (9.9)
いずれもなし	12 (7.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	29 (17.1)	0 (0.0)	2 (1.2)	11 (6.5)	8 (4.7)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
計	28 (5.3)	4 (0.8)	0 (0.0)	81 (15.3)	6 (1.1)	10 (1.9)	29 (5.5)	41 (7.8)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	3TC/ABC	FTC	TDF/FTC	IDV	SQV	RTV	NFV	LPV
肝がんあり	5 (50.0)	0 (0.0)	5 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
肝硬変あり	11 (17.2)	2 (3.1)	25 (39.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (18.8)	2 (3.1)	5 (7.8)
慢性肝炎あり	47 (17.2)	11 (4.0)	123 (44.9)	0 (0.0)	5 (1.8)	56 (20.4)	6 (2.2)	18 (6.6)
いずれもなし	40 (23.5)	0 (0.0)	65 (38.2)	0 (0.0)	1 (0.6)	38 (22.4)	0 (0.0)	16 (9.4)
不明	1 (10.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
計	104 (19.7)	13 (2.5)	221 (41.9)	0 (0.0)	6 (1.1)	110 (20.8)	9 (1.7)	40 (7.6)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	ATV	FPV	DRV	NVP	EFV	DLV	ETR	RPV
肝がんあり	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
肝硬変あり	2 (3.1)	4 (6.3)	9 (14.1)	0 (0.0)	13 (20.3)	0 (0.0)	7 (10.9)	2 (3.1)
慢性肝炎あり	21 (7.7)	9 (3.3)	35 (12.8)	4 (1.5)	39 (14.2)	1 (0.4)	19 (6.9)	14 (5.1)
いずれもなし	16 (9.4)	5 (2.9)	27 (15.9)	3 (1.8)	17 (10.0)	0 (0.0)	12 (7.1)	17 (10.0)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	40 (7.6)	18 (3.4)	74 (14.0)	7 (1.3)	72 (13.6)	1 (0.2)	39 (7.4)	33 (6.3)

肝炎の状況	抗HIV薬							対象者数
	RAL	STB	MVC					
肝がんあり	7 (70.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					10
肝硬変あり	33 (51.6)	0 (0.0)	2 (3.1)					64
慢性肝炎あり	120 (43.8)	7 (2.6)	9 (3.3)					274
いずれもなし	66 (38.8)	0 (0.0)	10 (5.9)					170
不明	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					10
計	227 (43.0)	7 (1.3)	21 (4.0)					528

(): 対象者数を分母とする%

表4-2-20. 肝炎の状況別、身体状況（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
肝がんあり	1 (11.1)	2 (22.2)	6 (66.7)	0 (0.0)	1	10	3 (33.3)
肝硬変あり	6 (9.5)	30 (47.6)	22 (34.9)	5 (7.9)	1	64	36 (57.1)
慢性肝炎あり	77 (28.5)	106 (39.3)	78 (28.9)	9 (3.3)	4	274	183 (67.8)
いずれもなし	54 (32.0)	51 (30.2)	57 (33.7)	7 (4.1)	1	170	105 (62.1)
不明	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5	10	4 (80.0)
計	139 (26.9)	192 (37.2)	164 (31.8)	21 (4.1)	12	528	331 (64.1)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-21. 肝炎の状況別、日常生活動作（平成25年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
肝がんあり	0 (0.0)	4 (44.4)	4 (44.4)	1 (11.1)	1	10	4 (44.4)
肝硬変あり	11 (17.2)	6 (9.4)	18 (28.1)	29 (45.3)	0	64	17 (26.6)
慢性肝炎あり	77 (28.7)	76 (28.4)	66 (24.6)	49 (18.3)	6	274	153 (57.1)
いずれもなし	42 (25.6)	45 (27.4)	38 (23.2)	39 (23.8)	6	170	87 (53.0)
不明	1 (20.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	5	10	4 (80.0)
計	131 (25.7)	134 (26.3)	126 (24.7)	119 (23.3)	18	528	265 (52.0)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-22. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成25年度第4期事業対象者）

A. 肝硬変あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	7 (53.8)	1 (7.7)	0	13
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	7 (53.8)	1 (7.7)	0	13
200 ～350 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.5)	4 (19.0)	14 (66.7)	1 (4.8)	0	21
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	1	0	0	0	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.6)	4 (18.2)	14 (63.6)	1 (4.5)	0	22
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (26.7)	4 (26.7)	5 (33.3)	2 (13.3)	0	15
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (26.7)	4 (26.7)	5 (33.3)	2 (13.3)	0	15
500 以上	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	7 (53.8)	1 (7.7)	0	13
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	7 (53.8)	1 (7.7)	0	13
不明	50未満*	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
計	50未満*	0 (0.0)	2 (3.2)	10 (15.9)	13 (20.6)	33 (52.4)	5 (7.9)	0	63
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	2 (3.1)	11 (17.2)	13 (20.3)	33 (51.6)	5 (7.8)	0	64

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-22 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ (平成25年度第4期事業対象者)

B. 慢性肝炎あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	9 (75.0)	0 (0.0)	0	12
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (5.3)	2 (10.5)	3 (15.8)	13 (68.4)	0 (0.0)	0	19
200 ～350 未満	50未満*	2 (4.5)	1 (2.3)	4 (9.1)	6 (13.6)	24 (54.5)	7 (15.9)	0	44
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (4.3)	1 (2.2)	4 (8.7)	6 (13.0)	26 (56.5)	7 (15.2)	0	46
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (13.4)	16 (23.9)	34 (50.7)	8 (11.9)	0	67
	50～400未満†	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	400～1000未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0	2
	1000～10000未満	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	2 (2.6)	3 (3.9)	10 (13.2)	17 (22.4)	35 (46.1)	9 (11.8)	0	76
500 以上	50未満*	2 (1.7)	0 (0.0)	38 (31.4)	21 (17.4)	51 (42.1)	9 (7.4)	0	121
	50～400未満†	5 (62.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0	8
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	8 (6.1)	1 (0.8)	40 (30.3)	21 (15.9)	53 (40.2)	9 (6.8)	0	132
不明	50未満*	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
計	50未満*	5 (2.0)	1 (0.4)	52 (21.2)	45 (18.4)	118 (48.2)	24 (9.8)	0	245
	50～400未満†	5 (33.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	1 (6.7)	5 (33.3)	0 (0.0)	0	15
	400～1000未満	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0	3
	1000～10000未満	1 (16.7)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (50.0)	0 (0.0)	0	6
	10000以上	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	13 (4.7)	6 (2.2)	56 (20.4)	47 (17.2)	127 (46.4)	25 (9.1)	0	274

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満 (検出限界値 50 以下) を含む

†: 検出限界未満 (検出限界値 51～400、不明) を含む

表4-2-22 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成25年度第4期事業対象者）

C. いずれもなし

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	4 (57.1)	1 (14.3)	0	7
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (11.1)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	4 (44.4)	1 (11.1)	0	9
200 ～350未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (25.0)	4 (16.7)	12 (50.0)	2 (8.3)	0	24
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (29.6)	4 (14.8)	12 (44.4)	3 (11.1)	0	27
350 ～500未満	50未満*	3 (7.1)	0 (0.0)	11 (26.2)	6 (14.3)	19 (45.2)	3 (7.1)	0	42
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	1000～10000未満	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	8 (16.7)	0 (0.0)	11 (22.9)	6 (12.5)	20 (41.7)	3 (6.3)	0	48
500以上	50未満*	0 (0.0)	1 (1.3)	24 (30.4)	14 (17.7)	29 (36.7)	11 (13.9)	0	79
	50～400未満†	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0	4
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (3.6)	1 (1.2)	24 (28.6)	14 (16.7)	30 (35.7)	12 (14.3)	0	84
不明	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	1	1
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	2
計	50未満*	3 (2.0)	1 (0.7)	42 (27.5)	26 (17.0)	64 (41.8)	17 (11.1)	0	153
	50～400未満†	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0	7
	400～1000未満	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	1000～10000未満	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	1	1
	計	12 (7.1)	1 (0.6)	45 (26.6)	26 (15.4)	66 (39.1)	19 (11.2)	1	170

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-23. 肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象者）

年度	肝炎の状況							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (1.0)	49 (8.1)	431 (70.9)	122 (20.1)	25	—	—	633
平成18年度	5 (0.8)	47 (7.6)	412 (67.0)	133 (21.6)	18	3 (0.5)	15 (2.4)	633
平成19年度	4 (0.7)	43 (7.0)	396 (64.5)	137 (22.3)	19	5 (0.8)	29 (4.7)	633
平成20年度	8 (1.3)	48 (7.7)	360 (57.9)	153 (24.6)	11	9 (1.4)	44 (7.1)	633
平成21年度	8 (1.3)	49 (8.0)	340 (55.2)	146 (23.7)	17	16 (2.6)	57 (9.3)	633
平成22年度	6 (1.0)	57 (9.1)	334 (53.5)	146 (23.4)	9	16 (2.6)	65 (10.4)	633
平成23年度	6 (1.0)	57 (9.1)	323 (51.6)	145 (23.2)	7	20 (3.2)	75 (12.0)	633
平成24年度	5 (0.8)	58 (9.4)	315 (50.8)	140 (22.6)	13	21 (3.4)	81 (13.1)	633
平成25年度	12 (1.9)	65 (10.4)	270 (43.3)	165 (26.5)	10	23 (3.7)	88 (14.1)	633

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-24. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝がんあり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (100.0)	—	—	—	—	—	—	6
平成18年度	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (50.0)	6
平成19年度	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	0 (0.0)	4 (80.0)	6
平成20年度	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	5 (83.3)	6
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成23年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成25年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝硬変あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	49 (100.0)	—	—	—	—	—	49
平成18年度	0 (0.0)	33 (67.3)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	1 (2.0)	6 (12.2)	49
平成19年度	1 (2.0)	24 (49.0)	7 (14.3)	3 (6.1)	0	2 (4.1)	12 (24.5)	49
平成20年度	1 (2.0)	21 (42.9)	8 (16.3)	2 (4.1)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成21年度	2 (4.1)	22 (44.9)	7 (14.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成22年度	2 (4.2)	21 (43.8)	5 (10.4)	3 (6.3)	1	2 (4.2)	15 (31.3)	49
平成23年度	1 (2.0)	20 (40.8)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	17 (34.7)	49
平成24年度	2 (4.2)	19 (39.6)	6 (12.5)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	17 (35.4)	49
平成25年度	3 (6.3)	20 (41.7)	3 (6.3)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	18 (37.5)	49

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝慢性肝炎あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	431 (100.0)	—	—	—	—	431
平成18年度	2 (0.5)	11 (2.6)	376 (89.7)	27 (6.4)	12	2 (0.5)	1 (0.2)	431
平成19年度	2 (0.5)	17 (4.0)	355 (84.3)	37 (8.8)	10	3 (0.7)	7 (1.7)	431
平成20年度	6 (1.4)	24 (5.7)	321 (75.7)	54 (12.7)	7	5 (1.2)	14 (3.3)	431
平成21年度	6 (1.4)	25 (6.0)	302 (72.2)	52 (12.4)	13	10 (2.4)	23 (5.5)	431
平成22年度	4 (0.9)	33 (7.7)	296 (69.2)	54 (12.6)	3	10 (2.3)	31 (7.2)	431
平成23年度	5 (1.2)	33 (7.7)	281 (65.8)	58 (13.6)	4	14 (3.3)	36 (8.4)	431
平成24年度	3 (0.7)	36 (8.5)	275 (64.6)	56 (13.1)	4	15 (3.5)	41 (9.6)	430
平成25年度	8 (1.9)	40 (9.4)	239 (56.4)	77 (18.2)	5	17 (4.0)	43 (10.1)	429

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝いずれもなし の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	122 (100.0)	—	—	—	122
平成18年度	0 (0.0)	1 (0.8)	20 (16.9)	97 (82.2)	4	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成19年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.9)	90 (78.3)	7	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成20年度	0 (0.0)	2 (1.7)	21 (17.8)	90 (76.3)	4	1 (0.8)	4 (3.4)	122
平成21年度	0 (0.0)	1 (0.8)	22 (18.6)	86 (72.9)	4	2 (1.7)	7 (5.9)	122
平成22年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.5)	83 (70.9)	5	2 (1.7)	7 (6.0)	122
平成23年度	0 (0.0)	3 (2.5)	24 (20.0)	82 (68.3)	2	2 (1.7)	9 (7.5)	122
平成24年度	0 (0.0)	2 (1.7)	24 (20.5)	79 (67.5)	5	2 (1.7)	10 (8.5)	122
平成25年度	1 (0.8)	3 (2.5)	20 (16.4)	82 (67.2)	0	2 (1.6)	14 (11.5)	122

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-24 (続き)。観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	肝炎の状況：平成17年度＝不明の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	—	25	—	—	25
平成18年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	8 (34.8)	2	0 (0.0)	5 (21.7)	25
平成19年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	7 (29.2)	1	0 (0.0)	6 (25.0)	25
平成20年度	0 (0.0)	1 (4.0)	10 (40.0)	7 (28.0)	0	1 (4.0)	6 (24.0)	25
平成21年度	0 (0.0)	1 (4.0)	9 (36.0)	7 (28.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成22年度	0 (0.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	6 (24.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成23年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	4 (16.7)	1	2 (8.3)	7 (29.2)	25
平成24年度	0 (0.0)	1 (4.3)	10 (43.5)	3 (13.0)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25
平成25年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	4 (17.4)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-25。観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	HBs抗原の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	3 (7.7)	32 (82.1)	4 (10.3)	0	—	—	39
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.6)	30 (78.9)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	0 (0.0)	39
平成19年度	1 (2.7)	1 (2.7)	29 (78.4)	5 (13.5)	2	1 (2.7)	0 (0.0)	39
平成20年度	1 (2.6)	1 (2.6)	27 (69.2)	8 (20.5)	0	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成21年度	1 (2.6)	1 (2.6)	28 (73.7)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成22年度	1 (2.6)	1 (2.6)	25 (64.1)	9 (23.1)	0	1 (2.6)	2 (5.1)	39
平成23年度	0 (0.0)	3 (7.7)	27 (69.2)	5 (12.8)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39
平成24年度	1 (2.6)	1 (2.6)	24 (63.2)	8 (21.1)	1	1 (2.6)	3 (7.9)	39
平成25年度	1 (2.6)	3 (7.7)	21 (53.8)	10 (25.6)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39

年度	HBs抗原の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.1)	44 (9.5)	320 (69.1)	94 (20.3)	9	—	—	472
平成18年度	4 (0.9)	43 (9.3)	307 (66.3)	100 (21.6)	9	0 (0.0)	9 (1.9)	472
平成19年度	3 (0.7)	38 (8.2)	290 (62.9)	106 (23.0)	11	2 (0.4)	22 (4.8)	472
平成20年度	6 (1.3)	42 (9.0)	267 (57.4)	112 (24.1)	7	4 (0.9)	34 (7.3)	472
平成21年度	4 (0.9)	43 (9.3)	253 (54.9)	109 (23.6)	11	9 (2.0)	43 (9.3)	472
平成22年度	4 (0.9)	50 (10.8)	239 (51.4)	114 (24.5)	7	9 (1.9)	49 (10.5)	472
平成23年度	6 (1.3)	46 (9.9)	233 (50.0)	111 (23.8)	6	13 (2.8)	57 (12.2)	472
平成24年度	3 (0.6)	50 (10.8)	225 (48.6)	108 (23.3)	9	14 (3.0)	63 (13.6)	472
平成25年度	10 (2.1)	50 (10.7)	197 (42.3)	124 (26.6)	6	16 (3.4)	69 (14.8)	472

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-26. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.0)	45 (8.6)	401 (77.0)	70 (13.4)	10	—	—	531
平成18年度	4 (0.8)	45 (8.7)	377 (72.8)	80 (15.4)	13	2 (0.4)	10 (1.9)	531
平成19年度	3 (0.6)	40 (7.8)	356 (69.5)	86 (16.8)	19	4 (0.8)	23 (4.5)	531
平成20年度	7 (1.3)	47 (9.0)	325 (62.4)	100 (19.2)	10	6 (1.2)	36 (6.9)	531
平成21年度	8 (1.5)	47 (9.1)	308 (59.6)	96 (18.6)	14	12 (2.3)	46 (8.9)	531
平成22年度	6 (1.1)	56 (10.7)	298 (56.9)	99 (18.9)	7	12 (2.3)	53 (10.1)	531
平成23年度	6 (1.1)	53 (10.1)	289 (55.0)	99 (18.9)	6	16 (3.0)	62 (11.8)	531
平成24年度	5 (1.0)	56 (10.7)	283 (54.3)	93 (17.9)	10	17 (3.3)	67 (12.9)	531
平成25年度	12 (2.3)	60 (11.5)	245 (46.9)	113 (21.6)	9	19 (3.6)	73 (14.0)	531

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	2 (4.7)	5 (11.6)	36 (83.7)	2	—	—	45
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.2)	6 (13.3)	38 (84.4)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	45
平成19年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (17.8)	36 (80.0)	0	0 (0.0)	1 (2.2)	45
平成20年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	34 (77.3)	1	1 (2.3)	2 (4.5)	45
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (16.3)	32 (74.4)	2	1 (2.3)	3 (7.0)	45
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成23年度	0 (0.0)	1 (2.3)	6 (13.6)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (14.3)	32 (76.2)	3	1 (2.4)	3 (7.1)	45
平成25年度	0 (0.0)	2 (4.4)	4 (8.9)	34 (75.6)	0	1 (2.2)	4 (8.9)	45

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

	CD4 値					計	中央値
	～200 未満	200～ 350 未満	350～ 500 未満	500 以上	不明		
平成5年度 第1期	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	379	385	163
平成6年度 第1期	103 (32.7)	95 (30.2)	68 (21.6)	49 (15.6)	148	463	288
平成7年度 第1期	134 (36.2)	99 (26.8)	87 (23.5)	50 (13.5)	120	490	277
平成8年度 第1期	141 (34.4)	117 (28.5)	93 (22.7)	59 (14.4)	143	553	286
平成9年度 第1期	136 (25.2)	148 (27.4)	139 (25.7)	117 (21.7)	81	621	332
平成10年度 第1期	104 (17.8)	177 (30.4)	155 (26.6)	147 (25.2)	75	658	356
平成11年度 第1期	79 (13.0)	178 (29.3)	182 (29.9)	169 (27.8)	58	666	389
平成12年度 第1期	83 (13.8)	167 (27.8)	175 (29.1)	176 (29.3)	76	677	394
平成13年度 第1期	71 (12.2)	154 (26.4)	179 (30.7)	179 (30.7)	83	666	398
平成14年度 第1期	68 (11.3)	169 (28.2)	156 (26.0)	207 (34.5)	66	666	412
平成15年度 第1期	74 (13.0)	157 (27.6)	166 (29.2)	171 (30.1)	94	662	402
平成16年度 第1期	74 (12.7)	150 (25.7)	165 (28.3)	195 (33.4)	61	645	408
平成17年度 第1期	59 (10.5)	157 (27.9)	152 (27.0)	194 (34.5)	71	633	408
平成18年度 第1期	77 (13.6)	154 (27.3)	136 (24.1)	198 (35.0)	52	617	395
平成19年度 第1期	67 (12.2)	172 (31.4)	136 (24.9)	172 (31.4)	54	601	381
平成20年度 第1期	70 (13.0)	155 (28.9)	155 (28.9)	157 (29.2)	49	586	389
平成21年度 第1期	50 (9.5)	141 (26.7)	127 (24.1)	210 (39.8)	38	566	432
平成22年度 第1期	56 (10.6)	133 (25.3)	153 (29.1)	184 (35.0)	32	558	432
平成23年度 第1期	49 (9.6)	118 (23.1)	150 (29.4)	193 (37.8)	37	547	442
第2期	46 (8.9)	127 (24.6)	136 (26.4)	207 (40.1)	30	546	441
第3期	48 (9.5)	116 (22.9)	139 (27.4)	204 (40.2)	38	545	447
第4期	47 (9.7)	103 (21.2)	134 (27.6)	201 (41.4)	57	542	440
平成24年度 第1期	37 (7.4)	107 (21.4)	149 (29.7)	208 (41.5)	39	540	459
第2期	37 (7.4)	117 (23.4)	140 (28.1)	205 (41.1)	38	537	449
第3期	35 (7.0)	118 (23.7)	131 (26.4)	213 (42.9)	38	535	467
第4期	31 (6.9)	102 (22.7)	121 (26.9)	196 (43.6)	84	534	467
平成25年度 第1期	34 (6.8)	117 (23.5)	120 (24.1)	226 (45.5)	34	531	469
第2期	40 (8.0)	96 (19.2)	149 (29.7)	216 (43.1)	29	530	465
第3期	41 (8.2)	91 (18.1)	139 (27.6)	232 (46.1)	24	527	473
第4期	29 (6.4)	93 (20.7)	124 (27.6)	204 (45.3)	78	528	481

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

	CD4/CD8比						計	中央値
	～0.10未満	0.10～ 0.50未満	0.50～ 1.00未満	1.00～ 1.50未満	1.50以上	不明		
平成5年度 第1期	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	379	385	0.17
平成6年度 第1期	45 (14.5)	168 (54.2)	90 (29.0)	4 (1.3)	3 (1.0)	153	463	0.31
平成7年度 第1期	45 (12.2)	199 (53.8)	114 (30.8)	12 (3.2)	0 (0.0)	120	490	0.34
平成8年度 第1期	59 (14.5)	231 (56.6)	109 (26.7)	8 (2.0)	1 (0.2)	145	553	0.34
平成9年度 第1期	31 (5.9)	281 (53.6)	185 (35.3)	26 (5.0)	1 (0.2)	97	621	0.40
平成10年度 第1期	18 (3.1)	280 (48.4)	241 (41.6)	37 (6.4)	3 (0.5)	79	658	0.48
平成11年度 第1期	20 (3.4)	283 (48.3)	227 (38.7)	50 (8.5)	6 (1.0)	80	666	0.48
平成12年度 第1期	11 (1.9)	273 (46.9)	236 (40.5)	50 (8.6)	12 (2.1)	95	677	0.50
平成13年度 第1期	11 (2.0)	244 (43.5)	239 (42.6)	52 (9.3)	15 (2.7)	105	666	0.51
平成14年度 第1期	9 (1.6)	249 (43.6)	236 (41.3)	60 (10.5)	17 (3.0)	95	666	0.52
平成15年度 第1期	8 (1.5)	227 (42.2)	222 (41.3)	61 (11.3)	20 (3.7)	124	662	0.54
平成16年度 第1期	10 (1.8)	219 (40.4)	231 (42.6)	60 (11.1)	22 (4.1)	103	645	0.55
平成17年度 第1期	11 (2.1)	204 (38.3)	234 (43.9)	59 (11.1)	25 (4.7)	100	633	0.57
平成18年度 第1期	11 (2.1)	175 (33.2)	243 (46.1)	64 (12.1)	34 (6.5)	90	617	0.60
平成19年度 第1期	4 (0.8)	189 (36.7)	213 (41.4)	81 (15.7)	28 (5.4)	86	601	0.59
平成20年度 第1期	7 (1.4)	165 (32.1)	232 (45.1)	86 (16.7)	24 (4.7)	72	586	0.61
平成21年度 第1期	6 (1.2)	147 (30.1)	208 (42.5)	98 (20.0)	30 (6.1)	77	566	0.67
平成22年度 第1期	6 (1.2)	132 (26.7)	231 (46.7)	91 (18.4)	35 (7.1)	63	558	0.70
平成23年度 第1期	3 (0.6)	122 (25.5)	220 (46.0)	84 (17.6)	49 (10.3)	69	547	0.72
第2期	1 (0.2)	115 (23.7)	225 (46.4)	101 (20.8)	43 (8.9)	61	546	0.71
第3期	1 (0.2)	110 (22.9)	222 (46.3)	104 (21.7)	43 (9.0)	65	545	0.73
第4期	3 (0.7)	102 (22.3)	219 (47.9)	83 (18.2)	50 (10.9)	85	542	0.74
平成24年度 第1期	1 (0.2)	104 (22.0)	220 (46.6)	98 (20.8)	49 (10.4)	68	540	0.76
第2期	0 (0.0)	103 (21.9)	210 (44.6)	110 (23.4)	48 (10.2)	66	537	0.79
第3期	1 (0.2)	104 (22.3)	203 (43.5)	105 (22.5)	54 (11.6)	68	535	0.80
第4期	1 (0.2)	87 (20.5)	183 (43.2)	102 (24.1)	51 (12.0)	110	534	0.80
平成25年度 第1期	1 (0.2)	103 (21.7)	217 (45.7)	96 (20.2)	58 (12.2)	56	531	0.75
第2期	1 (0.2)	92 (19.4)	230 (48.4)	95 (20.0)	57 (12.0)	55	530	0.78
第3期	2 (0.4)	82 (17.2)	231 (48.4)	108 (22.6)	54 (11.3)	50	527	0.80
第4期	2 (0.5)	79 (18.5)	196 (46.0)	93 (21.8)	56 (13.1)	102	528	0.80

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

	身体状況の総合スコア					計	1～3未満 (再掲)
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	不明		
平成5年度 第1期	214 (56.8)	101 (26.8)	50 (13.3)	12 (3.2)	8	385	315 (83.6)
平成6年度 第1期	254 (56.1)	135 (29.8)	51 (11.3)	13 (2.9)	10	463	389 (85.9)
平成7年度 第1期	269 (55.5)	140 (28.9)	61 (12.6)	15 (3.1)	5	490	409 (84.2)
平成8年度 第1期	293 (53.8)	162 (29.7)	75 (13.8)	15 (2.8)	8	553	455 (83.0)
平成9年度 第1期	232 (39.9)	233 (40.0)	110 (18.9)	7 (1.2)	39	621	465 (79.9)
平成10年度 第1期	217 (35.4)	268 (43.7)	121 (19.7)	7 (1.1)	45	658	485 (79.1)
平成11年度 第1期	217 (34.3)	247 (39.0)	157 (24.8)	12 (1.9)	33	666	464 (73.3)
平成12年度 第1期	197 (31.2)	268 (42.4)	156 (24.7)	11 (1.7)	45	677	465 (73.6)
平成13年度 第1期	187 (29.5)	261 (41.2)	175 (27.6)	11 (1.7)	32	666	448 (70.7)
平成14年度 第1期	191 (29.8)	280 (43.6)	157 (24.5)	14 (2.2)	24	666	471 (73.4)
平成15年度 第1期	177 (28.0)	253 (40.0)	184 (29.1)	19 (3.0)	29	662	430 (67.9)
平成16年度 第1期	166 (27.0)	268 (43.6)	160 (26.1)	20 (3.3)	31	645	434 (70.7)
平成17年度 第1期	160 (26.7)	257 (42.8)	168 (28.0)	15 (2.5)	33	633	417 (69.5)
平成18年度 第1期	157 (26.1)	241 (40.1)	183 (30.4)	20 (3.3)	16	617	398 (66.1)
平成19年度 第1期	154 (26.7)	240 (41.6)	163 (28.2)	20 (3.5)	24	601	394 (68.3)
平成20年度 第1期	151 (26.5)	233 (40.9)	162 (28.4)	24 (4.2)	16	586	384 (67.4)
平成21年度 第1期	137 (25.0)	230 (42.0)	168 (30.7)	12 (2.2)	19	566	367 (67.0)
平成22年度 第1期	143 (26.3)	216 (39.8)	165 (30.4)	19 (3.5)	15	558	359 (66.1)
平成23年度 第1期	137 (25.8)	219 (41.2)	152 (28.6)	24 (4.5)	15	547	356 (66.9)
第2期	141 (26.8)	205 (38.9)	155 (29.4)	26 (4.9)	19	546	346 (65.5)
第3期	141 (26.5)	207 (38.9)	162 (30.5)	22 (4.1)	13	545	348 (65.2)
第4期	146 (27.6)	203 (38.4)	160 (30.2)	20 (3.8)	13	542	349 (65.6)
平成24年度 第1期	144 (27.6)	205 (39.3)	160 (30.7)	13 (2.5)	18	540	349 (66.6)
第2期	148 (28.6)	194 (37.5)	157 (30.4)	18 (3.5)	20	537	342 (65.9)
第3期	151 (29.0)	186 (35.7)	167 (32.1)	17 (3.3)	14	535	337 (64.4)
第4期	150 (29.0)	187 (36.1)	167 (32.2)	14 (2.7)	16	534	337 (64.8)
平成25年度 第1期	133 (26.1)	206 (40.5)	156 (30.6)	14 (2.8)	22	531	339 (66.5)
第2期	140 (27.6)	186 (36.6)	165 (32.5)	17 (3.3)	22	530	326 (64.2)
第3期	138 (27.3)	187 (37.0)	162 (32.0)	19 (3.8)	21	527	325 (64.2)
第4期	138 (26.8)	189 (36.7)	167 (32.4)	21 (4.1)	13	528	327 (63.5)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4~8)	不明		
平成5年度 第1期	236 (66.5)	86 (24.2)	19 (5.4)	14 (3.9)	30	385	322 (90.7)
平成6年度 第1期	280 (67.8)	90 (21.8)	22 (5.3)	21 (5.1)	50	463	370 (89.6)
平成7年度 第1期	287 (66.3)	103 (23.8)	17 (3.9)	26 (6.0)	57	490	390 (90.1)
平成8年度 第1期	330 (66.8)	110 (22.3)	28 (5.7)	26 (5.3)	59	553	440 (89.1)
平成9年度 第1期	236 (43.5)	159 (29.3)	75 (13.8)	73 (13.4)	78	621	395 (72.7)
平成10年度 第1期	230 (40.4)	181 (31.8)	88 (15.4)	71 (12.5)	88	658	411 (72.1)
平成11年度 第1期	224 (37.9)	199 (33.7)	83 (14.0)	85 (14.4)	75	666	423 (71.6)
平成12年度 第1期	202 (34.9)	197 (34.1)	88 (15.2)	91 (15.7)	99	677	399 (69.0)
平成13年度 第1期	196 (33.9)	196 (33.9)	99 (17.1)	88 (15.2)	87	666	392 (67.7)
平成14年度 第1期	192 (32.5)	205 (34.7)	106 (17.9)	88 (14.9)	75	666	397 (67.2)
平成15年度 第1期	176 (30.5)	186 (32.2)	121 (21.0)	94 (16.3)	85	662	362 (62.7)
平成16年度 第1期	171 (28.0)	191 (31.3)	139 (22.7)	110 (18.0)	34	645	362 (59.2)
平成17年度 第1期	173 (29.1)	191 (32.1)	117 (19.7)	114 (19.2)	38	633	364 (61.2)
平成18年度 第1期	155 (25.1)	186 (30.1)	124 (20.1)	123 (19.9)	29	617	341 (55.3)
平成19年度 第1期	153 (27.0)	182 (32.1)	124 (21.9)	108 (19.0)	34	601	335 (59.1)
平成20年度 第1期	145 (25.5)	175 (30.8)	140 (24.6)	109 (19.2)	17	586	320 (56.2)
平成21年度 第1期	143 (26.4)	165 (30.5)	135 (25.0)	98 (18.1)	25	566	308 (56.9)
平成22年度 第1期	140 (25.7)	167 (30.6)	122 (22.4)	116 (21.3)	13	558	307 (56.3)
平成23年度 第1期	138 (25.2)	159 (29.1)	122 (22.3)	109 (19.9)	19	547	297 (54.3)
第2期	142 (27.0)	150 (28.6)	125 (23.8)	108 (20.6)	21	546	292 (55.6)
第3期	140 (26.6)	152 (28.8)	121 (23.0)	114 (21.6)	18	545	292 (55.4)
第4期	140 (25.8)	150 (27.7)	123 (22.7)	110 (20.3)	19	542	290 (53.5)
平成24年度 第1期	139 (26.7)	151 (29.0)	120 (23.0)	111 (21.3)	19	540	290 (55.7)
第2期	138 (26.7)	142 (27.5)	125 (24.2)	111 (21.5)	21	537	280 (54.3)
第3期	132 (25.8)	147 (28.7)	116 (22.7)	117 (22.9)	23	535	279 (54.5)
第4期	131 (25.3)	148 (28.6)	120 (23.2)	118 (22.8)	17	534	279 (54.0)
平成25年度 第1期	129 (25.3)	143 (28.1)	123 (24.2)	114 (22.4)	22	531	272 (53.4)
第2期	131 (25.8)	134 (26.4)	129 (25.4)	113 (22.3)	23	530	265 (52.3)
第3期	128 (25.3)	135 (26.7)	131 (25.9)	112 (22.1)	21	527	263 (52.0)
第4期	132 (25.9)	134 (26.3)	125 (24.6)	118 (23.2)	19	528	266 (52.3)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

	HIV-RNA 量					計	中央値
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	不明		
平成9年度 第1期	109 (30.0)	30 (8.3)	112 (30.9)	112 (30.9)	258	621	2600
平成10年度 第1期	207 (38.3)	71 (13.1)	161 (29.8)	102 (18.9)	117	658	930
平成11年度 第1期	284 (48.6)	52 (8.9)	161 (27.6)	87 (14.9)	82	666	435
平成12年度 第1期	325 (55.1)	48 (8.1)	135 (22.9)	82 (13.9)	87	677	400 未満
平成13年度 第1期	346 (59.9)	39 (6.7)	118 (20.4)	75 (13.0)	88	666	400 未満
平成14年度 第1期	356 (60.4)	48 (8.1)	113 (19.2)	72 (12.2)	77	666	400 未満
平成15年度 第1期	353 (62.5)	34 (6.0)	93 (16.5)	85 (15.0)	97	662	400 未満
平成16年度 第1期	371 (64.0)	40 (6.9)	86 (14.8)	83 (14.3)	65	645	400 未満
平成17年度 第1期	380 (68.7)	24 (4.3)	71 (12.8)	78 (14.1)	80	633	400 未満
平成18年度 第1期	410 (73.5)	29 (5.2)	68 (12.2)	51 (9.1)	59	617	400 未満
平成19年度 第1期	414 (76.2)	27 (5.0)	51 (9.4)	51 (9.4)	58	601	400 未満
平成20年度 第1期	415 (77.9)	37 (6.9)	44 (8.3)	37 (6.9)	53	586	400 未満
平成21年度 第1期	443 (84.9)	16 (3.1)	32 (6.1)	31 (5.9)	44	566	400 未満
平成22年度 第1期	467 (90.0)	8 (1.5)	33 (6.4)	11 (2.1)	39	558	400 未満
平成23年度 第1期	460 (90.0)	13 (2.5)	23 (4.5)	15 (2.9)	36	547	400 未満
第2期	469 (91.2)	10 (1.9)	21 (4.1)	14 (2.7)	32	546	400 未満
第3期	463 (91.3)	11 (2.2)	20 (3.9)	13 (2.6)	38	545	400 未満
第4期	438 (89.9)	8 (1.6)	24 (4.9)	17 (3.5)	55	542	400 未満
平成24年度 第1期	461 (91.5)	10 (2.0)	18 (3.6)	15 (3.0)	36	540	400 未満
第2期	469 (92.7)	10 (2.0)	11 (2.2)	16 (3.2)	31	537	400 未満
第3期	472 (93.5)	9 (1.8)	11 (2.2)	13 (2.6)	30	535	400 未満
第4期	421 (93.8)	8 (1.8)	8 (1.8)	12 (2.7)	85	534	400 未満
平成25年度 第1期	470 (94.6)	8 (1.6)	12 (2.4)	7 (1.4)	34	531	400 未満
第2期	472 (95.0)	6 (1.2)	12 (2.4)	7 (1.4)	33	530	400 未満
第3期	483 (96.0)	6 (1.2)	10 (2.0)	4 (0.8)	24	527	400 未満
第4期	437 (96.3)	5 (1.1)	8 (1.8)	4 (0.9)	74	528	400 未満

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分								計	
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	その他	不明		
平成5年度 第1期	4 (57.1)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	378	385	
平成6年度 第1期	128 (39.4)	28 (8.6)	128 (39.4)	41 (12.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	138	463	
平成7年度 第1期	128 (34.0)	39 (10.4)	147 (39.1)	62 (16.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	114	490	
平成8年度 第1期	133 (32.0)	33 (8.0)	155 (37.3)	93 (22.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	138	553	
平成9年度 第1期	132 (23.7)	20 (3.6)	58 (10.4)	220 (39.5)	92 (16.5)	0 (0.0)	35 (6.3)	64	621	
平成10年度 第1期	128 (21.1)	31 (5.1)	24 (3.9)	168 (27.6)	229 (37.7)	2 (0.3)	26 (4.3)	50	658	
平成11年度 第1期	126 (20.2)	30 (4.8)	17 (2.7)	125 (20.1)	299 (48.0)	6 (1.0)	20 (3.2)	43	666	
平成12年度 第1期	119 (19.2)	41 (6.6)	12 (1.9)	96 (15.5)	279 (44.9)	34 (5.5)	40 (6.4)	56	677	
平成13年度 第1期	98 (16.3)	33 (5.5)	12 (2.0)	83 (13.8)	275 (45.6)	63 (10.4)	39 (6.5)	63	666	
平成14年度 第1期	113 (17.9)	51 (8.1)	6 (1.0)	77 (12.2)	251 (39.8)	90 (14.3)	42 (6.7)	36	666	
平成15年度 第1期	100 (16.6)	63 (10.4)	4 (0.7)	66 (10.9)	223 (36.9)	97 (16.1)	51 (8.4)	58	662	
平成16年度 第1期	107 (17.0)	67 (10.6)	4 (0.6)	58 (9.2)	239 (37.9)	111 (17.6)	45 (7.1)	14	645	
平成17年度 第1期	98 (16.0)	65 (10.6)	3 (0.5)	54 (8.8)	229 (37.4)	111 (18.1)	53 (8.6)	20	633	
平成18年度 第1期	91 (15.2)	60 (10.1)	5 (0.8)	39 (6.5)	241 (40.4)	114 (19.1)	47 (7.9)	20	617	
平成19年度 第1期	76 (13.1)	45 (7.7)	3 (0.5)	31 (5.3)	267 (45.9)	113 (19.4)	47 (8.1)	19	601	
平成20年度 第1期	70 (12.2)	33 (5.7)	2 (0.3)	29 (5.0)	275 (47.7)	112 (19.4)	55 (9.5)	10	586	
平成21年度 第1期	63 (11.2)	28 (5.0)	1 (0.2)	22 (3.9)	243 (43.3)	111 (19.8)	93 (16.6)	5	566	
平成22年度 第1期	54 (9.8)	26 (4.7)	1 (0.2)	17 (3.1)	212 (38.4)	108 (19.6)	134 (24.3)	6	558	
平成23年度	第1期	47 (8.6)	26 (4.8)	1 (0.2)	14 (2.6)	188 (34.4)	99 (18.1)	171 (31.3)	1	547
	第2期	45 (8.3)	23 (4.2)	1 (0.2)	15 (2.8)	186 (34.1)	98 (18.0)	177 (32.5)	1	546
	第3期	44 (8.1)	23 (4.2)	0 (0.0)	14 (2.6)	179 (32.9)	97 (17.8)	187 (34.4)	1	545
	第4期	42 (7.8)	19 (3.5)	0 (0.0)	14 (2.6)	177 (33.0)	92 (17.1)	193 (35.9)	5	542
平成24年度	第1期	39 (7.4)	16 (3.0)	0 (0.0)	13 (2.5)	164 (31.0)	87 (16.4)	210 (39.7)	11	540
	第2期	38 (7.2)	14 (2.6)	0 (0.0)	11 (2.1)	154 (29.1)	88 (16.6)	224 (42.3)	8	537
	第3期	37 (7.0)	12 (2.3)	0 (0.0)	12 (2.3)	144 (27.3)	88 (16.7)	235 (44.5)	7	535
	第4期	33 (6.3)	12 (2.3)	0 (0.0)	11 (2.1)	140 (26.6)	92 (17.5)	238 (45.2)	8	534
平成25年度	第1期	30 (5.7)	12 (2.3)	0 (0.0)	9 (1.7)	129 (24.6)	90 (17.1)	255 (48.6)	6	531
	第2期	27 (5.2)	10 (1.9)	0 (0.0)	8 (1.5)	124 (23.7)	90 (17.2)	265 (50.6)	6	530
	第3期	26 (5.0)	9 (1.7)	0 (0.0)	8 (1.5)	117 (22.5)	89 (17.1)	271 (52.1)	7	527
	第4期	25 (4.8)	12 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.3)	114 (22.0)	85 (16.4)	276 (53.2)	9	528

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

	服 用 状 況						投与 なし	投与 不明	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明			
平成9年度 第1期	301 (78.6)	45 (11.7)	25 (6.5)	8 (2.1)	4 (1.0)	22	152	64	621
平成10年度 第1期	346 (79.9)	57 (13.2)	21 (4.8)	6 (1.4)	3 (0.7)	16	159	50	658
平成11年度 第1期	377 (84.0)	54 (12.0)	12 (2.7)	6 (1.3)	0 (0.0)	18	156	43	666
平成12年度 第1期	376 (86.0)	39 (8.9)	14 (3.2)	8 (1.8)	0 (0.0)	24	160	56	677
平成13年度 第1期	378 (85.3)	43 (9.7)	14 (3.2)	7 (1.6)	1 (0.2)	29	131	63	666
平成14年度 第1期	388 (87.8)	34 (7.7)	14 (3.2)	6 (1.4)	0 (0.0)	24	164	36	666
平成15年度 第1期	380 (89.6)	32 (7.5)	9 (2.1)	3 (0.7)	0 (0.0)	17	163	58	662
平成16年度 第1期	403 (88.4)	34 (7.5)	9 (2.0)	5 (1.1)	5 (1.1)	1	174	14	645
平成17年度 第1期	407 (90.8)	20 (4.5)	10 (2.2)	6 (1.3)	5 (1.1)	2	163	20	633
平成18年度 第1期	406 (91.0)	21 (4.7)	12 (2.7)	6 (1.3)	1 (0.2)	0	151	20	617
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	121	19	601
平成20年度 第1期	439 (93.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.6)	4	103	10	586
平成21年度 第1期	438 (93.8)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	91	5	566
平成22年度 第1期	438 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	80	6	558
平成23年度 第1期	453 (96.4)	9 (1.9)	5 (1.1)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	73	1	547
第2期	455 (96.0)	10 (2.1)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.1)	3	68	1	546
第3期	457 (96.4)	8 (1.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	6 (1.3)	3	67	1	545
第4期	453 (96.4)	8 (1.7)	4 (0.9)	0 (0.0)	5 (1.1)	6	61	5	542
平成24年度 第1期	458 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	55	11	540
第2期	461 (96.6)	11 (2.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	52	8	537
第3期	465 (97.1)	9 (1.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	49	7	535
第4期	467 (97.1)	9 (1.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	0	45	8	534
平成25年度 第1期	470 (97.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	42	6	531
第2期	471 (96.7)	6 (1.2)	4 (0.8)	1 (0.2)	5 (1.0)	0	37	6	530
第3期	471 (97.1)	5 (1.0)	3 (0.6)	3 (0.6)	3 (0.6)	0	35	7	527
第4期	468 (97.1)	7 (1.5)	1 (0.2)	2 (0.4)	4 (0.8)	0	37	9	528

(): 各行の計より投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	93 (23.0)	—	—	405	42 (10.4)	16 (4.0)	9 (2.2)	12 (3.0)
平成10年度 第1期	127 (28.3)	—	—	449	45 (10.0)	49 (10.9)	7 (1.6)	6 (1.3)
平成11年度 第1期	139 (29.8)	—	—	467	37 (7.9)	82 (17.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
平成12年度 第1期	141 (30.6)	—	—	461	30 (6.5)	88 (19.1)	9 (2.0)	8 (1.7)
平成13年度 第1期	143 (30.3)	—	—	472	30 (6.4)	80 (16.9)	5 (1.1)	5 (1.1)
平成14年度 第1期	145 (31.1)	—	—	466	27 (5.8)	75 (16.1)	3 (0.6)	8 (1.7)
平成15年度 第1期	143 (32.4)	—	—	441	26 (5.9)	59 (13.4)	3 (0.7)	5 (1.1)
平成16年度 第1期	175 (38.3)	274 (60.0)	8 (1.8)	457	28 (6.1)	67 (14.7)	5 (1.1)	12 (2.6)
平成17年度 第1期	166 (36.9)	271 (60.2)	13 (2.9)	450	25 (5.6)	60 (13.3)	4 (0.9)	13 (2.9)
平成18年度 第1期	156 (35.0)	261 (58.5)	29 (6.5)	446	22 (4.9)	59 (13.2)	7 (1.6)	12 (2.7)
平成19年度 第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
平成20年度 第1期	149 (31.5)	306 (64.7)	18 (3.8)	473	20 (4.2)	32 (6.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成21年度 第1期	130 (27.7)	323 (68.7)	17 (3.6)	470	12 (2.6)	27 (5.7)	3 (0.6)	9 (1.9)
平成22年度 第1期	130 (27.5)	332 (70.3)	10 (2.1)	472	15 (3.2)	25 (5.3)	1 (0.2)	7 (1.5)
平成23年度 第1期	126 (26.6)	330 (69.8)	17 (3.6)	473	15 (3.2)	18 (3.8)	2 (0.4)	4 (0.8)
第2期	127 (26.6)	334 (70.0)	16 (3.4)	477	15 (3.1)	18 (3.8)	4 (0.8)	3 (0.6)
第3期	126 (26.4)	334 (70.0)	17 (3.6)	477	18 (3.8)	17 (3.6)	5 (1.0)	4 (0.8)
第4期	127 (26.7)	333 (70.0)	16 (3.4)	476	18 (3.8)	18 (3.8)	4 (0.8)	6 (1.3)
平成24年度 第1期	111 (23.4)	352 (74.3)	11 (2.3)	474	13 (2.7)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
第2期	112 (23.5)	353 (74.0)	12 (2.5)	477	12 (2.5)	17 (3.6)	5 (1.0)	10 (2.1)
第3期	107 (22.3)	357 (74.5)	15 (3.1)	479	15 (3.1)	17 (3.5)	4 (0.8)	9 (1.9)
第4期	105 (21.8)	362 (75.3)	14 (2.9)	481	14 (2.9)	18 (3.7)	5 (1.0)	10 (2.1)
平成25年度 第1期	103 (21.3)	371 (76.8)	9 (1.9)	483	8 (1.7)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)
第2期	103 (21.1)	373 (76.6)	11 (2.3)	487	10 (2.1)	16 (3.3)	2 (0.4)	8 (1.6)
第3期	104 (21.4)	371 (76.5)	10 (2.1)	485	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.2)
第4期	104 (21.6)	368 (76.3)	10 (2.1)	482	7 (1.5)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)

（ ）：抗HIV薬投与ありにしめる％

表4-3-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (各時点の事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度第1期	9 (2.2)	9 (2.2)	9 (2.2)	5 (1.2)	—	—	—	20 (4.9)
平成10年度第1期	11 (2.4)	10 (2.2)	13 (2.9)	12 (2.7)	—	—	—	31 (6.9)
平成11年度第1期	4 (0.9)	15 (3.2)	7 (1.5)	6 (1.3)	—	—	—	23 (4.9)
平成12年度第1期	2 (0.4)	10 (2.2)	7 (1.5)	9 (2.0)	—	—	—	24 (5.2)
平成13年度第1期	3 (0.6)	11 (2.3)	7 (1.5)	7 (1.5)	—	—	—	34 (7.2)
平成14年度第1期	4 (0.9)	14 (3.0)	7 (1.5)	2 (0.4)	19 (4.1)	18 (3.9)	—	19 (4.1)
平成15年度第1期	4 (0.9)	15 (3.4)	4 (0.9)	6 (1.4)	25 (5.7)	47 (10.7)	—	17 (3.9)
平成16年度第1期	3 (0.7)	18 (3.9)	12 (2.6)	11 (2.4)	20 (4.4)	51 (11.2)	—	33 (7.2)
平成17年度第1期	2 (0.4)	16 (3.6)	7 (1.6)	11 (2.4)	29 (6.4)	41 (9.1)	—	37 (8.2)
平成18年度第1期	4 (0.9)	12 (2.7)	12 (2.7)	8 (1.8)	18 (4.0)	42 (9.4)	21 (4.7)	26 (5.8)
平成19年度第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
平成20年度第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	21 (4.4)	44 (9.3)	29 (6.1)	30 (6.3)
平成21年度第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.5)	27 (5.7)	26 (5.5)
平成22年度第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.4)	28 (5.9)	20 (4.2)
平成23年度第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.5)	24 (5.1)	19 (4.0)
第2期	2 (0.4)	10 (2.1)	7 (1.5)	11 (2.3)	19 (4.0)	45 (9.4)	24 (5.0)	22 (4.6)
第3期	2 (0.4)	10 (2.1)	8 (1.7)	9 (1.9)	23 (4.8)	46 (9.6)	24 (5.0)	23 (4.8)
第4期	3 (0.6)	10 (2.1)	11 (2.3)	9 (1.9)	22 (4.6)	45 (9.5)	24 (5.0)	19 (4.0)
平成24年度第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.2)	15 (3.2)	20 (4.2)
第2期	4 (0.8)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.2)	13 (2.7)	21 (4.4)
第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.1)	11 (2.3)	19 (4.0)
第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.2)	5 (1.0)	11 (2.3)	40 (8.3)	11 (2.3)	17 (3.5)
平成25年度第1期	2 (0.4)	6 (1.2)	6 (1.2)	5 (1.0)	12 (2.5)	43 (8.9)	17 (3.5)	17 (3.5)
第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.2)	6 (1.2)	13 (2.7)	43 (8.8)	17 (3.5)	18 (3.7)
第3期	3 (0.6)	7 (1.4)	5 (1.0)	7 (1.4)	11 (2.3)	42 (8.7)	16 (3.3)	22 (4.5)
第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.0)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.7)	14 (2.9)	18 (3.7)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	C D 4 値						計	中央値		
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡		
								含 む	含まず	
平成5年度 第4期	8 (2.0)	125 (31.3)	118 (29.5)	96 (24.0)	53 (13.3)	17	417	287	289	
平成6年度 第1期	15 (5.0)	92 (30.6)	90 (29.9)	61 (20.3)	43 (14.3)	116	417	276	288	
平成7年度 第1期	64 (18.7)	93 (27.2)	78 (22.8)	65 (19.0)	42 (12.3)	75	417	233	293	
平成8年度 第1期	99 (28.1)	76 (21.6)	79 (22.4)	62 (17.6)	36 (10.2)	65	417	203	302	
平成9年度 第1期	114 (29.8)	77 (20.1)	79 (20.6)	70 (18.3)	43 (11.2)	34	417	206	307	
平成10年度 第1期	121 (31.5)	60 (15.6)	81 (21.1)	69 (18.0)	53 (13.8)	33	417	220	340	
平成11年度 第1期	129 (33.0)	39 (10.0)	86 (22.0)	79 (20.2)	58 (14.8)	26	417	251	364	
平成12年度 第1期	135 (33.8)	33 (8.3)	88 (22.1)	72 (18.0)	71 (17.8)	18	417	271	368	
平成13年度 第1期	141 (36.2)	32 (8.2)	68 (17.5)	79 (20.3)	69 (17.7)	28	417	243	390	
平成14年度 第1期	148 (38.0)	26 (6.7)	75 (19.3)	61 (15.7)	79 (20.3)	28	417	247	392	
平成15年度 第1期	157 (40.4)	33 (8.5)	66 (17.0)	63 (16.2)	70 (18.0)	28	417	221	399	
平成16年度 第1期	163 (40.8)	30 (7.5)	67 (16.8)	72 (18.0)	68 (17.0)	17	417	222	400	
平成17年度 第1期	173 (44.0)	24 (6.1)	59 (15.0)	61 (15.5)	76 (19.3)	24	417	196	407	
平成18年度 第1期	180 (45.2)	33 (8.3)	64 (16.1)	45 (11.3)	76 (19.1)	19	417	166	377	
平成19年度 第1期	187 (46.9)	24 (6.0)	67 (16.8)	54 (13.5)	67 (16.8)	18	417	151	380	
平成20年度 第1期	199 (49.1)	30 (7.4)	53 (13.1)	69 (17.0)	54 (13.3)	12	417	65	397	
平成21年度 第1期	206 (51.0)	14 (3.5)	55 (13.6)	51 (12.6)	78 (19.3)	13	417	*	419	
平成22年度 第1期	209 (51.6)	22 (5.4)	49 (12.1)	57 (14.1)	68 (16.8)	12	417	*	412	
平成23年度	第1期	219 (54.1)	17 (4.2)	49 (12.1)	56 (13.8)	64 (15.8)	12	417	*	442
	第2期	220 (53.8)	17 (4.2)	51 (12.5)	55 (13.4)	66 (16.1)	8	417	*	430
	第3期	221 (54.3)	16 (3.9)	44 (10.8)	54 (13.3)	72 (17.7)	10	417	*	438
	第4期	221 (55.4)	21 (5.3)	37 (9.3)	51 (12.8)	69 (17.3)	18	417	*	434
平成24年度	第1期	221 (55.0)	10 (2.5)	48 (11.9)	54 (13.4)	69 (17.2)	15	417	*	457
	第2期	221 (54.4)	13 (3.2)	48 (11.8)	53 (13.1)	71 (17.5)	11	417	*	440
	第3期	221 (54.6)	9 (2.2)	50 (12.3)	43 (10.6)	82 (20.2)	12	417	*	465
	第4期	223 (58.1)	14 (3.6)	43 (11.2)	39 (10.2)	65 (16.9)	33	417	*	447
平成25年度	第1期	223 (55.2)	15 (3.7)	44 (10.9)	43 (10.6)	79 (19.6)	13	417	*	463
	第2期	224 (55.0)	13 (3.2)	36 (8.8)	59 (14.5)	75 (18.4)	10	417	*	445
	第3期	224 (55.3)	18 (4.4)	37 (9.1)	47 (11.6)	79 (19.5)	12	417	*	467
	第4期	226 (57.1)	14 (3.5)	37 (9.3)	46 (11.6)	73 (18.4)	21	417	*	448

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	CD 4 / CD 8 比							計	中央値	
	AIDS発病・ 死亡	～0.10未満	0.10～ 0.50未満	0.50～ 1.00未満	1.00～ 1.50未満	1.50以上	不明		AIDS発病・死亡	
									含 む	含まず
平成 5 年度 第4期	8 (2.0)	39 (9.9)	227 (57.9)	106 (27.0)	11 (2.8)	1 (0.3)	25	417	0.33	0.33
平成 6 年度 第1期	15 (5.1)	41 (13.9)	153 (51.7)	80 (27.0)	4 (1.4)	3 (1.0)	121	417	0.30	0.31
平成 7 年度 第1期	64 (18.7)	30 (8.8)	153 (44.7)	88 (25.7)	7 (2.0)	0 (0.0)	75	417	0.26	0.35
平成 8 年度 第1期	99 (28.1)	33 (9.4)	146 (41.5)	70 (19.9)	4 (1.1)	0 (0.0)	65	417	0.20	0.34
平成 9 年度 第1期	114 (30.2)	16 (4.2)	150 (39.7)	91 (24.1)	7 (1.9)	0 (0.0)	39	417	0.26	0.40
平成10年度 第1期	121 (31.7)	12 (3.1)	131 (34.3)	104 (27.2)	12 (3.1)	2 (0.5)	35	417	0.28	0.45
平成11年度 第1期	129 (33.9)	12 (3.1)	123 (32.3)	96 (25.2)	19 (5.0)	2 (0.5)	36	417	0.29	0.48
平成12年度 第1期	135 (34.5)	6 (1.5)	120 (30.7)	102 (26.1)	21 (5.4)	7 (1.8)	26	417	0.34	0.50
平成13年度 第1期	141 (37.3)	4 (1.1)	103 (27.2)	102 (27.0)	26 (6.9)	2 (0.5)	39	417	0.30	0.53
平成14年度 第1期	148 (39.2)	1 (0.3)	98 (25.9)	98 (25.9)	27 (7.1)	6 (1.6)	39	417	0.31	0.53
平成15年度 第1期	157 (42.1)	2 (0.5)	90 (24.1)	87 (23.3)	30 (8.0)	7 (1.9)	44	417	0.28	0.56
平成16年度 第1期	163 (43.5)	3 (0.8)	84 (22.4)	90 (24.0)	27 (7.2)	8 (2.1)	42	417	0.25	0.55
平成17年度 第1期	173 (45.8)	4 (1.1)	72 (19.0)	95 (25.1)	24 (6.3)	10 (2.6)	39	417	0.21	0.58
平成18年度 第1期	180 (46.5)	5 (1.3)	63 (16.3)	106 (27.4)	20 (5.2)	13 (3.4)	30	417	0.17	0.64
平成19年度 第1期	187 (48.7)	1 (0.3)	62 (16.1)	87 (22.7)	32 (8.3)	15 (3.9)	33	417	0.16	0.64
平成20年度 第1期	199 (50.6)	4 (1.0)	56 (14.2)	86 (21.9)	36 (9.2)	12 (3.1)	24	417	*	0.68
平成21年度 第1期	206 (53.6)	2 (0.5)	47 (12.2)	73 (19.0)	45 (11.7)	11 (2.9)	33	417	*	0.71
平成22年度 第1期	209 (52.9)	2 (0.5)	51 (12.9)	83 (21.0)	39 (9.9)	11 (2.8)	22	417	*	0.74
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	219 (55.7)	2 (0.5)	38 (9.7)	79 (20.1)	34 (8.7)	21 (5.3)	24	417	*	0.77
	220 (55.3)	1 (0.3)	36 (9.0)	80 (20.1)	47 (11.8)	14 (3.5)	19	417	*	0.77
	221 (55.9)	0 (0.0)	35 (8.9)	77 (19.5)	48 (12.2)	14 (3.5)	22	417	*	0.76
	221 (57.1)	2 (0.5)	31 (8.0)	75 (19.4)	36 (9.3)	22 (5.7)	30	417	*	0.80
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	221 (56.2)	0 (0.0)	35 (8.9)	68 (17.3)	47 (12.0)	22 (5.6)	24	417	*	0.85
	221 (55.5)	0 (0.0)	34 (8.5)	73 (18.3)	52 (13.1)	18 (4.5)	19	417	*	0.81
	221 (56.2)	0 (0.0)	35 (8.9)	72 (18.3)	39 (9.9)	26 (6.6)	24	417	*	0.85
	223 (59.6)	0 (0.0)	24 (6.4)	66 (17.6)	38 (10.2)	23 (6.1)	43	417	*	0.83
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	223 (56.0)	1 (0.3)	32 (8.0)	78 (19.6)	41 (10.3)	23 (5.8)	19	417	*	0.80
	224 (56.3)	1 (0.3)	30 (7.5)	83 (20.9)	39 (9.8)	21 (5.3)	19	417	*	0.79
	224 (56.4)	1 (0.3)	25 (6.3)	82 (20.7)	42 (10.6)	23 (5.8)	20	417	*	0.81
	226 (58.4)	2 (0.5)	29 (7.5)	67 (17.3)	37 (9.6)	26 (6.7)	30	417	*	0.88

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3 未満（再掲）		
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	AIDS 発病・ 死亡	不明		人数	AIDS 発病・死亡	
									含　む	含まず
平成5年度　第4期	234 (56.8)	106 (25.7)	55 (13.3)	9 (2.2)	8 (1.9)	5	417	340	(82.5)	(84.2)
平成6年度　第1期	220 (53.9)	118 (28.9)	45 (11.0)	10 (2.5)	15 (3.7)	9	417	338	(82.8)	(86.0)
平成7年度　第1期	197 (47.5)	97 (23.4)	49 (11.8)	8 (1.9)	64 (15.4)	2	417	294	(70.8)	(83.8)
平成8年度　第1期	163 (39.3)	97 (23.4)	47 (11.3)	9 (2.2)	99 (23.9)	2	417	260	(62.7)	(82.3)
平成9年度　第1期	110 (27.4)	112 (27.9)	61 (15.2)	4 (1.0)	114 (28.4)	16	417	222	(55.4)	(77.4)
平成10年度　第1期	91 (23.1)	113 (28.7)	63 (16.0)	6 (1.5)	121 (30.7)	23	417	204	(51.8)	(74.7)
平成11年度　第1期	91 (22.4)	103 (25.4)	74 (18.2)	9 (2.2)	129 (31.8)	11	417	194	(47.8)	(70.0)
平成12年度　第1期	81 (20.0)	110 (27.2)	72 (17.8)	6 (1.5)	135 (33.4)	13	417	191	(47.3)	(71.0)
平成13年度　第1期	80 (19.8)	98 (24.2)	77 (19.0)	9 (2.2)	141 (34.8)	12	417	178	(44.0)	(67.4)
平成14年度　第1期	71 (17.4)	110 (27.0)	69 (16.9)	10 (2.5)	148 (36.3)	9	417	181	(44.4)	(69.6)
平成15年度　第1期	62 (15.3)	95 (23.4)	80 (19.7)	12 (3.0)	157 (38.7)	11	417	157	(38.7)	(63.1)
平成16年度　第1期	62 (15.2)	98 (24.1)	70 (17.2)	14 (3.4)	163 (40.0)	10	417	160	(39.3)	(65.6)
平成17年度　第1期	68 (16.6)	89 (21.8)	70 (17.1)	9 (2.2)	173 (42.3)	8	417	157	(38.4)	(66.5)
平成18年度　第1期	62 (15.3)	85 (20.9)	68 (16.7)	11 (2.7)	180 (44.3)	11	417	147	(36.2)	(65.0)
平成19年度　第1期	57 (14.0)	91 (22.4)	60 (14.7)	12 (2.9)	187 (45.9)	10	417	148	(36.4)	(67.3)
平成20年度　第1期	52 (12.6)	90 (21.7)	64 (15.5)	9 (2.2)	199 (48.1)	3	417	142	(34.3)	(66.0)
平成21年度　第1期	53 (12.9)	79 (19.3)	64 (15.6)	8 (2.0)	206 (50.2)	7	417	132	(32.2)	(64.7)
平成22年度　第1期	55 (13.4)	75 (18.2)	63 (15.3)	9 (2.2)	209 (50.9)	6	417	130	(31.6)	(64.4)
平成23年度　第1期 第2期 第3期 第4期	49 (11.9)	73 (17.7)	61 (14.8)	10 (2.4)	219 (53.2)	5	417	122	(29.6)	(63.2)
	48 (11.6)	70 (16.9)	66 (15.9)	11 (2.7)	220 (53.0)	2	417	118	(28.4)	(60.5)
	49 (11.8)	70 (16.8)	66 (15.9)	10 (2.4)	221 (53.1)	1	417	119	(28.6)	(61.0)
	51 (12.3)	66 (15.9)	67 (16.2)	9 (2.2)	221 (53.4)	3	417	117	(28.3)	(60.6)
平成24年度　第1期 第2期 第3期 第4期	51 (12.4)	73 (17.7)	60 (14.6)	7 (1.7)	221 (53.6)	5	417	124	(30.1)	(64.9)
	56 (13.6)	67 (16.3)	59 (14.4)	8 (1.9)	221 (53.8)	6	417	123	(29.9)	(64.7)
	57 (13.8)	59 (14.3)	68 (16.4)	9 (2.2)	221 (53.4)	3	417	116	(28.0)	(60.1)
	55 (13.3)	61 (14.8)	65 (15.8)	8 (1.9)	223 (54.1)	5	417	116	(28.2)	(61.4)
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	48 (11.7)	73 (17.8)	58 (14.2)	7 (1.7)	223 (54.5)	8	417	121	(29.6)	(65.1)
	51 (12.4)	65 (15.8)	64 (15.6)	7 (1.7)	224 (54.5)	6	417	116	(28.2)	(62.0)
	49 (12.0)	61 (15.0)	66 (16.2)	7 (1.7)	224 (55.0)	10	417	110	(27.0)	(60.1)
	48 (11.6)	66 (16.0)	66 (16.0)	7 (1.7)	226 (54.7)	4	417	114	(27.6)	(61.0)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	日常生活動作						計	1 および 2 (再掲)		
	1	2	3	4(4～8)	AIDS 発病・ 死亡	不明		人数	AIDS 発病・死亡	
									含 む	含まず
平成5年度 第4期	239 (67.1)	85 (23.9)	14 (3.9)	10 (2.8)	8 (2.2)	61	417	324	(91.0)	(93.1)
平成6年度 第1期	247 (66.0)	77 (20.6)	20 (5.3)	15 (4.0)	15 (4.0)	43	417	324	(86.6)	(90.3)
平成7年度 第1期	216 (57.4)	71 (18.9)	12 (3.2)	13 (3.5)	64 (17.0)	41	417	287	(76.3)	(92.0)
平成8年度 第1期	196 (51.4)	58 (15.2)	17 (4.5)	11 (2.9)	99 (26.0)	36	417	254	(66.7)	(90.1)
平成9年度 第1期	110 (28.6)	77 (20.0)	43 (11.2)	41 (10.6)	114 (29.6)	32	417	187	(48.6)	(69.0)
平成10年度 第1期	95 (24.9)	81 (21.3)	48 (12.6)	36 (9.4)	121 (31.8)	36	417	176	(46.2)	(67.7)
平成11年度 第1期	89 (22.9)	89 (22.9)	43 (11.1)	39 (10.0)	129 (33.2)	28	417	178	(45.8)	(68.5)
平成12年度 第1期	83 (21.4)	88 (22.7)	36 (9.3)	46 (11.9)	135 (34.8)	29	417	171	(44.1)	(67.6)
平成13年度 第1期	75 (19.2)	88 (22.5)	45 (11.5)	42 (10.7)	141 (36.1)	26	417	163	(41.7)	(65.2)
平成14年度 第1期	64 (16.3)	91 (23.2)	48 (12.2)	41 (10.5)	148 (37.8)	25	417	155	(39.5)	(63.5)
平成15年度 第1期	62 (15.8)	80 (20.4)	51 (13.0)	42 (10.7)	157 (40.1)	25	417	142	(36.2)	(60.4)
平成16年度 第1期	59 (14.6)	73 (18.0)	64 (15.8)	46 (11.4)	163 (40.2)	12	417	132	(32.6)	(54.5)
平成17年度 第1期	64 (15.8)	68 (16.7)	47 (11.6)	54 (13.3)	173 (42.6)	11	417	132	(32.5)	(56.7)
平成18年度 第1期	51 (12.6)	74 (18.3)	50 (12.3)	50 (12.3)	180 (44.4)	12	417	125	(30.9)	(55.6)
平成19年度 第1期	54 (13.3)	66 (16.3)	55 (13.6)	43 (10.6)	187 (46.2)	12	417	120	(29.6)	(55.0)
平成20年度 第1期	52 (12.6)	59 (14.3)	60 (14.5)	43 (10.4)	199 (48.2)	4	417	111	(26.9)	(51.9)
平成21年度 第1期	48 (11.7)	62 (15.1)	52 (12.7)	43 (10.5)	206 (50.1)	6	417	110	(26.8)	(53.7)
平成22年度 第1期	48 (11.6)	58 (14.0)	54 (13.1)	44 (10.7)	209 (50.6)	4	417	106	(25.7)	(52.0)
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	47 (11.5)	59 (14.4)	42 (10.2)	43 (10.5)	219 (53.4)	7	417	106	(25.9)	(55.5)
	46 (11.2)	56 (13.7)	45 (11.0)	42 (10.3)	220 (53.8)	8	417	102	(24.9)	(54.0)
	48 (11.7)	57 (13.8)	44 (10.7)	42 (10.2)	221 (53.6)	5	417	105	(25.5)	(55.0)
	49 (11.9)	53 (12.9)	45 (10.9)	43 (10.5)	221 (53.8)	6	417	102	(24.8)	(53.7)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	47 (11.4)	57 (13.8)	43 (10.4)	44 (10.7)	221 (53.6)	5	417	104	(25.2)	(54.5)
	46 (11.2)	53 (12.9)	45 (11.0)	45 (11.0)	221 (53.9)	7	417	99	(24.1)	(52.4)
	48 (11.7)	49 (12.0)	44 (10.8)	47 (11.5)	221 (54.0)	8	417	97	(23.7)	(51.6)
	47 (11.4)	51 (12.4)	41 (10.0)	49 (11.9)	223 (54.3)	6	417	98	(23.8)	(52.1)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	43 (10.5)	51 (12.4)	42 (10.2)	51 (12.4)	223 (54.4)	7	417	94	(22.9)	(50.3)
	44 (10.7)	47 (11.5)	43 (10.5)	52 (12.7)	224 (54.6)	7	417	91	(22.2)	(48.9)
	45 (11.0)	49 (12.0)	43 (10.5)	47 (11.5)	224 (54.9)	9	417	94	(23.0)	(51.1)
	44 (10.7)	52 (12.6)	39 (9.4)	52 (12.6)	226 (54.7)	4	417	96	(23.2)	(51.3)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	HIV-RNA量							中央値	
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成9年度 第1期	52 (17.6)	18 (6.1)	56 (19.0)	55 (18.6)	114 (38.6)	122	417	32000	2800
平成10年度 第1期	89 (24.5)	36 (9.9)	70 (19.3)	47 (12.9)	121 (33.3)	54	417	6700	900
平成11年度 第1期	132 (34.4)	20 (5.2)	62 (16.1)	41 (10.7)	129 (33.6)	33	417	4250	400未満
平成12年度 第1期	148 (37.6)	17 (4.3)	58 (14.7)	36 (9.1)	135 (34.3)	23	417	3300	400未満
平成13年度 第1期	146 (37.5)	22 (5.7)	50 (12.9)	30 (7.7)	141 (36.2)	28	417	2700	400未満
平成14年度 第1期	147 (37.9)	25 (6.4)	42 (10.8)	26 (6.7)	148 (38.1)	29	417	3000	400未満
平成15年度 第1期	143 (36.9)	15 (3.9)	38 (9.8)	35 (9.0)	157 (40.5)	29	417	7800	400未満
平成16年度 第1期	154 (38.6)	14 (3.5)	32 (8.0)	36 (9.0)	163 (40.9)	18	417	8800	400未満
平成17年度 第1期	152 (39.3)	8 (2.1)	23 (5.9)	31 (8.0)	173 (44.7)	30	417	24000	400未満
平成18年度 第1期	163 (41.1)	15 (3.8)	26 (6.5)	13 (3.3)	180 (45.3)	20	417	7200	400未満
平成19年度 第1期	164 (41.1)	11 (2.8)	19 (4.8)	18 (4.5)	187 (46.9)	18	417	17000	400未満
平成20年度 第1期	169 (41.9)	10 (2.5)	12 (3.0)	13 (3.2)	199 (49.4)	14	417	100000	400未満
平成21年度 第1期	173 (43.0)	4 (1.0)	8 (2.0)	11 (2.7)	206 (51.2)	15	417	*	400未満
平成22年度 第1期	179 (44.2)	1 (0.2)	12 (3.0)	4 (1.0)	209 (51.6)	12	417	*	400未満
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	173 (42.5)	5 (1.2)	5 (1.2)	5 (1.2)	219 (53.8)	10	417	*	400未満
	177 (43.4)	3 (0.7)	4 (1.0)	4 (1.0)	220 (53.9)	9	417	*	400未満
	171 (42.2)	4 (1.0)	6 (1.5)	3 (0.7)	221 (54.6)	12	417	*	400未満
	168 (42.0)	3 (0.8)	4 (1.0)	4 (1.0)	221 (55.3)	17	417	*	400未満
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	176 (43.7)	1 (0.2)	2 (0.5)	3 (0.7)	221 (54.8)	14	417	*	400未満
	180 (44.0)	2 (0.5)	2 (0.5)	4 (1.0)	221 (54.0)	8	417	*	400未満
	181 (44.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (1.0)	221 (54.2)	9	417	*	400未満
	158 (40.9)	2 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.5)	223 (57.8)	31	417	*	400未満
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	177 (43.8)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.5)	223 (55.2)	13	417	*	400未満
	181 (44.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	224 (55.2)	11	417	*	400未満
	177 (43.7)	0 (0.0)	3 (0.7)	1 (0.2)	224 (55.3)	12	417	*	400未満
	167 (42.1)	1 (0.3)	2 (0.5)	1 (0.3)	226 (56.9)	20	417	*	400未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1 剤	NRTI 2 剤	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成5年度 第4期	184 (45.4)	20 (4.9)	163 (40.2)	38 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8	4	417
平成6年度 第1期	117 (39.5)	26 (8.8)	115 (38.9)	38 (12.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15	106	417
平成7年度 第1期	93 (32.7)	23 (8.1)	115 (40.5)	53 (18.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	64	69	417
平成8年度 第1期	71 (27.6)	24 (9.3)	103 (40.1)	59 (23.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	99	61	417
平成9年度 第1期	54 (19.5)	14 (5.1)	32 (11.6)	106 (38.3)	52 (18.8)	0 (0.0)	19 (6.9)	114	26	417
平成10年度 第1期	44 (16.1)	19 (6.9)	11 (4.0)	72 (26.3)	116 (42.3)	1 (0.4)	11 (4.0)	121	22	417
平成11年度 第1期	43 (15.9)	17 (6.3)	7 (2.6)	55 (20.3)	137 (50.6)	1 (0.4)	11 (4.1)	129	17	417
平成12年度 第1期	42 (15.7)	17 (6.3)	5 (1.9)	46 (17.2)	124 (46.3)	16 (6.0)	18 (6.7)	135	14	417
平成13年度 第1期	33 (12.9)	14 (5.5)	3 (1.2)	39 (15.2)	123 (48.0)	26 (10.2)	18 (7.0)	141	20	417
平成14年度 第1期	32 (12.6)	22 (8.7)	0 (0.0)	33 (13.0)	108 (42.7)	36 (14.2)	22 (8.7)	148	16	417
平成15年度 第1期	32 (12.9)	27 (10.9)	0 (0.0)	27 (10.9)	96 (38.7)	42 (16.9)	24 (9.7)	157	12	417
平成16年度 第1期	30 (12.0)	32 (12.8)	0 (0.0)	24 (9.6)	97 (38.8)	45 (18.0)	22 (8.8)	163	4	417
平成17年度 第1期	27 (11.4)	28 (11.9)	0 (0.0)	22 (9.3)	91 (38.6)	48 (20.3)	20 (8.5)	173	8	417
平成18年度 第1期	25 (10.9)	21 (9.2)	0 (0.0)	15 (6.6)	104 (45.4)	46 (20.1)	18 (7.9)	180	8	417
平成19年度 第1期	20 (8.9)	18 (8.0)	0 (0.0)	11 (4.9)	111 (49.6)	46 (20.5)	18 (8.0)	187	6	417
平成20年度 第1期	18 (8.3)	12 (5.6)	0 (0.0)	10 (4.6)	113 (52.3)	39 (18.1)	24 (11.1)	199	2	417
平成21年度 第1期	18 (8.6)	8 (3.8)	0 (0.0)	8 (3.8)	99 (47.1)	36 (17.1)	41 (19.5)	206	1	417
平成22年度 第1期	14 (6.8)	8 (3.9)	0 (0.0)	6 (2.9)	85 (41.5)	35 (17.1)	57 (27.8)	209	3	417
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	8 (4.0)	9 (4.5)	0 (0.0)	4 (2.0)	71 (35.9)	34 (17.2)	72 (36.4)	219	0	417
	7 (3.6)	8 (4.1)	0 (0.0)	4 (2.0)	72 (36.5)	33 (16.8)	73 (37.1)	220	0	417
	6 (3.1)	8 (4.1)	0 (0.0)	4 (2.0)	68 (34.7)	33 (16.8)	77 (39.3)	221	0	417
	6 (3.1)	7 (3.6)	0 (0.0)	4 (2.1)	67 (34.9)	30 (15.6)	78 (40.6)	221	4	417
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	6 (3.1)	5 (2.6)	0 (0.0)	4 (2.1)	63 (32.5)	30 (15.5)	86 (44.3)	221	2	417
	6 (3.1)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	62 (32.0)	31 (16.0)	87 (44.8)	221	2	417
	6 (3.1)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	56 (28.9)	31 (16.0)	93 (47.9)	221	2	417
	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	55 (28.5)	33 (17.1)	92 (47.7)	223	1	417
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	5 (2.6)	5 (2.6)	0 (0.0)	3 (1.6)	49 (25.5)	32 (16.7)	98 (51.0)	223	2	417
	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.6)	32 (16.8)	100 (52.4)	224	2	417
	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.7)	32 (16.8)	99 (52.1)	224	3	417
	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	46 (24.1)	32 (16.8)	101 (52.9)	226	0	417

() : 各行の計より不明と AIDS 発病・死亡を除いた数を分母とする%

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成9年度 第1期	163 (80.7)	24 (11.9)	7 (3.5)	5 (2.5)	3 (1.5)	7	68	26	114	417
平成10年度 第1期	173 (83.6)	22 (10.6)	8 (3.9)	2 (1.0)	2 (1.0)	4	63	22	121	417
平成11年度 第1期	171 (84.7)	25 (12.4)	5 (2.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	9	60	17	129	417
平成12年度 第1期	174 (87.0)	18 (9.0)	5 (2.5)	3 (1.5)	0 (0.0)	9	59	14	135	417
平成13年度 第1期	169 (85.4)	22 (11.1)	5 (2.5)	2 (1.0)	0 (0.0)	11	47	20	141	417
平成14年度 第1期	170 (87.6)	17 (8.8)	6 (3.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	5	54	16	148	417
平成15年度 第1期	163 (87.6)	17 (9.1)	6 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	59	12	157	417
平成16年度 第1期	162 (86.6)	14 (7.5)	6 (3.2)	3 (1.6)	2 (1.1)	1	62	4	163	417
平成17年度 第1期	161 (89.4)	10 (5.6)	6 (3.3)	1 (0.6)	2 (1.1)	1	55	8	173	417
平成18年度 第1期	165 (90.2)	11 (6.0)	5 (2.7)	1 (0.5)	1 (0.5)	0	46	8	180	417
平成19年度 第1期	170 (92.4)	11 (6.0)	3 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	38	6	187	417
平成20年度 第1期	170 (92.4)	9 (4.9)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.5)	2	30	2	199	417
平成21年度 第1期	171 (93.4)	6 (3.3)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	1	26	1	206	417
平成22年度 第1期	171 (96.6)	4 (2.3)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	6	22	3	209	417
平成23年度 第1期	171 (96.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	3	17	0	219	417
第2期	171 (95.5)	5 (2.8)	1 (0.6)	0 (0.0)	2 (1.1)	3	15	0	220	417
第3期	172 (96.1)	3 (1.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	2 (1.1)	3	14	0	221	417
第4期	168 (96.6)	2 (1.1)	3 (1.7)	0 (0.0)	1 (0.6)	5	13	4	221	417
平成24年度 第1期	178 (97.3)	3 (1.6)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11	2	221	417
第2期	179 (97.3)	3 (1.6)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	2	221	417
第3期	179 (97.3)	4 (2.2)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	2	221	417
第4期	180 (97.8)	3 (1.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	1	223	417
平成25年度 第1期	180 (98.9)	0 (0.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	2	223	417
第2期	179 (98.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	2	224	417
第3期	178 (98.3)	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	0	9	3	224	417
第4期	179 (98.4)	2 (1.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	0	226	417

() : 各行の計より AIDS 発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	47 (22.5)	—	—	209	19 (9.1)	9 (4.3)	5 (2.4)	5 (2.4)
平成10年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	18 (8.5)	28 (13.3)	4 (1.9)	3 (1.4)
平成11年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	12 (5.7)	40 (19.0)	3 (1.4)	4 (1.9)
平成12年度 第1期	66 (31.6)	—	—	209	8 (3.8)	41 (19.6)	2 (1.0)	2 (1.0)
平成13年度 第1期	69 (33.0)	—	—	209	10 (4.8)	43 (20.6)	3 (1.4)	2 (1.0)
平成14年度 第1期	61 (30.7)	—	—	199	8 (4.0)	33 (16.6)	1 (0.5)	3 (1.5)
平成15年度 第1期	74 (39.2)	—	—	189	8 (4.2)	32 (16.9)	2 (1.1)	2 (1.1)
平成16年度 第1期	81 (43.1)	104 (55.3)	3 (1.6)	188	11 (5.9)	30 (16.0)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成17年度 第1期	72 (39.8)	106 (58.6)	3 (1.7)	181	7 (3.9)	20 (11.0)	0 (0.0)	6 (3.3)
平成18年度 第1期	70 (38.3)	104 (56.8)	9 (4.9)	183	6 (3.3)	26 (14.2)	1 (0.5)	3 (1.6)
平成19年度 第1期	61 (32.8)	103 (55.4)	22 (11.8)	186	9 (4.8)	14 (7.5)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成20年度 第1期	59 (31.7)	121 (65.1)	6 (3.2)	186	7 (3.8)	11 (5.9)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成21年度 第1期	48 (26.1)	129 (70.1)	7 (3.8)	184	3 (1.6)	8 (4.3)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成22年度 第1期	55 (30.1)	126 (68.9)	2 (1.1)	183	5 (2.7)	7 (3.8)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成23年度 第1期	53 (29.3)	125 (69.1)	3 (1.7)	181	6 (3.3)	7 (3.9)	1 (0.6)	2 (1.1)
第2期	54 (29.7)	126 (69.2)	2 (1.1)	182	6 (3.3)	7 (3.8)	1 (0.5)	1 (0.5)
第3期	53 (29.1)	125 (68.7)	4 (2.2)	182	6 (3.3)	5 (2.7)	1 (0.5)	2 (1.1)
第4期	53 (29.6)	123 (68.7)	3 (1.7)	179	6 (3.4)	4 (2.2)	1 (0.6)	4 (2.2)
平成24年度 第1期	46 (25.1)	133 (72.7)	4 (2.2)	183	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	3 (1.6)
第2期	47 (25.5)	134 (72.8)	3 (1.6)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	3 (1.6)
第3期	44 (23.9)	134 (72.8)	6 (3.3)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	2 (1.1)
第4期	44 (23.9)	137 (74.5)	3 (1.6)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	2 (1.1)
平成25年度 第1期	43 (23.6)	135 (74.2)	4 (2.2)	182	3 (1.6)	6 (3.3)	0 (0.0)	1 (0.5)
第2期	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	4 (2.2)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)
第3期	42 (23.2)	134 (74.0)	5 (2.8)	181	4 (2.2)	5 (2.8)	0 (0.0)	1 (0.6)
第4期	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	3 (1.6)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)

（ ）：抗HIV薬投与ありにしめる％

表4-4-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	6 (2.9)	5 (2.4)	5 (2.4)	3 (1.4)	—	—	—	9 (4.3)
平成10年度 第1期	6 (2.8)	8 (3.8)	8 (3.8)	6 (2.8)	—	—	—	18 (8.5)
平成11年度 第1期	1 (0.5)	9 (4.3)	6 (2.8)	3 (1.4)	—	—	—	11 (5.2)
平成12年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	4 (1.9)	5 (2.4)	—	—	—	15 (7.2)
平成13年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	6 (2.9)	4 (1.9)	—	—	—	16 (7.7)
平成14年度 第1期	0 (0.0)	6 (3.0)	4 (2.0)	0 (0.0)	9 (4.5)	11 (5.5)	—	7 (3.5)
平成15年度 第1期	1 (0.5)	8 (4.2)	1 (0.5)	2 (1.1)	12 (6.3)	29 (15.3)	—	15 (7.9)
平成16年度 第1期	0 (0.0)	9 (4.8)	5 (2.7)	2 (1.1)	9 (4.8)	26 (13.8)	—	16 (8.5)
平成17年度 第1期	2 (1.1)	8 (4.4)	2 (1.1)	3 (1.7)	13 (7.2)	23 (12.7)	—	20 (11.0)
平成18年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	6 (3.3)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	11 (6.0)	17 (9.3)
平成19年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	2 (1.1)	3 (1.6)	8 (4.3)	20 (10.8)	10 (5.4)	10 (5.4)
平成20年度 第1期	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	7 (3.8)	23 (12.4)	10 (5.4)	12 (6.5)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.1)	19 (10.3)	11 (6.0)	11 (6.0)
平成22年度 第1期	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.1)	3 (1.6)	6 (3.3)	25 (13.7)	12 (6.6)	9 (4.9)
第2期	0 (0.0)	1 (0.6)	2 (1.1)	3 (1.7)	5 (2.8)	25 (13.8)	12 (6.6)	6 (3.3)
第3期	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.1)	2 (1.1)	6 (3.3)	24 (13.2)	12 (6.6)	7 (3.8)
第4期	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.6)	4 (2.3)	6 (3.4)	24 (13.6)	12 (6.8)	5 (2.8)
平成23年度 第1期	1 (0.6)	5 (2.8)	1 (0.6)	3 (1.7)	7 (3.9)	23 (12.7)	8 (4.4)	8 (4.4)
第2期	1 (0.5)	5 (2.7)	1 (0.5)	4 (2.2)	7 (3.8)	23 (12.6)	8 (4.4)	8 (4.4)
第3期	1 (0.5)	5 (2.7)	2 (1.1)	3 (1.6)	8 (4.4)	23 (12.6)	7 (3.8)	9 (4.9)
第4期	2 (1.1)	5 (2.8)	3 (1.7)	3 (1.7)	7 (3.9)	22 (12.3)	8 (4.5)	9 (5.0)
平成24年度 第1期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	7 (3.8)	6 (3.3)
第2期	1 (0.5)	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	6 (3.3)	8 (4.3)
第3期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.7)	22 (12.0)	4 (2.2)	8 (4.3)
第4期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.7)	23 (12.5)	5 (2.7)	7 (3.8)
平成25年度 第1期	1 (0.5)	3 (1.6)	3 (1.6)	2 (1.1)	5 (2.7)	24 (13.2)	6 (3.3)	7 (3.8)
第2期	2 (1.1)	3 (1.6)	3 (1.6)	3 (1.6)	5 (2.7)	23 (12.6)	6 (3.3)	7 (3.8)
第3期	2 (1.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	4 (2.2)	5 (2.8)	23 (12.7)	6 (3.3)	7 (3.9)
第4期	1 (0.5)	4 (2.2)	2 (1.1)	5 (2.7)	5 (2.7)	23 (12.6)	5 (2.7)	6 (3.3)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	C D 4 値							中 央 値	
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	133 (25.1)	144 (27.2)	134 (25.3)	114 (21.6)	76	605	328	330
平成10年度 第1期	21 (3.9)	99 (18.3)	156 (28.8)	140 (25.9)	125 (23.1)	64	605	344	354
平成11年度 第1期	33 (6.0)	73 (13.2)	152 (27.5)	156 (28.2)	139 (25.1)	52	605	370	383
平成12年度 第1期	45 (8.1)	67 (12.1)	147 (26.4)	150 (27.0)	147 (26.4)	49	605	368	394
平成13年度 第1期	59 (10.9)	60 (11.1)	130 (24.0)	148 (27.3)	145 (26.8)	63	605	369	395
平成14年度 第1期	66 (12.0)	55 (10.0)	143 (26.0)	130 (23.6)	157 (28.5)	54	605	360	396
平成15年度 第1期	81 (15.1)	58 (10.8)	125 (23.2)	137 (25.5)	137 (25.5)	67	605	356	404
平成16年度 第1期	93 (16.5)	63 (11.2)	120 (21.3)	137 (24.3)	150 (26.6)	42	605	356	403
平成17年度 第1期	111 (20.1)	46 (8.3)	123 (22.3)	121 (21.9)	151 (27.4)	53	605	345	406
平成18年度 第1期	125 (22.1)	66 (11.7)	117 (20.7)	108 (19.1)	150 (26.5)	39	605	318	388
平成19年度 第1期	137 (24.1)	56 (9.9)	135 (23.8)	107 (18.8)	133 (23.4)	37	605	305	375
平成20年度 第1期	157 (27.6)	53 (9.3)	120 (21.1)	121 (21.3)	118 (20.7)	36	605	309	388
平成21年度 第1期	167 (29.1)	37 (6.5)	105 (18.3)	100 (17.5)	164 (28.6)	32	605	324	431
平成22年度 第1期	176 (30.6)	39 (6.8)	105 (18.2)	115 (20.0)	141 (24.5)	29	605	314	423
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	188 (32.7)	32 (5.6)	93 (16.2)	120 (20.9)	142 (24.7)	30	605	318	437
	189 (32.6)	35 (6.0)	99 (17.1)	105 (18.1)	152 (26.2)	25	605	317	432
	192 (33.0)	34 (5.8)	91 (15.6)	110 (18.9)	155 (26.6)	23	605	309	442
	194 (34.6)	33 (5.9)	80 (14.3)	106 (18.9)	148 (26.4)	44	605	299	437
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	194 (33.7)	28 (4.9)	86 (14.9)	113 (19.6)	155 (26.9)	29	605	316	449
	195 (33.7)	29 (5.0)	93 (16.1)	110 (19.0)	151 (26.1)	27	605	316	441
	196 (34.1)	24 (4.2)	93 (16.2)	104 (18.1)	158 (27.5)	30	605	306	461
	199 (37.3)	25 (4.7)	79 (14.8)	94 (17.6)	137 (25.7)	71	605	296	460
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	200 (34.5)	26 (4.5)	91 (15.7)	95 (16.4)	168 (29.0)	25	605	315	464
	201 (34.4)	33 (5.7)	75 (12.8)	116 (19.9)	159 (27.2)	21	605	326	458
	201 (34.4)	34 (5.8)	68 (11.6)	115 (19.7)	166 (28.4)	21	605	323	462
	203 (36.8)	23 (4.2)	74 (13.4)	100 (18.1)	152 (27.5)	53	605	318	462

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	CD4/CD8 比								中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡含む	AIDS発病・死亡含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	30 (5.8)	274 (53.3)	180 (35.0)	25 (4.9)	1 (0.2)	91	605	0.40	0.40
平成10年度 第1期	21 (3.9)	18 (3.4)	247 (46.0)	216 (40.2)	33 (6.1)	2 (0.4)	68	605	0.47	0.49
平成11年度 第1期	33 (6.2)	18 (3.4)	244 (45.7)	194 (36.3)	40 (7.5)	5 (0.9)	71	605	0.44	0.48
平成12年度 第1期	45 (8.3)	11 (2.0)	232 (42.9)	202 (37.3)	42 (7.8)	9 (1.7)	64	605	0.47	0.50
平成13年度 第1期	59 (11.3)	11 (2.1)	201 (38.4)	196 (37.5)	47 (9.0)	9 (1.7)	82	605	0.48	0.51
平成14年度 第1期	66 (12.5)	8 (1.5)	198 (37.5)	195 (36.9)	49 (9.3)	12 (2.3)	77	605	0.49	0.52
平成15年度 第1期	81 (15.8)	8 (1.6)	177 (34.6)	179 (35.0)	53 (10.4)	14 (2.7)	93	605	0.47	0.56
平成16年度 第1期	93 (17.6)	8 (1.5)	172 (32.6)	186 (35.3)	51 (9.7)	17 (3.2)	78	605	0.47	0.57
平成17年度 第1期	111 (21.1)	10 (1.9)	145 (27.6)	192 (36.6)	46 (8.8)	21 (4.0)	80	605	0.48	0.58
平成18年度 第1期	125 (23.1)	11 (2.0)	131 (24.3)	193 (35.7)	51 (9.4)	29 (5.4)	65	605	0.50	0.61
平成19年度 第1期	137 (25.3)	3 (0.6)	142 (26.2)	171 (31.5)	65 (12.0)	24 (4.4)	63	605	0.46	0.61
平成20年度 第1期	157 (28.5)	6 (1.1)	120 (21.8)	178 (32.3)	70 (12.7)	20 (3.6)	54	605	0.47	0.62
平成21年度 第1期	167 (31.0)	5 (0.9)	105 (19.5)	155 (28.8)	81 (15.0)	26 (4.8)	66	605	0.47	0.69
平成22年度 第1期	176 (31.9)	4 (0.7)	96 (17.4)	174 (31.5)	73 (13.2)	29 (5.3)	53	605	0.50	0.70
平成23年度 第1期	188 (34.2)	2 (0.4)	94 (17.1)	157 (28.5)	72 (13.1)	37 (6.7)	55	605	0.48	0.72
第2期	189 (33.9)	1 (0.2)	85 (15.3)	164 (29.4)	88 (15.8)	30 (5.4)	48	605	0.50	0.73
第3期	192 (34.3)	1 (0.2)	78 (14.0)	165 (29.5)	92 (16.5)	31 (5.5)	46	605	0.50	0.72
第4期	194 (35.9)	3 (0.6)	75 (13.9)	162 (30.0)	65 (12.0)	41 (7.6)	65	605	0.48	0.76
平成24年度 第1期	194 (35.1)	1 (0.2)	76 (13.8)	162 (29.3)	82 (14.9)	37 (6.7)	53	605	0.50	0.77
第2期	195 (35.2)	0 (0.0)	77 (13.9)	155 (28.0)	91 (16.4)	36 (6.5)	51	605	0.50	0.80
第3期	196 (35.7)	0 (0.0)	76 (13.8)	152 (27.7)	83 (15.1)	42 (7.7)	56	605	0.50	0.80
第4期	199 (38.9)	1 (0.2)	59 (11.5)	135 (26.4)	80 (15.6)	38 (7.4)	93	605	0.47	0.80
平成25年度 第1期	200 (35.5)	1 (0.2)	78 (13.9)	163 (29.0)	78 (13.9)	43 (7.6)	42	605	0.50	0.77
第2期	201 (35.7)	1 (0.2)	69 (12.3)	172 (30.6)	76 (13.5)	44 (7.8)	42	605	0.52	0.80
第3期	201 (35.7)	2 (0.4)	61 (10.8)	175 (31.1)	82 (14.6)	42 (7.5)	42	605	0.53	0.80
第4期	203 (38.2)	2 (0.4)	62 (11.7)	146 (27.5)	72 (13.6)	46 (8.7)	74	605	0.48	0.83

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）		
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成9年度 第1期	226 (39.5)	227 (39.7)	108 (18.9)	7 (1.2)	4 (0.7)	33	605	453	(79.2)	(79.8)
平成10年度 第1期	193 (34.0)	234 (41.3)	112 (19.8)	7 (1.2)	21 (3.7)	38	605	427	(75.3)	(78.2)
平成11年度 第1期	188 (32.6)	199 (34.5)	144 (25.0)	12 (2.1)	33 (5.7)	29	605	387	(67.2)	(71.3)
平成12年度 第1期	162 (28.2)	221 (38.5)	136 (23.7)	10 (1.7)	45 (7.8)	31	605	383	(66.7)	(72.4)
平成13年度 第1期	152 (26.3)	212 (36.7)	145 (25.1)	10 (1.7)	59 (10.2)	27	605	364	(63.0)	(70.1)
平成14年度 第1期	149 (25.5)	222 (37.9)	134 (22.9)	14 (2.4)	66 (11.3)	20	605	371	(63.4)	(71.5)
平成15年度 第1期	142 (24.3)	192 (32.8)	153 (26.2)	17 (2.9)	81 (13.8)	20	605	334	(57.1)	(66.3)
平成16年度 第1期	131 (22.7)	203 (35.2)	132 (22.9)	18 (3.1)	93 (16.1)	28	605	334	(57.9)	(69.0)
平成17年度 第1期	132 (22.7)	189 (32.5)	138 (23.7)	12 (2.1)	111 (19.1)	23	605	321	(55.2)	(68.2)
平成18年度 第1期	126 (21.3)	178 (30.1)	143 (24.2)	19 (3.2)	125 (21.2)	14	605	304	(51.4)	(65.2)
平成19年度 第1期	117 (19.9)	189 (32.1)	127 (21.6)	18 (3.1)	137 (23.3)	17	605	306	(52.0)	(67.8)
平成20年度 第1期	111 (18.7)	183 (30.9)	125 (21.1)	17 (2.9)	157 (26.5)	12	605	294	(49.6)	(67.4)
平成21年度 第1期	111 (18.8)	167 (28.4)	132 (22.4)	12 (2.0)	167 (28.4)	16	605	278	(47.2)	(65.9)
平成22年度 第1期	112 (18.9)	157 (26.5)	131 (22.1)	16 (2.7)	176 (29.7)	13	605	269	(45.4)	(64.7)
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	102 (17.3)	165 (27.9)	118 (20.0)	18 (3.0)	188 (31.8)	14	605	267	(45.2)	(66.3)
	105 (17.7)	152 (25.7)	125 (21.1)	21 (3.5)	189 (31.9)	13	605	257	(43.4)	(63.8)
	103 (17.3)	154 (25.8)	131 (22.0)	16 (2.7)	192 (32.2)	9	605	257	(43.1)	(63.6)
	106 (17.8)	150 (25.2)	129 (21.7)	16 (2.7)	194 (32.6)	10	605	256	(43.0)	(63.8)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	109 (18.4)	156 (26.3)	123 (20.7)	12 (2.0)	194 (32.7)	11	605	265	(44.6)	(66.3)
	112 (19.0)	144 (24.4)	124 (21.0)	15 (2.5)	195 (33.1)	15	605	256	(43.4)	(64.8)
	116 (19.5)	137 (23.0)	131 (22.0)	15 (2.5)	196 (32.9)	10	605	253	(42.5)	(63.4)
	114 (19.2)	141 (23.7)	127 (21.4)	13 (2.2)	199 (33.5)	11	605	255	(42.9)	(64.6)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	98 (16.6)	158 (26.8)	122 (20.7)	11 (1.9)	200 (34.0)	16	605	256	(43.5)	(65.8)
	104 (17.5)	143 (24.1)	132 (22.3)	13 (2.2)	201 (33.9)	12	605	247	(41.7)	(63.0)
	103 (17.5)	139 (23.6)	130 (22.1)	15 (2.6)	201 (34.2)	17	605	242	(41.2)	(62.5)
	103 (17.2)	144 (24.1)	132 (22.1)	16 (2.7)	203 (33.9)	7	605	247	(41.3)	(62.5)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作						計	1および2 (再掲)		
	1	2	3	4 (4～8)	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成9年度 第1期	230 (43.0)	156 (29.2)	74 (13.8)	71 (13.3)	4 (0.7)	70	605	386	(72.1)	(72.7)
平成10年度 第1期	197 (37.4)	162 (30.7)	80 (15.2)	67 (12.7)	21 (4.0)	78	605	359	(68.1)	(70.9)
平成11年度 第1期	184 (34.1)	169 (31.3)	75 (13.9)	79 (14.6)	33 (6.1)	65	605	353	(65.4)	(69.6)
平成12年度 第1期	165 (30.9)	171 (32.0)	70 (13.1)	83 (15.5)	45 (8.4)	71	605	336	(62.9)	(68.7)
平成13年度 第1期	161 (29.7)	160 (29.5)	84 (15.5)	78 (14.4)	59 (10.9)	63	605	321	(59.2)	(66.5)
平成14年度 第1期	155 (28.1)	164 (29.7)	91 (16.5)	76 (13.8)	66 (12.0)	53	605	319	(57.8)	(65.6)
平成15年度 第1期	139 (25.6)	149 (27.4)	99 (18.2)	76 (14.0)	81 (14.9)	61	605	288	(52.9)	(62.2)
平成16年度 第1期	130 (22.5)	150 (26.0)	112 (19.4)	92 (15.9)	93 (16.1)	28	605	280	(48.5)	(57.9)
平成17年度 第1期	133 (23.1)	144 (25.0)	94 (16.3)	95 (16.5)	111 (19.2)	28	605	277	(48.0)	(59.4)
平成18年度 第1期	115 (19.8)	146 (25.2)	100 (17.2)	94 (16.2)	125 (21.6)	25	605	261	(45.0)	(57.4)
平成19年度 第1期	118 (20.4)	139 (24.0)	102 (17.6)	82 (14.2)	137 (23.7)	27	605	257	(44.5)	(58.3)
平成20年度 第1期	113 (19.1)	130 (22.0)	107 (18.1)	84 (14.2)	157 (26.6)	14	605	243	(41.1)	(56.0)
平成21年度 第1期	103 (17.6)	127 (21.7)	107 (18.3)	80 (13.7)	167 (28.6)	21	605	230	(39.4)	(55.2)
平成22年度 第1期	104 (17.4)	132 (22.1)	94 (15.8)	90 (15.1)	176 (29.5)	9	605	236	(39.6)	(56.2)
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	99 (16.8)	126 (21.4)	93 (15.8)	82 (13.9)	188 (32.0)	17	605	225	(38.3)	(56.3)
	103 (17.5)	118 (20.1)	96 (16.3)	82 (13.9)	189 (32.1)	17	605	221	(37.6)	(55.4)
	102 (17.2)	119 (20.1)	94 (15.9)	85 (14.4)	192 (32.4)	13	605	221	(37.3)	(55.3)
	101 (17.1)	118 (20.0)	94 (16.0)	82 (13.9)	194 (32.9)	16	605	219	(37.2)	(55.4)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	103 (17.5)	115 (19.5)	92 (15.6)	86 (14.6)	194 (32.9)	15	605	218	(36.9)	(55.1)
	102 (17.4)	107 (18.3)	98 (16.7)	84 (14.3)	195 (33.3)	19	605	209	(35.7)	(53.5)
	99 (16.9)	109 (18.6)	94 (16.1)	87 (14.9)	196 (33.5)	20	605	208	(35.6)	(53.5)
	96 (16.3)	111 (18.8)	93 (15.8)	91 (15.4)	199 (33.7)	15	605	207	(35.1)	(52.9)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	93 (15.8)	111 (18.8)	93 (15.8)	92 (15.6)	200 (34.0)	16	605	204	(34.6)	(52.4)
	93 (15.8)	104 (17.6)	99 (16.8)	93 (15.8)	201 (34.1)	15	605	197	(33.4)	(50.6)
	92 (15.6)	106 (18.0)	100 (17.0)	90 (15.3)	201 (34.1)	16	605	198	(33.6)	(51.0)
	95 (16.0)	104 (17.5)	95 (16.0)	96 (16.2)	203 (34.2)	12	605	199	(33.6)	(51.0)

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央 値	
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成9年度 第1期	108 (29.9)	30 (8.3)	109 (30.2)	110 (30.5)	4 (1.1)	244	605	2600	2400
平成10年度 第1期	184 (36.5)	63 (12.5)	140 (27.8)	96 (19.0)	21 (4.2)	101	605	1200	940
平成11年度 第1期	247 (46.1)	42 (7.8)	136 (25.4)	78 (14.6)	33 (6.2)	69	605	585	430
平成12年度 第1期	276 (50.6)	37 (6.8)	115 (21.1)	72 (13.2)	45 (8.3)	60	605	400 未満	400 未満
平成13年度 第1期	282 (52.6)	35 (6.5)	95 (17.7)	65 (12.1)	59 (11.0)	69	605	400 未満	400 未満
平成14年度 第1期	286 (52.8)	39 (7.2)	88 (16.2)	63 (11.6)	66 (12.2)	63	605	400 未満	400 未満
平成15年度 第1期	288 (53.9)	28 (5.2)	70 (13.1)	67 (12.5)	81 (15.2)	71	605	400 未満	400 未満
平成16年度 第1期	305 (54.5)	30 (5.4)	67 (12.0)	65 (11.6)	93 (16.6)	45	605	400 未満	400 未満
平成17年度 第1期	307 (56.2)	20 (3.7)	51 (9.3)	57 (10.4)	111 (20.3)	59	605	400 未満	400 未満
平成18年度 第1期	328 (58.5)	23 (4.1)	50 (8.9)	35 (6.2)	125 (22.3)	44	605	400 未満	400 未満
平成19年度 第1期	332 (58.8)	21 (3.7)	38 (6.7)	37 (6.5)	137 (24.2)	40	605	400 未満	400 未満
平成20年度 第1期	327 (57.8)	25 (4.4)	34 (6.0)	23 (4.1)	157 (27.7)	39	605	400 未満	400 未満
平成21年度 第1期	343 (60.4)	10 (1.8)	24 (4.2)	24 (4.2)	167 (29.4)	37	605	400 未満	400 未満
平成22年度 第1期	363 (63.6)	5 (0.9)	20 (3.5)	7 (1.2)	176 (30.8)	34	605	400 未満	400 未満
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	356 (61.8)	8 (1.4)	15 (2.6)	9 (1.6)	188 (32.6)	29	605	400 未満	400 未満
	360 (62.3)	7 (1.2)	13 (2.2)	9 (1.6)	189 (32.7)	27	605	400 未満	400 未満
	356 (61.6)	9 (1.6)	14 (2.4)	7 (1.2)	192 (33.2)	27	605	400 未満	400 未満
	336 (59.8)	7 (1.2)	13 (2.3)	12 (2.1)	194 (34.5)	43	605	400 未満	400 未満
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	359 (62.0)	8 (1.4)	10 (1.7)	8 (1.4)	194 (33.5)	26	605	400 未満	400 未満
	362 (62.2)	8 (1.4)	8 (1.4)	9 (1.5)	195 (33.5)	23	605	400 未満	400 未満
	364 (62.8)	7 (1.2)	5 (0.9)	8 (1.4)	196 (33.8)	25	605	400 未満	400 未満
	317 (59.1)	6 (1.1)	4 (0.7)	10 (1.9)	199 (37.1)	69	605	400 未満	400 未満
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	360 (62.2)	8 (1.4)	7 (1.2)	4 (0.7)	200 (34.5)	26	605	400 未満	400 未満
	366 (62.7)	5 (0.9)	8 (1.4)	4 (0.7)	201 (34.4)	21	605	400 未満	400 未満
	369 (63.3)	5 (0.9)	5 (0.9)	3 (0.5)	201 (34.5)	22	605	400 未満	400 未満
	340 (61.4)	3 (0.5)	4 (0.7)	4 (0.7)	203 (36.6)	51	605	400 未満	400 未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分										計	
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明		
平成9年度 第1期	124 (22.9)	20 (3.7)	58 (10.7)	214 (39.5)	91 (16.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (6.5)	4	59	605	
平成10年度 第1期	105 (19.4)	31 (5.7)	21 (3.9)	153 (28.3)	204 (37.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	25 (4.6)	21	43	605	
平成11年度 第1期	96 (18.0)	30 (5.6)	15 (2.8)	110 (20.6)	260 (48.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	18 (3.4)	33	39	605	
平成12年度 第1期	92 (17.6)	36 (6.9)	11 (2.1)	86 (16.4)	235 (44.8)	28 (5.3)	0 (0.0)	36 (6.9)	45	36	605	
平成13年度 第1期	74 (14.8)	28 (5.6)	9 (1.8)	73 (14.6)	230 (46.1)	50 (10.0)	0 (0.0)	35 (7.0)	59	47	605	
平成14年度 第1期	80 (15.7)	45 (8.8)	5 (1.0)	66 (12.9)	204 (40.0)	71 (13.9)	0 (0.0)	39 (7.6)	66	29	605	
平成15年度 第1期	66 (13.7)	52 (10.8)	3 (0.6)	58 (12.0)	180 (37.3)	78 (16.2)	0 (0.0)	45 (9.3)	81	42	605	
平成16年度 第1期	70 (13.9)	58 (11.6)	4 (0.8)	49 (9.8)	195 (38.8)	89 (17.7)	0 (0.0)	37 (7.4)	93	10	605	
平成17年度 第1期	61 (12.7)	54 (11.3)	3 (0.6)	45 (9.4)	182 (37.9)	92 (19.2)	0 (0.0)	43 (9.0)	111	14	605	
平成18年度 第1期	56 (12.0)	52 (11.2)	5 (1.1)	33 (7.1)	192 (41.2)	91 (19.5)	0 (0.0)	37 (7.9)	125	14	605	
平成19年度 第1期	46 (10.1)	41 (9.0)	3 (0.7)	27 (5.9)	213 (46.7)	92 (20.2)	0 (0.0)	34 (7.5)	137	12	605	
平成20年度 第1期	41 (9.3)	30 (6.8)	2 (0.5)	25 (5.7)	211 (47.7)	88 (19.9)	5 (1.1)	40 (9.0)	157	6	605	
平成21年度 第1期	41 (9.4)	24 (5.5)	1 (0.2)	20 (4.6)	185 (42.6)	85 (19.6)	41 (9.4)	37 (8.5)	167	4	605	
平成22年度 第1期	35 (8.2)	22 (5.2)	1 (0.2)	15 (3.5)	162 (38.0)	83 (19.5)	78(18.3)	30 (7.0)	176	3	605	
平成23年度	第1期	28 (6.7)	19 (4.6)	1 (0.2)	12 (2.9)	142 (34.1)	74 (17.8)	116(27.9)	24 (5.8)	188	1	605
	第2期	27 (6.5)	17 (4.1)	1 (0.2)	13 (3.1)	140 (33.7)	73 (17.6)	118(28.4)	26 (6.3)	189	1	605
	第3期	26 (6.3)	17 (4.1)	0 (0.0)	12 (2.9)	134 (32.5)	72 (17.5)	125(30.3)	26 (6.3)	192	1	605
	第4期	24 (5.9)	15 (3.7)	0 (0.0)	12 (2.9)	132 (32.4)	67 (16.5)	132(32.4)	25 (6.1)	194	4	605
平成24年度	第1期	22 (5.4)	12 (3.0)	0 (0.0)	11 (2.7)	121 (29.9)	68 (16.8)	143(35.3)	28 (6.9)	194	6	605
	第2期	22 (5.4)	11 (2.7)	0 (0.0)	10 (2.5)	114 (28.2)	70 (17.3)	149(36.9)	28 (6.9)	195	6	605
	第3期	21 (5.2)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	106 (26.2)	69 (17.1)	161(39.9)	27 (6.7)	196	5	605
	第4期	19 (4.7)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	104 (25.9)	71 (17.7)	162(40.4)	25 (6.2)	199	5	605
平成25年度	第1期	17 (4.2)	11 (2.7)	0 (0.0)	8 (2.0)	97 (24.2)	68 (17.0)	170(42.4)	30 (7.5)	200	4	605
	第2期	16 (4.0)	10 (2.5)	0 (0.0)	7 (1.8)	93 (23.3)	67 (16.8)	176(44.1)	30 (7.5)	201	5	605
	第3期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	90 (22.6)	67 (16.8)	180(45.2)	30 (7.5)	201	6	605
	第4期	15 (3.8)	11 (2.8)	0 (0.0)	6 (1.5)	89 (22.4)	64 (16.1)	184(46.2)	29 (7.3)	203	4	605

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成9年度 第1期	296 (78.5)	44 (11.7)	25 (6.6)	8 (2.1)	4 (1.1)	21	144	59	4	605
平成10年度 第1期	310 (79.7)	53 (13.6)	17 (4.4)	6 (1.5)	3 (0.8)	16	136	43	21	605
平成11年度 第1期	330 (84.2)	46 (11.7)	11 (2.8)	5 (1.3)	0 (0.0)	15	126	39	33	605
平成12年度 第1期	319 (85.1)	35 (9.3)	13 (3.5)	8 (2.1)	0 (0.0)	21	128	36	45	605
平成13年度 第1期	314 (84.4)	40 (10.8)	11 (3.0)	6 (1.6)	1 (0.3)	25	102	47	59	605
平成14年度 第1期	321 (87.7)	29 (7.9)	11 (3.0)	5 (1.4)	0 (0.0)	19	125	29	66	605
平成15年度 第1期	315 (89.5)	27 (7.7)	8 (2.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	12	118	42	81	605
平成16年度 第1期	330 (88.5)	27 (7.2)	8 (2.1)	5 (1.3)	3 (0.8)	1	128	10	93	605
平成17年度 第1期	325 (89.5)	18 (5.0)	10 (2.8)	5 (1.4)	5 (1.4)	2	115	14	111	605
平成18年度 第1期	326 (91.1)	18 (5.0)	9 (2.5)	4 (1.1)	1 (0.3)	0	108	14	125	605
平成19年度 第1期	337 (92.6)	15 (4.1)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	5	87	12	137	605
平成20年度 第1期	346 (93.8)	13 (3.5)	4 (1.1)	4 (1.1)	2 (0.5)	2	71	6	157	605
平成21年度 第1期	342 (93.4)	14 (3.8)	6 (1.6)	3 (0.8)	1 (0.3)	3	65	4	167	605
平成22年度 第1期	341 (95.0)	12 (3.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	2 (0.6)	10	57	3	176	605
平成23年度 第1期	352 (96.2)	9 (2.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	3	47	1	188	605
第2期	352 (95.7)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)	3 (0.8)	3	44	1	189	605
第3期	352 (96.2)	7 (1.9)	3 (0.8)	0 (0.0)	4 (1.1)	3	43	1	192	605
第4期	349 (96.1)	7 (1.9)	4 (1.1)	0 (0.0)	3 (0.8)	5	39	4	194	605
平成24年度 第1期	358 (96.5)	9 (2.4)	2 (0.5)	2 (0.5)	0 (0.0)	0	34	6	194	605
第2期	359 (96.8)	9 (2.4)	2 (0.5)	1 (0.3)	0 (0.0)	0	33	6	195	605
第3期	362 (97.1)	7 (1.9)	3 (0.8)	1 (0.3)	0 (0.0)	0	31	5	196	605
第4期	361 (97.0)	7 (1.9)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	0	29	5	199	605
平成25年度 第1期	366 (98.1)	2 (0.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	0	28	4	200	605
第2期	363 (97.3)	4 (1.1)	4 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.5)	0	26	5	201	605
第3期	365 (97.6)	3 (0.8)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	0	24	6	201	605
第4期	363 (97.6)	5 (1.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.5)	0	26	4	203	605

() : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

		副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
		あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度	第1期	92 (23.1)	－	－	398	41 (10.3)	16 (4.0)	9 (2.3)	12 (3.0)
平成10年度	第1期	115 (28.4)	－	－	405	41 (10.1)	45 (11.1)	6 (1.5)	5 (1.2)
平成11年度	第1期	125 (30.7)	－	－	407	31 (7.6)	75 (18.4)	5 (1.2)	9 (2.2)
平成12年度	第1期	116 (29.3)	－	－	396	22 (5.6)	72 (18.2)	9 (2.3)	5 (1.3)
平成13年度	第1期	119 (30.0)	－	－	397	21 (5.3)	68 (17.1)	5 (1.3)	3 (0.8)
平成14年度	第1期	122 (31.7)	－	－	385	22 (5.7)	62 (16.1)	3 (0.8)	6 (1.6)
平成15年度	第1期	125 (34.3)	－	－	364	20 (5.5)	50 (13.7)	3 (0.8)	4 (1.1)
平成16年度	第1期	150 (40.1)	216 (57.8)	8 (2.1)	374	24 (6.4)	56 (15.0)	5 (1.3)	11 (2.9)
平成17年度	第1期	140 (38.4)	213 (58.4)	12 (3.3)	365	21 (5.8)	46 (12.6)	4 (1.1)	10 (2.7)
平成18年度	第1期	136 (38.0)	202 (56.4)	20 (5.6)	358	16 (4.5)	49 (13.7)	7 (2.0)	10 (2.8)
平成19年度	第1期	108 (29.3)	222 (60.2)	39 (10.6)	369	16 (4.3)	26 (7.0)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成20年度	第1期	120 (32.3)	236 (63.6)	15 (4.0)	371	16 (4.3)	23 (6.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成21年度	第1期	105 (28.5)	248 (67.2)	16 (4.3)	369	8 (2.2)	18 (4.9)	3 (0.8)	8 (2.2)
平成22年度	第1期	104 (28.2)	255 (69.1)	10 (2.7)	369	8 (2.2)	16 (4.3)	1 (0.3)	5 (1.4)
平成23年度	第1期	104 (28.2)	250 (67.8)	15 (4.1)	369	12 (3.3)	13 (3.5)	2 (0.5)	4 (1.1)
	第2期	104 (28.0)	253 (68.2)	14 (3.8)	371	11 (3.0)	13 (3.5)	4 (1.1)	3 (0.8)
	第3期	104 (28.2)	250 (67.8)	15 (4.1)	369	13 (3.5)	11 (3.0)	4 (1.1)	4 (1.1)
	第4期	103 (28.0)	251 (68.2)	14 (3.8)	368	13 (3.5)	12 (3.3)	4 (1.1)	6 (1.6)
平成24年度	第1期	91 (24.5)	272 (73.3)	8 (2.2)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第2期	93 (25.1)	271 (73.0)	7 (1.9)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
	第3期	89 (23.9)	274 (73.5)	10 (2.7)	373	11 (2.9)	13 (3.5)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第4期	86 (23.1)	277 (74.5)	9 (2.4)	372	10 (2.7)	13 (3.5)	5 (1.3)	7 (1.9)
平成25年度	第1期	84 (22.5)	281 (75.3)	8 (2.1)	373	6 (1.6)	14 (3.8)	1 (0.3)	5 (1.3)
	第2期	84 (22.5)	280 (75.1)	9 (2.4)	373	7 (1.9)	13 (3.5)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第3期	86 (23.0)	280 (74.9)	8 (2.1)	374	7 (1.9)	12 (3.2)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第4期	86 (23.1)	278 (74.7)	8 (2.2)	372	6 (1.6)	13 (3.5)	1 (0.3)	5 (1.3)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-5-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	9 (2.3)	9 (2.3)	9 (2.3)	5 (1.3)	—	—	—	20 (5.0)
平成10年度 第1期	10 (2.5)	10 (2.5)	13 (3.2)	11 (2.7)	—	—	—	26 (6.4)
平成11年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.2)	7 (1.7)	6 (1.5)	—	—	—	21 (5.2)
平成12年度 第1期	2 (0.5)	9 (2.3)	6 (1.5)	8 (2.0)	—	—	—	22 (5.6)
平成13年度 第1期	2 (0.5)	10 (2.5)	7 (1.8)	7 (1.8)	—	—	—	28 (7.1)
平成14年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.4)	7 (1.8)	2 (0.5)	16 (4.2)	17 (4.4)	—	18 (4.7)
平成15年度 第1期	2 (0.5)	14 (3.8)	4 (1.1)	6 (1.6)	21 (5.8)	45 (12.4)	—	17 (4.7)
平成16年度 第1期	2 (0.5)	15 (4.0)	8 (2.1)	7 (1.9)	19 (5.1)	47 (12.6)	—	29 (7.8)
平成17年度 第1期	2 (0.5)	16 (4.4)	4 (1.1)	9 (2.5)	27 (7.4)	36 (9.9)	—	31 (8.5)
平成18年度 第1期	1 (0.3)	11 (3.1)	10 (2.8)	7 (2.0)	16 (4.5)	39 (10.9)	19 (5.3)	24 (6.7)
平成19年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	8 (2.2)	4 (1.1)	15 (4.1)	31 (8.4)	19 (5.1)	17 (4.6)
平成20年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	4 (1.1)	7 (1.9)	13 (3.5)	39 (10.5)	20 (5.4)	24 (6.5)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	5 (1.4)	7 (1.9)	8 (2.2)	8 (2.2)	36 (9.8)	19 (5.1)	22 (6.0)
平成22年度 第1期	1 (0.3)	4 (1.1)	5 (1.4)	6 (1.6)	9 (2.4)	44 (11.9)	23 (6.2)	18 (4.9)
平成23年度	第1期	2 (0.5)	9 (2.4)	7 (1.9)	7 (1.9)	13 (3.5)	42 (11.4)	18 (4.9)
	第2期	2 (0.5)	10 (2.7)	5 (1.3)	9 (2.4)	14 (3.8)	42 (11.3)	18 (4.9)
	第3期	2 (0.5)	10 (2.7)	6 (1.6)	7 (1.9)	17 (4.6)	42 (11.4)	18 (4.9)
	第4期	3 (0.8)	10 (2.7)	9 (2.4)	7 (1.9)	15 (4.1)	41 (11.1)	18 (4.9)
平成24年度	第1期	2 (0.5)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	12 (3.2)	35 (9.4)	13 (3.5)
	第2期	4 (1.1)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	13 (3.5)	35 (9.4)	11 (3.0)
	第3期	2 (0.5)	8 (2.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	10 (2.7)	35 (9.4)	9 (2.4)
	第4期	3 (0.8)	8 (2.2)	5 (1.3)	4 (1.1)	8 (2.2)	36 (9.7)	9 (2.4)
平成25年度	第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	5 (1.3)	4 (1.1)	7 (1.9)	38 (10.2)	12 (3.2)
	第2期	3 (0.8)	4 (1.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	8 (2.1)	37 (9.9)	12 (3.2)
	第3期	3 (0.8)	7 (1.9)	4 (1.1)	6 (1.6)	7 (1.9)	37 (9.9)	12 (3.2)
	第4期	2 (0.5)	7 (1.9)	4 (1.1)	7 (1.9)	9 (2.4)	37 (9.9)	10 (2.7)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	C D 4 値							中 央 値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成19年度 第1期	3 (0.5)	67 (12.2)	171 (31.2)	136 (24.8)	171 (31.2)	53	601	381	381
第2期	9 (1.6)	74 (13.4)	142 (25.7)	147 (26.6)	180 (32.6)	49	601	395	397
第3期	17 (3.1)	66 (11.9)	145 (26.2)	154 (27.8)	172 (31.0)	47	601	380	384
第4期	19 (3.8)	71 (14.1)	142 (28.2)	130 (25.8)	142 (28.2)	97	601	371	385
平成20年度 第1期	27 (4.9)	66 (11.9)	150 (27.1)	153 (27.7)	157 (28.4)	48	601	385	396
第2期	30 (5.4)	63 (11.4)	142 (25.6)	149 (26.8)	171 (30.8)	46	601	390	406
第3期	34 (6.1)	59 (10.6)	154 (27.6)	141 (25.3)	170 (30.5)	43	601	382	398
第4期	39 (7.7)	49 (9.7)	139 (27.6)	122 (24.2)	155 (30.8)	97	601	374	400
平成21年度 第1期	40 (7.1)	50 (8.9)	140 (24.9)	125 (22.2)	208 (36.9)	38	601	404	431
第2期	42 (7.5)	50 (9.0)	125 (22.4)	150 (26.9)	191 (34.2)	43	601	409	429
第3期	45 (7.9)	59 (10.4)	124 (21.9)	143 (25.2)	196 (34.6)	34	601	407	425
第4期	47 (9.1)	54 (10.4)	122 (23.5)	115 (22.2)	181 (34.9)	82	601	400	420
平成22年度 第1期	50 (8.8)	53 (9.3)	131 (23.0)	153 (26.8)	183 (32.1)	31	601	400	435
第2期	54 (9.5)	50 (8.8)	127 (22.4)	141 (24.9)	194 (34.3)	35	601	408	430
第3期	56 (9.8)	50 (8.8)	127 (22.2)	133 (23.3)	205 (35.9)	30	601	410	444
第4期	62 (12.0)	50 (9.7)	107 (20.7)	125 (24.2)	173 (33.5)	84	601	397	439
平成23年度 第1期	63 (11.2)	47 (8.3)	115 (20.4)	149 (26.4)	190 (33.7)	37	601	412	442
第2期	64 (11.2)	45 (7.9)	124 (21.7)	135 (23.6)	203 (35.6)	30	601	409	441
第3期	67 (11.9)	45 (8.0)	113 (20.0)	137 (24.3)	202 (35.8)	37	601	405	448
第4期	69 (12.6)	45 (8.2)	102 (18.7)	131 (24.0)	199 (36.4)	55	601	407	440
平成24年度 第1期	72 (12.7)	37 (6.5)	105 (18.6)	147 (26.0)	204 (36.1)	36	601	420	458
第2期	74 (13.1)	37 (6.5)	115 (20.4)	137 (24.2)	202 (35.8)	36	601	416	450
第3期	75 (13.3)	35 (6.2)	115 (20.3)	129 (22.8)	212 (37.5)	35	601	436	469
第4期	78 (15.0)	31 (6.0)	100 (19.3)	118 (22.7)	192 (37.0)	82	601	411	467
平成25年度 第1期	80 (14.0)	34 (6.0)	114 (20.0)	119 (20.9)	223 (39.1)	31	601	415	469
第2期	83 (14.5)	39 (6.8)	93 (16.2)	146 (25.5)	212 (37.0)	28	601	428	466
第3期	83 (14.4)	41 (7.1)	89 (15.4)	137 (23.7)	228 (39.4)	23	601	427	473
第4期	87 (16.4)	29 (5.5)	90 (17.0)	122 (23.0)	202 (38.1)	71	601	419	482

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4 / CD8 比								中 央 値	
	AIDS発病・ 死亡	～0.10未満	0.10～ 0.50未満	0.50～ 1.00未満	1.00～ 1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡 含 む	含 まず
平成19年度 第1期	3 (0.6)	4 (0.8)	188 (36.4)	212 (41.1)	81 (15.7)	28 (5.4)	85	601	0.59	0.60
第2期	9 (1.7)	5 (1.0)	181 (34.7)	220 (42.1)	77 (14.8)	30 (5.7)	79	601	0.60	0.60
第3期	17 (3.2)	5 (1.0)	161 (30.7)	222 (42.4)	91 (17.4)	28 (5.3)	77	601	0.62	0.65
第4期	19 (4.0)	6 (1.3)	155 (32.8)	197 (41.7)	73 (15.5)	22 (4.7)	129	601	0.59	0.60
平成20年度 第1期	27 (5.1)	6 (1.1)	161 (30.4)	227 (42.8)	85 (16.0)	24 (4.5)	71	601	0.60	0.62
第2期	30 (5.6)	7 (1.3)	159 (29.9)	206 (38.8)	99 (18.6)	30 (5.6)	70	601	0.60	0.65
第3期	34 (6.4)	6 (1.1)	146 (27.4)	214 (40.2)	104 (19.5)	28 (5.3)	69	601	0.62	0.67
第4期	39 (8.1)	5 (1.0)	126 (26.1)	195 (40.5)	89 (18.5)	28 (5.8)	119	601	0.63	0.69
平成21年度 第1期	40 (7.6)	6 (1.1)	145 (27.7)	206 (39.3)	97 (18.5)	30 (5.7)	77	601	0.62	0.68
第2期	42 (8.1)	2 (0.4)	134 (25.9)	215 (41.6)	92 (17.8)	32 (6.2)	84	601	0.62	0.69
第3期	45 (8.4)	6 (1.1)	137 (25.6)	217 (40.5)	98 (18.3)	33 (6.2)	65	601	0.62	0.68
第4期	47 (9.7)	6 (1.2)	117 (24.1)	202 (41.6)	90 (18.5)	24 (4.9)	115	601	0.61	0.70
平成22年度 第1期	50 (9.3)	5 (0.9)	130 (24.1)	229 (42.5)	90 (16.7)	35 (6.5)	62	601	0.64	0.70
第2期	54 (10.2)	2 (0.4)	118 (22.2)	223 (41.9)	93 (17.5)	42 (7.9)	69	601	0.64	0.70
第3期	56 (10.4)	3 (0.6)	127 (23.6)	213 (39.7)	93 (17.3)	45 (8.4)	64	601	0.67	0.71
第4期	62 (12.7)	3 (0.6)	108 (22.1)	190 (38.9)	88 (18.0)	38 (7.8)	112	601	0.65	0.71
平成23年度 第1期	63 (11.8)	2 (0.4)	120 (22.6)	217 (40.8)	83 (15.6)	47 (8.8)	69	601	0.66	0.72
第2期	64 (11.8)	1 (0.2)	114 (21.1)	221 (40.9)	99 (18.3)	42 (7.8)	60	601	0.64	0.70
第3期	67 (12.5)	1 (0.2)	107 (19.9)	219 (40.8)	104 (19.4)	39 (7.3)	64	601	0.68	0.72
第4期	69 (13.3)	3 (0.6)	99 (19.1)	216 (41.7)	82 (15.8)	49 (9.5)	83	601	0.69	0.75
平成24年度 第1期	72 (13.4)	1 (0.2)	102 (19.0)	218 (40.7)	98 (18.3)	45 (8.4)	65	601	0.70	0.76
第2期	74 (13.8)	0 (0.0)	100 (18.6)	208 (38.7)	110 (20.5)	45 (8.4)	64	601	0.70	0.79
第3期	75 (14.0)	1 (0.2)	103 (19.2)	200 (37.3)	105 (19.6)	52 (9.7)	65	601	0.70	0.80
第4期	78 (15.8)	1 (0.2)	84 (17.0)	181 (36.7)	102 (20.7)	47 (9.5)	108	601	0.70	0.80
平成25年度 第1期	80 (14.6)	1 (0.2)	101 (18.4)	215 (39.2)	96 (17.5)	55 (10.0)	53	601	0.69	0.75
第2期	83 (15.2)	1 (0.2)	90 (16.5)	225 (41.1)	94 (17.2)	54 (9.9)	54	601	0.70	0.78
第3期	83 (15.0)	2 (0.4)	81 (14.7)	228 (41.3)	108 (19.6)	50 (9.1)	49	601	0.70	0.80
第4期	87 (17.2)	2 (0.4)	78 (15.4)	193 (38.1)	92 (18.2)	54 (10.7)	95	601	0.70	0.80

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）		
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	154 (26.6)	240 (41.4)	163 (28.1)	20 (3.4)	3 (0.5)	21	601	394	(67.9)	(68.3)
	162 (27.8)	219 (37.6)	169 (29.0)	23 (4.0)	9 (1.5)	19	601	381	(65.5)	(66.5)
	157 (26.8)	214 (36.6)	178 (30.4)	19 (3.2)	17 (2.9)	16	601	371	(63.4)	(65.3)
	157 (27.0)	207 (35.6)	184 (31.6)	15 (2.6)	19 (3.3)	19	601	364	(62.5)	(64.7)
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	148 (25.2)	231 (39.4)	161 (27.4)	20 (3.4)	27 (4.6)	14	601	379	(64.6)	(67.7)
	148 (25.4)	208 (35.7)	172 (29.6)	24 (4.1)	30 (5.2)	19	601	356	(61.2)	(64.5)
	146 (25.2)	213 (36.8)	164 (28.3)	22 (3.8)	34 (5.9)	22	601	359	(62.0)	(65.9)
	156 (26.5)	196 (33.3)	175 (29.8)	22 (3.7)	39 (6.6)	13	601	352	(59.9)	(64.1)
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	136 (23.3)	228 (39.1)	166 (28.5)	13 (2.2)	40 (6.9)	18	601	364	(62.4)	(67.0)
	145 (24.7)	216 (36.7)	167 (28.4)	18 (3.1)	42 (7.1)	13	601	361	(61.4)	(66.1)
	137 (23.5)	217 (37.2)	167 (28.6)	17 (2.9)	45 (7.7)	18	601	354	(60.7)	(65.8)
	139 (23.7)	211 (36.0)	174 (29.7)	15 (2.6)	47 (8.0)	15	601	350	(59.7)	(64.9)
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.2)	213 (36.3)	162 (27.6)	19 (3.2)	50 (8.5)	15	601	355	(60.6)	(66.2)
	146 (24.9)	207 (35.3)	160 (27.3)	19 (3.2)	54 (9.2)	15	601	353	(60.2)	(66.4)
	142 (24.0)	199 (33.6)	175 (29.6)	20 (3.4)	56 (9.5)	9	601	341	(57.6)	(63.6)
	141 (24.1)	205 (35.0)	154 (26.3)	23 (3.9)	62 (10.6)	16	601	346	(59.1)	(66.2)
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	134 (22.9)	216 (36.9)	150 (25.6)	23 (3.9)	63 (10.8)	15	601	350	(59.7)	(66.9)
	138 (23.5)	204 (34.8)	153 (26.1)	27 (4.6)	64 (10.9)	15	601	342	(58.4)	(65.5)
	138 (23.4)	204 (34.5)	161 (27.2)	21 (3.6)	67 (11.3)	10	601	342	(57.9)	(65.3)
	143 (24.2)	199 (33.7)	157 (26.6)	23 (3.9)	69 (11.7)	10	601	342	(57.9)	(65.5)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.1)	202 (34.3)	158 (26.8)	15 (2.5)	72 (12.2)	12	601	344	(58.4)	(66.5)
	146 (25.0)	191 (32.6)	154 (26.3)	20 (3.4)	74 (12.6)	16	601	337	(57.6)	(65.9)
	149 (25.2)	182 (30.8)	166 (28.1)	19 (3.2)	75 (12.7)	10	601	331	(56.0)	(64.1)
	147 (25.0)	183 (31.1)	164 (27.9)	16 (2.7)	78 (13.3)	13	601	330	(56.1)	(64.7)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	129 (22.2)	205 (35.2)	153 (26.3)	15 (2.6)	80 (13.7)	19	601	334	(57.4)	(66.5)
	136 (23.3)	184 (31.6)	163 (28.0)	17 (2.9)	83 (14.2)	18	601	320	(54.9)	(64.0)
	134 (23.1)	186 (32.0)	159 (27.4)	19 (3.3)	83 (14.3)	20	601	320	(55.1)	(64.3)
	134 (22.6)	186 (31.4)	165 (27.8)	21 (3.5)	87 (14.7)	8	601	320	(54.0)	(63.2)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作							計	1および2 (再掲)		
	1	2	3	4 (4～8)	AIDS発病・ 死亡	不明	人数		AIDS発病・死亡		
									含 む	含まず	
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	153 (26.9)	182 (32.0)	124 (21.8)	106 (18.7)	3 (0.5)	33	601	335	(59.0)	(59.3)	
	153 (27.0)	171 (30.2)	124 (21.9)	110 (19.4)	9 (1.6)	34	601	324	(57.1)	(58.1)	
	151 (26.4)	178 (31.2)	119 (20.8)	106 (18.6)	17 (3.0)	30	601	329	(57.6)	(59.4)	
	152 (26.5)	175 (30.5)	121 (21.1)	107 (18.6)	19 (3.3)	27	601	327	(57.0)	(58.9)	
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	144 (24.6)	173 (29.5)	136 (23.2)	106 (18.1)	27 (4.6)	15	601	317	(54.1)	(56.7)	
	143 (24.6)	164 (28.2)	131 (22.5)	114 (19.6)	30 (5.2)	19	601	307	(52.7)	(55.6)	
	139 (23.8)	162 (27.8)	134 (23.0)	114 (19.6)	34 (5.8)	18	601	301	(51.6)	(54.8)	
	143 (24.3)	168 (28.6)	130 (22.1)	108 (18.4)	39 (6.6)	13	601	311	(52.9)	(56.6)	
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.7)	164 (28.5)	133 (23.1)	97 (16.8)	40 (6.9)	25	601	306	(53.1)	(57.1)	
	143 (24.7)	171 (29.5)	126 (21.7)	98 (16.9)	42 (7.2)	21	601	314	(54.1)	(58.4)	
	138 (23.8)	158 (27.2)	133 (22.9)	107 (18.4)	45 (7.7)	20	601	296	(50.9)	(55.2)	
	140 (24.0)	163 (27.9)	131 (22.4)	103 (17.6)	47 (8.0)	17	601	303	(51.9)	(56.4)	
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	139 (23.6)	165 (28.0)	120 (20.4)	115 (19.5)	50 (8.5)	12	601	304	(51.6)	(56.4)	
	136 (23.1)	162 (27.5)	125 (21.2)	112 (19.0)	54 (9.2)	12	601	298	(50.6)	(55.7)	
	135 (23.1)	149 (25.5)	128 (21.9)	116 (19.9)	56 (9.6)	17	601	284	(48.6)	(53.8)	
	137 (23.3)	149 (25.3)	131 (22.3)	109 (18.5)	62 (10.5)	13	601	286	(48.6)	(54.4)	
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	135 (23.2)	157 (26.9)	121 (20.8)	107 (18.4)	63 (10.8)	18	601	292	(50.1)	(56.2)	
	139 (23.9)	149 (25.6)	123 (21.1)	107 (18.4)	64 (11.0)	19	601	288	(49.5)	(55.6)	
	137 (23.4)	151 (25.8)	119 (20.3)	111 (19.0)	67 (11.5)	16	601	288	(49.2)	(55.6)	
	137 (23.5)	147 (25.2)	122 (20.9)	108 (18.5)	69 (11.8)	18	601	284	(48.7)	(55.3)	
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	136 (23.2)	148 (25.3)	120 (20.5)	109 (18.6)	72 (12.3)	16	601	284	(48.5)	(55.4)	
	135 (23.2)	139 (23.9)	125 (21.5)	108 (18.6)	74 (12.7)	20	601	274	(47.2)	(54.0)	
	130 (22.5)	144 (24.9)	116 (20.0)	114 (19.7)	75 (13.0)	22	601	274	(47.3)	(54.4)	
	128 (21.9)	144 (24.6)	119 (20.3)	116 (19.8)	78 (13.3)	16	601	272	(46.5)	(53.6)	
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	127 (21.9)	139 (23.9)	122 (21.0)	113 (19.4)	80 (13.8)	20	601	266	(45.8)	(53.1)	
	128 (22.0)	131 (22.5)	128 (22.0)	112 (19.2)	83 (14.3)	19	601	259	(44.5)	(51.9)	
	125 (21.5)	133 (22.9)	129 (22.2)	111 (19.1)	83 (14.3)	20	601	258	(44.4)	(51.8)	
	129 (22.0)	132 (22.5)	123 (21.0)	116 (19.8)	87 (14.8)	14	601	261	(44.5)	(52.2)	

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央 値	
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	414 (76.1)	27 (5.0)	50 (9.2)	50 (9.2)	3 (0.6)	57	601	50	50
	414 (75.4)	24 (4.4)	56 (10.2)	46 (8.4)	9 (1.6)	52	601	50	50
	426 (76.3)	24 (4.3)	47 (8.4)	44 (7.9)	17 (3.0)	43	601	50	50
	362 (73.1)	24 (4.8)	47 (9.5)	43 (8.7)	19 (3.8)	106	601	56	50
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	409 (74.5)	35 (6.4)	44 (8.0)	34 (6.2)	27 (4.9)	52	601	50	50
	417 (75.3)	23 (4.2)	47 (8.5)	37 (6.7)	30 (5.4)	47	601	50	47
	429 (77.2)	15 (2.7)	44 (7.9)	34 (6.1)	34 (6.1)	45	601	50	41
	379 (75.5)	21 (4.2)	37 (7.4)	26 (5.2)	39 (7.8)	99	601	50	50
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	439 (78.8)	16 (2.9)	31 (5.6)	31 (5.6)	40 (7.2)	44	601	40	40
	437 (79.5)	15 (2.7)	34 (6.2)	22 (4.0)	42 (7.6)	51	601	40	40
	452 (79.6)	16 (2.8)	27 (4.8)	28 (4.9)	45 (7.9)	33	601	40	40
	403 (80.1)	10 (2.0)	23 (4.6)	20 (4.0)	47 (9.3)	98	601	40	検出せず
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	464 (82.4)	7 (1.2)	31 (5.5)	11 (2.0)	50 (8.9)	38	601	検出せず	検出せず
	460 (82.0)	12 (2.1)	23 (4.1)	12 (2.1)	54 (9.6)	40	601	検出せず	検出せず
	463 (82.2)	9 (1.6)	14 (2.5)	21 (3.7)	56 (9.9)	38	601	40	検出せず
	409 (79.9)	10 (2.0)	13 (2.5)	18 (3.5)	62 (12.1)	89	601	40	検出せず
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	454 (80.4)	13 (2.3)	22 (3.9)	13 (2.3)	63 (11.2)	36	601	検出せず	検出せず
	462 (81.2)	10 (1.8)	20 (3.5)	13 (2.3)	64 (11.2)	32	601	検出せず	検出せず
	456 (80.9)	11 (2.0)	20 (3.5)	10 (1.8)	67 (11.9)	37	601	検出せず	検出せず
	432 (78.8)	8 (1.5)	24 (4.4)	15 (2.7)	69 (12.6)	53	601	検出せず	検出せず
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	455 (80.1)	10 (1.8)	18 (3.2)	13 (2.3)	72 (12.7)	33	601	40	検出せず
	463 (80.9)	10 (1.7)	11 (1.9)	14 (2.4)	74 (12.9)	29	601	40	検出せず
	468 (81.5)	9 (1.6)	11 (1.9)	11 (1.9)	75 (13.1)	27	601	40	検出せず
	413 (79.6)	8 (1.5)	8 (1.5)	12 (2.3)	78 (15.0)	82	601	40	検出せず
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	464 (81.4)	8 (1.4)	11 (1.9)	7 (1.2)	80 (14.0)	31	601	40	40 未満
	462 (81.2)	6 (1.1)	11 (1.9)	7 (1.2)	83 (14.6)	32	601	40	検出せず
	476 (82.4)	6 (1.0)	9 (1.6)	4 (0.7)	83 (14.4)	23	601	40	検出せず
	432 (80.9)	4 (0.7)	7 (1.3)	4 (0.7)	87 (16.3)	67	601	40	検出せず

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成19年度 第1期	74 (12.8)	45 (7.8)	31 (5.3)	267 (46.0)	113 (19.5)	0 (0.0)	50 (8.6)	3	18	601
第2期	75 (13.1)	45 (7.8)	29 (5.1)	259 (45.1)	115 (20.0)	0 (0.0)	51 (8.9)	9	18	601
第3期	71 (12.4)	43 (7.5)	27 (4.7)	262 (45.8)	116 (20.3)	0 (0.0)	53 (9.3)	17	12	601
第4期	69 (12.1)	39 (6.8)	28 (4.9)	267 (46.8)	114 (20.0)	4 (0.7)	49 (8.6)	19	12	601
平成20年度 第1期	67 (11.9)	33 (5.9)	29 (5.1)	269 (47.7)	109 (19.3)	5 (0.9)	52 (9.2)	27	10	601
第2期	66 (11.8)	35 (6.2)	28 (5.0)	264 (47.1)	106 (18.9)	12 (2.1)	50 (8.9)	30	10	601
第3期	61 (10.9)	36 (6.4)	27 (4.8)	257 (45.9)	105 (18.8)	29 (5.2)	45 (8.0)	34	7	601
第4期	60 (10.9)	31 (5.6)	24 (4.4)	247 (45.0)	102 (18.6)	41 (7.5)	44 (8.0)	39	13	601
平成21年度 第1期	62 (11.2)	28 (5.0)	22 (4.0)	241 (43.3)	110 (19.8)	45 (8.1)	48 (8.6)	40	5	601
第2期	61 (11.0)	29 (5.2)	19 (3.4)	231 (41.6)	110 (19.8)	55 (9.9)	50 (9.0)	42	4	601
第3期	60 (10.8)	26 (4.7)	19 (3.4)	220 (39.8)	106 (19.2)	73 (13.2)	49 (8.9)	45	3	601
第4期	56 (10.2)	24 (4.4)	18 (3.3)	218 (39.9)	104 (19.0)	79 (14.4)	48 (8.8)	47	7	601
平成22年度 第1期	53 (9.7)	26 (4.8)	17 (3.1)	211 (38.6)	107 (19.6)	91 (16.7)	41 (7.5)	50	5	601
第2期	52 (9.6)	26 (4.8)	17 (3.1)	204 (37.7)	105 (19.4)	98 (18.1)	39 (7.2)	54	6	601
第3期	49 (9.1)	28 (5.2)	15 (2.8)	196 (36.2)	103 (19.0)	109 (20.1)	41 (7.6)	56	4	601
第4期	49 (9.2)	26 (4.9)	16 (3.0)	183 (34.5)	99 (18.7)	119 (22.5)	38 (7.2)	62	9	601
平成23年度 第1期	45 (8.4)	26 (4.8)	14 (2.6)	185 (34.5)	97 (18.1)	137 (25.5)	33 (6.1)	63	1	601
第2期	43 (8.0)	23 (4.3)	15 (2.8)	183 (34.1)	97 (18.1)	139 (25.9)	36 (6.7)	64	1	601
第3期	42 (7.9)	22 (4.1)	14 (2.6)	175 (32.8)	96 (18.0)	149 (28.0)	35 (6.6)	67	1	601
第4期	40 (7.6)	19 (3.6)	14 (2.7)	174 (33.0)	90 (17.0)	160 (30.3)	31 (5.9)	69	4	601
平成24年度 第1期	37 (7.1)	16 (3.1)	13 (2.5)	162 (31.1)	86 (16.5)	173 (33.2)	34 (6.5)	72	8	601
第2期	36 (6.9)	14 (2.7)	11 (2.1)	152 (29.2)	87 (16.7)	186 (35.8)	34 (6.5)	74	7	601
第3期	35 (6.7)	12 (2.3)	12 (2.3)	142 (27.3)	87 (16.7)	197 (37.9)	35 (6.7)	75	6	601
第4期	32 (6.2)	12 (2.3)	11 (2.1)	137 (26.5)	91 (17.6)	201 (38.9)	33 (6.4)	78	6	601
平成25年度 第1期	29 (5.6)	12 (2.3)	9 (1.7)	127 (24.6)	89 (17.2)	210 (40.6)	41 (7.9)	80	4	601
第2期	26 (5.1)	10 (1.9)	8 (1.6)	121 (23.6)	89 (17.3)	218 (42.5)	41 (8.0)	83	5	601
第3期	25 (4.9)	9 (1.8)	8 (1.6)	115 (22.5)	89 (17.4)	225 (43.9)	41 (8.0)	83	6	601
第4期	24 (4.7)	12 (2.4)	7 (1.4)	112 (22.0)	84 (16.5)	230 (45.2)	40 (7.9)	87	5	601

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	119	18	3	601
第2期	420 (93.3)	12 (2.7)	10 (2.2)	3 (0.7)	5 (1.1)	4	120	18	9	601
第3期	422 (93.0)	17 (3.7)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	4	114	12	17	601
第4期	421 (92.7)	17 (3.7)	7 (1.5)	3 (0.7)	6 (1.3)	8	108	12	19	601
平成20年度 第1期	431 (93.7)	16 (3.5)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.7)	4	100	10	27	601
第2期	428 (93.9)	16 (3.5)	5 (1.1)	3 (0.7)	4 (0.9)	4	101	10	30	601
第3期	431 (93.7)	15 (3.3)	7 (1.5)	4 (0.9)	3 (0.7)	3	97	7	34	601
第4期	425 (93.6)	15 (3.3)	5 (1.1)	5 (1.1)	4 (0.9)	4	91	13	39	601
平成21年度 第1期	434 (93.7)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	90	5	40	601
第2期	435 (94.2)	13 (2.8)	8 (1.7)	3 (0.6)	3 (0.6)	3	90	4	42	601
第3期	439 (94.6)	12 (2.6)	5 (1.1)	3 (0.6)	5 (1.1)	3	86	3	45	601
第4期	440 (94.8)	13 (2.8)	6 (1.3)	2 (0.4)	3 (0.6)	3	80	7	47	601
平成22年度 第1期	433 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	79	5	50	601
第2期	430 (95.1)	16 (3.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	78	6	54	601
第3期	432 (94.9)	14 (3.1)	3 (0.7)	2 (0.4)	4 (0.9)	9	77	4	56	601
第4期	429 (96.4)	10 (2.2)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	10	75	9	62	601
平成23年度 第1期	447 (96.5)	9 (1.9)	4 (0.9)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	71	1	63	601
第2期	448 (95.9)	10 (2.1)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.1)	3	66	1	64	601
第3期	449 (96.4)	8 (1.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	6 (1.3)	3	64	1	67	601
第4期	446 (96.3)	8 (1.7)	4 (0.9)	0 (0.0)	5 (1.1)	6	59	4	69	601
平成24年度 第1期	452 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	53	8	72	601
第2期	454 (96.6)	11 (2.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	50	7	74	601
第3期	459 (97.0)	9 (1.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	47	6	75	601
第4期	459 (97.0)	9 (1.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	0	44	6	78	601
平成25年度 第1期	464 (97.5)	4 (0.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	4 (0.8)	0	41	4	80	601
第2期	462 (96.9)	6 (1.3)	4 (0.8)	0 (0.0)	5 (1.0)	0	36	5	83	601
第3期	465 (97.3)	5 (1.0)	3 (0.6)	2 (0.4)	3 (0.6)	0	34	6	83	601
第4期	460 (97.3)	7 (1.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	36	5	87	601

() : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

		副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
		あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成19年度	第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
	第2期	139 (30.6)	266 (58.6)	49 (10.8)	454	18 (4.0)	36 (7.9)	6 (1.3)	10 (2.2)
	第3期	137 (29.9)	276 (60.3)	45 (9.8)	458	15 (3.3)	39 (8.5)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第4期	131 (28.4)	281 (60.8)	50 (10.8)	462	14 (3.0)	37 (8.0)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成20年度	第1期	145 (31.3)	301 (64.9)	18 (3.9)	464	20 (4.3)	31 (6.7)	5 (1.1)	9 (1.9)
	第2期	148 (32.2)	296 (64.3)	16 (3.5)	460	20 (4.3)	31 (6.7)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第3期	145 (31.3)	304 (65.7)	14 (3.0)	463	20 (4.3)	25 (5.4)	6 (1.3)	7 (1.5)
	第4期	134 (29.3)	306 (66.8)	18 (3.9)	458	22 (4.8)	26 (5.7)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成21年度	第1期	128 (27.5)	321 (68.9)	17 (3.6)	466	11 (2.4)	27 (5.8)	3 (0.6)	9 (1.9)
	第2期	123 (26.5)	324 (69.7)	18 (3.9)	465	7 (1.5)	31 (6.7)	5 (1.1)	10 (2.2)
	第3期	125 (26.8)	328 (70.2)	14 (3.0)	467	8 (1.7)	29 (6.2)	4 (0.9)	8 (1.7)
	第4期	115 (24.6)	336 (71.9)	16 (3.4)	467	8 (1.7)	27 (5.8)	5 (1.1)	7 (1.5)
平成22年度	第1期	129 (27.6)	328 (70.2)	10 (2.1)	467	14 (3.0)	25 (5.4)	1 (0.2)	7 (1.5)
	第2期	127 (27.4)	326 (70.4)	10 (2.2)	463	14 (3.0)	26 (5.6)	1 (0.2)	8 (1.7)
	第3期	123 (26.5)	331 (71.3)	10 (2.2)	464	12 (2.6)	23 (5.0)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第4期	116 (25.5)	328 (72.1)	11 (2.4)	455	12 (2.6)	21 (4.6)	2 (0.4)	7 (1.5)
平成23年度	第1期	124 (26.6)	325 (69.7)	17 (3.6)	466	14 (3.0)	18 (3.9)	2 (0.4)	4 (0.9)
	第2期	125 (26.6)	329 (70.0)	16 (3.4)	470	14 (3.0)	18 (3.8)	4 (0.9)	3 (0.6)
	第3期	124 (26.4)	328 (69.9)	17 (3.6)	469	17 (3.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	4 (0.9)
	第4期	124 (26.4)	329 (70.1)	16 (3.4)	469	16 (3.4)	18 (3.8)	4 (0.9)	6 (1.3)
平成24年度	第1期	110 (23.5)	347 (74.1)	11 (2.4)	468	12 (2.6)	17 (3.6)	4 (0.9)	9 (1.9)
	第2期	111 (23.6)	347 (73.8)	12 (2.6)	470	11 (2.3)	17 (3.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
	第3期	106 (22.4)	352 (74.4)	15 (3.2)	473	14 (3.0)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
	第4期	103 (21.8)	356 (75.3)	14 (3.0)	473	13 (2.7)	18 (3.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成25年度	第1期	103 (21.6)	364 (76.5)	9 (1.9)	476	8 (1.7)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
	第2期	101 (21.2)	365 (76.5)	11 (2.3)	477	10 (2.1)	16 (3.4)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第3期	104 (21.8)	364 (76.2)	10 (2.1)	478	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.3)
	第4期	104 (22.0)	359 (75.9)	10 (2.1)	473	7 (1.5)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)

（ ）：抗HIV薬投与ありにしめる％

表4-6-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

		副作用 (項目別)							
		血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成19年度	第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
	第2期	3 (0.7)	6 (1.3)	14 (3.1)	9 (2.0)	18 (4.0)	36 (7.9)	27 (5.9)	20 (4.4)
	第3期	1 (0.2)	6 (1.3)	11 (2.4)	8 (1.7)	17 (3.7)	37 (8.1)	26 (5.7)	17 (3.7)
	第4期	1 (0.2)	5 (1.1)	11 (2.4)	6 (1.3)	15 (3.2)	37 (8.0)	27 (5.8)	17 (3.7)
平成20年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	8 (1.7)	20 (4.3)	43 (9.3)	28 (6.0)	30 (6.5)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	19 (4.1)	42 (9.1)	27 (5.9)	32 (7.0)
	第3期	3 (0.6)	6 (1.3)	7 (1.5)	10 (2.2)	19 (4.1)	43 (9.3)	29 (6.3)	28 (6.0)
	第4期	3 (0.7)	7 (1.5)	5 (1.1)	11 (2.4)	18 (3.9)	42 (9.2)	25 (5.5)	26 (5.7)
平成21年度	第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.6)	27 (5.8)	25 (5.4)
	第2期	1 (0.2)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	12 (2.6)	39 (8.4)	26 (5.6)	22 (4.7)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	9 (1.9)	11 (2.4)	10 (2.1)	39 (8.4)	27 (5.8)	26 (5.6)
	第4期	1 (0.2)	7 (1.5)	8 (1.7)	13 (2.8)	11 (2.4)	38 (8.1)	24 (5.1)	22 (4.7)
平成22年度	第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.5)	28 (6.0)	20 (4.3)
	第2期	1 (0.2)	4 (0.9)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	49 (10.6)	28 (6.0)	16 (3.5)
	第3期	1 (0.2)	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	13 (2.8)	48 (10.3)	27 (5.8)	17 (3.7)
	第4期	2 (0.4)	5 (1.1)	6 (1.3)	9 (2.0)	11 (2.4)	47 (10.3)	26 (5.7)	13 (2.9)
平成23年度	第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.7)	24 (5.2)	18 (3.9)
	第2期	2 (0.4)	10 (2.1)	7 (1.5)	11 (2.3)	19 (4.0)	45 (9.6)	24 (5.1)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	10 (2.1)	8 (1.7)	9 (1.9)	23 (4.9)	46 (9.8)	24 (5.1)	22 (4.7)
	第4期	3 (0.6)	10 (2.1)	11 (2.3)	9 (1.9)	21 (4.5)	45 (9.6)	24 (5.1)	18 (3.8)
平成24年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.3)	15 (3.2)	20 (4.3)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.3)	13 (2.8)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.2)	11 (2.3)	19 (4.0)
	第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.3)	5 (1.1)	11 (2.3)	40 (8.5)	11 (2.3)	17 (3.6)
平成25年度	第1期	2 (0.4)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	43 (9.0)	17 (3.6)	17 (3.6)
	第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	42 (8.8)	16 (3.4)	17 (3.6)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	5 (1.0)	7 (1.5)	11 (2.3)	42 (8.8)	16 (3.3)	22 (4.6)
	第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.1)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.9)	14 (3.0)	18 (3.8)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本節では、以下の表を示した。

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更（延べ数、平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度																
前の時点	→ その時点	第1期		第2期		第3期		第4期		第1期		第2期		第3期		第4期		第1期																
		第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期														
投与なし(投与歴なし)	→投与なし(投与歴なし)	-	105	110	107	102	94	94	83	81	87	84	80	81	87	86	82	67	59	60	59	62	61	61	66	64	62	58	59	60	59			
	→NRTI 2剤	-	3	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	2	3	2	5	3	1	0	1	2	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
	→INSTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投与なし(投与歴あり)	→投与なし(投与歴あり)	-	11	11	13	18	23	25	26	22	24	24	24	22	30	30	26	16	23	29	28	40	42	46	41	41	47	48	44	42	42	45	39	
	→NRTI 2剤	-	3	2	6	2	1	0	1	5	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	1	0	0	3	3	3	6	8	1	1	4	3	0	4	1	8	1	0	2	5	3	1	5	3	1	2	3	1	3	3	7	
	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	2	1	4	1	3	2	3	1	0	0	2		
	→INSTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NRTI 1剤	→NRTI 1剤	-	30	26	22	17	15	12	11	11	12	11	10	6	9	8	7	7	7	6	3	3	4	4	4	3	4	4	2	2	1	1	2	
	→NRTI 2剤	-	15	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)	-	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	→NRTI 2剤	-	176	167	154	137	130	116	106	93	98	96	87	79	81	76	71	64	66	61	60	58	60	58	54	54	47	45	45	42	42	39	37	
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	28	26	17	20	13	13	9	7	2	2	2	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	1	2	3	2	0	1	0	1
NRTI 2剤	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	3	1	0	0	0	1	3	1	2	3	3	1	0	2	1	4	3	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	
	→投与なし(投与歴あり)	-	1	7	4	7	1	3	2	1	2	1	4	3	1	2	2	2	1	0	1	1	0	2	4	0	1	2	0	1	0	1	0	
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	85	121	149	158	192	208	216	223	239	232	228	211	210	207	198	192	201	193	172	164	184	181	167	160	180	187	182	167	171	172		
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	67	95	136	123	169	192	198	204	226	223	213	196	198	197	191	175	196	182	164	145	175	171	163	132	161	174	175	136	160	166	162	
	内訳(変更薬剤なし)	-	9	14	7	19	12	9	9	14	5	7	12	10	9	8	6	14	4	5	7	14	6	6	2	4	1	3	6	17	9	8	6	
AIDS発病・死亡	→変更薬剤 1剤	-	9	12	6	16	11	7	9	5	8	2	3	5	3	2	1	3	1	6	1	5	3	4	2	5	2	1	6	11	10	5	1	
	→変更薬剤 2剤以上	-	0	1	2	0	0	0	2	1	1	2	2	11	3	3	2	4	7	7	2	6	3	1	4	3	3	0	2	2	0	6	3	2
	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→INSTI	-	1	1	3	1	2	5	5	1	2	3	1	2	6	1	5	1	3	1	5	5	2	4	3	2	3	2	0	1	4	2	3	4
	→投与なし(投与歴あり)	-	0	0	2	1	0	0	0	0	4	3	7	8	25	31	37	41	48	56	64	58	64	62	64	65	83	82	79	75	82	84	88	
その他	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	0	1	3	3	0	1	0	2	0	2	1	1	3	1	0	2	1	0	0	5	2	1	0	2	1	0	0	7	2	1	0	0
	→INSTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	1	4	5	1	0	1	0	1	2	1	1	1	
	→INSTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
不明	→NRTI 2剤+PI 1・2剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→NRTI 2剤+NNRTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→INSTI	-	46	41	36	36	29	26	30	27	27	38	38	41	43	41	41	45	42	41	41	41	43	44	41	41	43	38	37	46	50	46	40	
	AIDS発病・死亡	-	9	11	16	19	20	25	29	31	32	34	36	43	47	53	53	56	60	61	62	63	65	70	76	78	81	85	90	90	102	106	109	114
計	不明	-	64	43	32	45	52	46	53	64	47	44	50	58	32	33	51	68	55	55	76	74	36	35	44	62	49	32	34	34	10	12	19	28
	計	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581

表4-7-1 (続き). 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更 前の時点 → その時点	平成18年度				平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				計
	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	
投与なし(投与歴なし) →投与なし(投与歴なし) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	53	53	50	47	44	44	44	41	39	41	39	38	37	39	39	37	35	34	32	32	28	27	26	24	22	22	21	19	17	16	15	15	3669
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	44	
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	
	38	40	42	37	32	35	34	30	23	26	28	24	20	22	19	18	16	20	20	19	13	15	14	13	10	10	9	9	9	9	7	8	1756
投与なし(投与歴あり) →投与なし(投与歴あり) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	6	2	0	0	3	0	2	5	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	138	
	0	3	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0	21	
	1	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
NRTI 2剤 →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	31	32	31	31	25	25	23	22	23	23	22	21	20	17	17	16	13	15	13	13	11	12	12	12	10	10	10	10	8	7	7	6	3243
	1	1	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	41	
	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 内訳(変更薬剤なし) 変更薬剤 1剤 変更薬剤 2剤以上 →NRTI 2剤+NNRTI →INSTI →投与なし(投与歴あり)	164	175	180	187	183	200	194	197	193	198	189	184	168	170	163	157	148	149	142	129	125	136	130	127	117	111	103	99	91	91	89	87	11140
	148	166	163	178	157	186	186	185	168	193	184	181	151	164	162	155	138	148	142	128	117	131	129	127	111	108	101	99	86	91	89	87	10132
	9	5	6	7	19	7	4	5	19	4	1	1	14	4	1	1	5	1	0	1	6	4	1	0	3	0	2	0	4	0	0	426	
	7	4	11	2	7	7	4	7	6	1	4	2	3	2	0	1	5	0	0	0	2	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	266
	0	1	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	106	
NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →INSTI →投与なし(投与歴あり)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	2	8	8	7	4	3	4	7	8	3	1	3	2	6	5	8	3	7	4	1	2	112
	3	1	0	1	2	1	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113
	85	81	85	85	81	88	87	84	81	80	78	76	76	79	78	77	73	77	75	73	67	70	68	64	61	65	64	66	64	65	65	61	3906
	1	2	1	2	2	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	67	
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	2	3	0	3	2	3	1	2	0	2	2	1	0	2	0	2	1	0	1	35
その他 AIDS 発病・死亡 不明 計	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38	
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	24	27	37	49	62	63	72	76	88	97	110	113	118	124	135	142	151	148	159	167	170	2148
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2627	451	445	438	0.000	1517	357	351	345	0.990
→NRTI 2 剤	14	371	422	462	0.026	8	371	340	484	0.039
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	37	272	334	393	0.000	23	193	214	278	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	20	191	194	243	0.068
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1307	351	345	340	0.000	1021	317	313	311	0.200
→NRTI 2 剤	30	317	330	339	0.363	21	313	318	334	0.308
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	120	227	286	294	0.000	99	205	235	271	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	38	212	201	193	0.273	32	181	156	182	0.127
→INSTI	16	281	308	322	0.065	15	265	288	307	0.107
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2739	391	392	391	0.253	1811	338	343	340	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	152	266	297	315	0.000	113	240	274	288	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	213	225	236	0.590	32	211	225	227	0.632
→投与なし(投与歴あり)	60	377	346	312	0.015	42	319	293	286	0.257
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9481	411	415	418	0.000	5894	317	326	330	0.000
内訳 変更薬剤なし	8862	416	420	423	0.000	5452	321	330	334	0.000
変更薬剤 1 剤	377	358	365	385	0.067	262	292	297	311	0.000
変更薬剤 2 剤以上	242	282	277	279	0.017	180	228	231	234	0.006
→NRTI 2 剤+NNRTI	91	394	406	398	0.989	60	338	323	344	0.270
→INSTI	99	397	423	424	0.888	61	299	304	291	0.053
→投与なし(投与歴あり)	84	419	328	313	0.000	49	288	231	233	0.006
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3285	405	409	411	0.031	2149	324	332	335	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	59	310	300	309	0.652	44	234	246	276	0.004
→INSTI	31	313	330	348	0.335	21	217	243	239	0.448
→投与なし(投与歴あり)	27	279	209	203	0.004	22	261	180	184	0.038
INSTI										
→INSTI	1771	378	380	383	0.000	1221	295	299	304	0.000

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1648	408	401	393	0.000	1322	470	460	454	0.000
→NRTI 2 剤	10	375	430	499	0.064	13	374	485	476	0.011
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	244	293	343	0.000	24	333	426	465	0.001
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	6	244	299	269	0.219
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	977	338	327	326	0.000	368	350	339	340	0.004
→NRTI 2 剤	14	300	330	322	0.542	25	313	318	317	0.538
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	205	235	275	0.000	43	292	331	345	0.016
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	199	166	187	0.187	6	142	220	194	0.438
→INSTI	15	265	288	307	0.107	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1116	355	352	351	0.222	1687	379	380	380	0.841
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	107	255	290	316	0.000	127	260	301	309	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	212	225	219	0.695	26	211	220	213	0.610
→投与なし(投与歴あり)	35	363	339	285	0.009	42	356	353	308	0.257
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1867	270	282	285	0.015	3318	358	368	376	0.000
内訳 変更薬剤なし	1636	280	288	291	0.258	3048	367	378	383	0.000
変更薬剤 1 剤	111	258	277	297	0.002	165	290	300	324	0.001
変更薬剤 2 剤以上	120	188	208	224	0.008	105	191	200	224	0.042
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	225	296	324	0.124	44	388	375	391	0.810
→INSTI	11	86	140	197	0.019	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	37	333	288	285	0.043	39	389	355	324	0.034
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	253	284	284	283	0.991	301	339	342	329	0.246
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	171	215	261	0.019	19	252	243	243	0.424
→INSTI	5	159	172	196	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	366	276	277	0.875	6	256	212	229	0.313
INSTI										
→INSTI	57	228	252	255	0.001	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-2(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	776	423	411	405	0.000	529	440	438	431	0.001
→NRTI 2 剤	1	217	101	163	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	193	202	259	0.152	4	263	414	416	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	8	199	233	272	0.078	6	169	126	234	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	594	327	315	310	0.000	345	394	388	381	0.210
→NRTI 2 剤	4	366	302	440	0.875	1	300	432	346	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	56	199	253	286	0.000	21	212	217	212	0.096
→NRTI 2 剤+NNRTI	27	209	164	187	0.179	5	361	338	418	0.625
→INSTI	0	—	—	—	—	16	281	308	322	0.065
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	741	405	401	399	0.126	311	437	440	437	0.119
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	16	259	234	384	0.117	9	303	306	413	0.910
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	289	259	240	0.846	1	505	589	609	—
→投与なし(投与歴あり)	14	513	422	377	0.007	4	364	307	277	0.625
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2936	431	431	430	0.327	3227	450	452	457	0.011
内訳 変更薬剤なし	2725	436	438	435	0.389	3089	451	453	459	0.012
変更薬剤 1 剤	123	414	410	415	0.680	89	412	396	418	0.943
変更薬剤 2 剤以上	88	316	327	308	0.227	49	471	458	459	0.429
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	483	516	463	0.819	13	289	278	310	0.376
→INSTI	0	—	—	—	—	99	397	423	424	0.888
→投与なし(投与歴あり)	37	488	325	326	0.000	8	241	234	210	0.023
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1339	392	396	400	0.131	1645	431	431	432	0.239
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	316	295	355	0.512	11	423	432	394	0.577
→INSTI	0	—	—	—	—	31	313	330	348	0.335
→投与なし(投与歴あり)	19	268	194	165	0.045	2	581	552	372	0.500
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	1771	378	380	383	0.000

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2441	1800	1900	1800	0.000	1473	4000	4200	4000	0.000
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	7	69000	28000	1500	0.016
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	35	8800	450	200	0.000	23	20000	590	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	22	41700	600	160	0.004
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1278	3400	3700	3100	0.000	1017	4800	6200	4600	0.001
→NRTI 2 剤	22	735	910	430	0.760	20	520	735	325	0.669
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	115	20000	430	200	0.000	99	27000	500	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	18000	390	79	0.000	32	17500	400	108	0.000
→INSTI	17	9200	44	0	0.000	16	12600	67	0	0.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2434	200	200	200	0.385	1744	320	400	371	0.390
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	119	3700	200	200	0.000	101	5300	450	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	2900	200	200	0.000	34	5750	200	200	0.001
→投与なし(投与歴あり)	55	1500	2500	2600	0.009	40	1650	3600	3281	0.009
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9016	70	53	50	0.007	5762	200	150	110	0.040
内訳 変更薬剤なし	8434	60	50	50	0.199	5328	165	120	95	0.561
変更薬剤 1 剤	363	200	200	200	0.267	262	200	200	200	0.245
変更薬剤 2 剤以上	219	690	200	200	0.000	172	1400	200	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	88	200	200	200	0.016	58	200	200	200	0.032
→INSTI	99	0	0	0	0.000	61	0	0	0	0.003
→投与なし(投与歴あり)	77	200	7000	3500	0.005	48	795	14500	9000	0.038
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3244	25	25	25	0.000	2122	25	25	25	0.002
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	57	180	160	100	0.129	43	200	300	200	0.041
→INSTI	30	0	0	0	0.478	21	0	0	0	0.508
→投与なし(投与歴あり)	23	25	9200	8800	0.000	19	61	9200	8880	0.000
INSTI										
→INSTI	1772	0	0	0	0.015	1224	0	0	0	0.007

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1589	5800	6000	5800	0.000	1193	2400	2500	2400	0.010
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	8	26300	4600	1050	0.008
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	13200	520	200	0.000	22	18500	415	200	0.010
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	7	14000	200	200	0.016
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	964	9200	11000	8300	0.006	338	2800	3150	2950	0.005
→NRTI 2 剤	13	3000	5500	1600	0.486	17	1200	920	440	0.492
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	31000	1600	200	0.000	39	18000	1800	200	0.002
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	24000	390	79	0.000	5	28000	210	200	0.313
→INSTI	15	16000	44	0	0.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1078	2200	2300	1900	0.162	1466	425	440	400	0.705
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	7000	530	200	0.000	95	5200	420	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	6950	200	200	0.000	29	7300	200	200	0.003
→投与なし(投与歴あり)	35	3000	6900	5700	0.042	37	1700	2700	3162	0.074
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1774	3100	2400	2200	0.000	2967	200	200	200	0.486
内訳 変更薬剤なし	1551	2800	2400	2100	0.011	2722	200	200	200	0.368
変更薬剤 1 剤	108	4800	2645	2400	0.066	155	200	200	200	0.414
変更薬剤 2 剤以上	115	10000	1100	1900	0.000	90	8700	1650	2050	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	10000	200	200	0.020	41	200	200	200	0.395
→INSTI	11	15553	49	50	0.001	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	36	13500	27500	25000	0.345	35	1580	13000	3100	0.435
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	251	1400	960	710	0.000	293	200	200	200	0.975
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	4600	1400	480	0.001	17	3200	1400	1400	0.140
→INSTI	5	3600	79	0	0.188	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	5600	14100	18000	0.250	4	200	1850	2200	0.500
INSTI										
→INSTI	57	4400	60	60	0.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-3(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	722	1950	2050	1800	0.002	526	485	530	495	0.001
→NRTI 2 剤	1	170000	190000	520	1.000	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	6600	1900	25	0.004	4	6300	135	10	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	8	60500	735	47	0.008	7	43400	4500	284	0.938
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	582	6950	8300	5750	0.047	358	975	1000	857	0.070
→NRTI 2 剤	4	155	68	425	0.375	1	20	0	0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	55	19000	400	83	0.000	21	31000	200	25	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	18000	295	25	0.000	4	6013	44710	50	0.375
→INSTI	0	—	—	—	—	17	9200	44	0	0.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	668	200	132	110	0.890	300	25	25	25	0.042
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	16	2150	535	63	0.003	8	117	23	23	0.063
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	1300	25	25	0.195	1	0	0	0	—
→投与なし(投与歴あり)	14	636	1130	1960	0.129	4	367	198	301	0.625
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2852	25	25	25	0.342	3197	20	20	20	0.000
内訳 変更薬剤なし	2651	25	25	25	0.756	3061	20	20	10	0.000
変更薬剤 1 剤	118	25	25	25	0.521	90	25	25	20	0.529
変更薬剤 2 剤以上	83	110	25	25	0.024	46	25	25	25	0.873
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	200	54	25	0.050	13	25	25	25	0.313
→INSTI	0	—	—	—	—	99	0	0	0	0.000
→投与なし(投与歴あり)	33	75	6300	3500	0.004	9	25	6670	4000	0.148
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1343	25	25	25	0.151	1608	10	0	0	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	25	25	25	0.519	11	25	25	25	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	30	0	0	0	0.478
→投与なし(投与歴あり)	17	25	20400	13000	0.000	2	25	25	245120	0.500
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	1772	0	0	0	0.015

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	12	—	91.7	91.7	—	7	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	39	—	84.6	87.2	—	23	—	87.0	91.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	23	—	100.0	82.6	—	20	—	100.0	80.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	28	—	78.6	78.6	—	16	—	87.5	87.5	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	120	—	85.8	83.3	—	92	—	83.7	80.4	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	38	—	89.5	92.1	—	29	—	86.2	89.7	—
→INSTI	20	—	75.0	85.0	—	16	—	68.8	81.3	—
NRTI 2 剤	2850	84.6	84.5	85.0	0.430	1778	83.9	83.8	84.8	0.189
→NRTI 2 剤	150	84.0	86.7	85.3	0.703	104	84.6	86.5	83.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	34	82.4	97.1	94.1	0.125	29	79.3	96.6	93.1	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	66	65.2	—	—	—	46	67.4	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10170	90.1	90.0	89.8	0.215	5928	87.8	88.0	87.6	0.592
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9534	90.6	90.4	90.1	0.025	5504	88.4	88.4	87.9	0.147
内訳 変更薬剤なし	393	85.8	87.0	88.5	0.054	256	84.0	86.3	87.5	0.047
変更薬剤 1 剤	243	75.7	80.2	79.8	0.086	168	72.6	78.0	77.4	0.133
変更薬剤 2 剤以上	89	82.0	88.8	87.6	0.227	57	75.4	82.5	80.7	0.508
→NRTI 2 剤+NNRTI	107	92.5	97.2	97.2	0.125	62	93.5	96.8	98.4	0.250
→INSTI	102	71.6	—	—	—	62	62.9	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	3654	97.5	97.3	96.8	0.013	2223	97.0	96.8	96.3	0.049
→NRTI 2 剤+NNRTI	56	89.3	87.5	91.1	1.000	40	87.5	90.0	95.0	0.375
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	34	91.2	85.3	85.3	0.500	21	85.7	81.0	81.0	1.000
→INSTI	34	79.4	—	—	—	25	76.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	1948	95.9	96.3	96.3	0.350	1297	94.8	95.1	95.1	0.462
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	9	—	100.0	100.0	—	11	—	90.9	90.9	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	31	—	80.6	87.1	—	22	—	77.3	86.4	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	—	100.0	80.0	—	6	—	100.0	83.3	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	11	—	81.8	90.9	—	22	—	77.3	77.3	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	89	—	83.1	79.8	—	38	—	78.9	76.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	—	85.7	89.3	—	6	—	83.3	83.3	—
→INSTI	15	—	66.7	80.0	—	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤	1106	81.7	81.1	81.7	1.000	1621	82.6	82.4	83.2	0.447
→NRTI 2 剤	101	83.2	88.1	84.2	1.000	122	82.0	85.2	86.1	0.308
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	27	77.8	96.3	92.6	0.125	23	73.9	95.7	91.3	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	62.2	—	—	—	41	61.0	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1778	70.5	71.4	70.9	0.611	3094	86.2	86.3	86.4	0.813
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1566	71.0	71.0	70.7	0.732	2843	87.2	86.8	86.8	0.525
内訳 変更薬剤なし	105	69.5	76.2	76.2	0.065	157	81.5	86.6	88.5	0.007
変更薬剤 1 剤	107	63.6	72.0	69.2	0.228	94	66.0	70.2	69.1	0.544
変更薬剤 2 剤以上	21	52.4	61.9	57.1	1.000	41	80.5	87.8	85.4	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	11	63.6	100.0	90.9	0.375	0	—	—	—	—
→INSTI	44	52.3	—	—	—	41	70.7	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	251	86.9	87.3	85.7	0.559	261	94.3	93.1	92.7	0.454
→NRTI 2 剤+NNRTI	19	84.2	78.9	89.5	1.000	14	85.7	78.6	85.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	5	80.0	80.0	80.0	1.000	0	—	—	—	—
→INSTI	7	42.9	—	—	—	6	100.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	58	77.6	82.8	86.2	0.180	0	—	—	—	—
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-4(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	1	—	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤	11	—	90.9	90.9	—	6	—	100.0	83.3	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9	—	100.0	100.0	—	8	—	100.0	62.5	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	—	80.0	80.0	—	1	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤	60	—	91.7	90.0	—	22	—	81.8	77.3	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	27	—	88.9	92.6	—	5	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	20	—	75.0	85.0	—
→INSTI										
NRTI 2剤	831	86.6	86.9	87.0	0.709	398	88.2	88.4	88.2	1.000
→NRTI 2剤	18	88.9	88.9	72.2	0.250	10	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9	100.0	100.0	100.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	17	64.7	—	—	—	8	87.5	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2剤+PI 1・2剤	3171	89.2	88.9	88.4	0.048	3905	93.9	93.9	93.6	0.447
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	2951	89.3	88.9	88.4	0.035	3740	94.3	94.3	93.9	0.170
内訳 変更薬剤なし	129	92.2	90.7	90.7	0.625	107	84.1	83.2	86.0	0.791
変更薬剤 1剤	91	80.2	86.8	83.5	0.375	58	84.5	86.2	91.4	0.219
変更薬剤 2剤以上	31	83.9	90.3	93.5	0.375	17	82.4	88.2	82.4	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	107	92.5	97.2	97.2	0.125
→INSTI	46	78.3	—	—	—	15	53.3	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2剤+NNRTI	1439	95.7	95.5	95.1	0.220	1954	99.2	99.2	98.7	0.024
→NRTI 2剤+NNRTI	30	86.7	86.7	90.0	1.000	12	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	—	—	—	—	34	91.2	85.3	85.3	0.500
→INSTI	23	78.3	—	—	—	5	60.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
INSTI	0	—	—	—	—	1948	95.9	96.3	96.3	0.350
→INSTI										

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	15	—	20.0	33.3	—	8	—	12.5	37.5	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	41	—	48.8	51.2	—	24	—	50.0	54.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	—	36.0	36.0	—	22	—	40.9	36.4	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	32	—	12.5	18.8	—	19	—	10.5	26.3	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	126	—	41.3	42.9	—	95	—	44.2	44.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	—	47.5	42.5	—	30	—	53.3	43.3	—
→INSTI	21	—	19.0	14.3	—	17	—	23.5	17.6	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	3122	9.7	9.8	11.9	0.000	1957	9.7	10.5	13.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	169	17.2	45.6	36.1	0.000	118	16.9	45.8	39.8	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	22.5	52.5	50.0	0.007	35	20.0	51.4	48.6	0.013
→投与なし(投与歴あり)	70	12.9	—	—	—	49	16.3	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10808	34.7	34.4	34.7	0.925	6343	35.0	34.4	35.1	0.881
内訳 変更薬剤なし	10128	34.1	33.8	34.2	0.901	5884	34.4	33.6	34.6	0.727
変更薬剤 1 剤	419	43.2	43.9	43.0	0.924	275	45.5	45.8	44.7	0.818
変更薬剤 2 剤以上	261	42.5	42.9	39.5	0.356	184	40.8	41.8	38.6	0.577
→NRTI 2 剤+NNRTI	104	43.3	46.2	41.3	0.722	66	39.4	47.0	37.9	0.833
→INSTI	109	48.6	42.2	33.9	0.002	64	54.7	48.4	40.6	0.049
→投与なし(投与歴あり)	113	47.8	—	—	—	68	48.5	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	3778	34.1	33.8	34.0	0.929	2304	34.5	34.2	34.3	0.873
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	66	45.5	53.0	54.5	0.263	46	43.5	56.5	60.9	0.077
→INSTI	34	41.2	41.2	29.4	0.219	21	42.9	42.9	33.3	0.625
→投与なし(投与歴あり)	36	52.8	—	—	—	27	48.1	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	1967	27.5	26.2	25.7	0.006	1311	30.1	28.8	28.0	0.005

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	10	—	10.0	30.0	—	14	—	21.4	28.6	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	—	50.0	50.0	—	24	—	33.3	37.5	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	—	40.9	36.4	—	7	—	28.6	28.6	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	13	—	15.4	30.8	—	26	—	15.4	23.1	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	91	—	42.9	41.8	—	43	—	41.9	41.9	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	—	55.2	44.8	—	7	—	28.6	28.6	—
→INSTI	16	—	25.0	18.8	—	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1207	10.5	11.4	15.1	0.000	1836	10.5	10.2	12.3	0.020
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	112	16.1	42.9	37.5	0.000	140	15.7	42.9	33.6	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	25.0	53.1	53.1	0.022	29	27.6	58.6	51.7	0.065
→投与なし(投与歴あり)	39	15.4	—	—	—	45	8.9	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1968	34.8	34.9	35.8	0.328	3515	34.1	33.5	33.7	0.566
内訳 変更薬剤なし	1729	33.6	33.0	34.6	0.339	3232	33.5	32.8	33.1	0.572
変更薬剤 1 剤	117	52.1	54.7	51.3	0.865	176	43.8	46.0	44.9	0.762
変更薬剤 2 剤以上	122	35.2	42.6	37.7	0.586	107	34.6	35.5	31.8	0.574
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	42.9	42.9	39.3	1.000	48	35.4	35.4	31.3	0.804
→INSTI	11	45.5	45.5	36.4	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	50	50.0	—	—	—	49	49.0	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	279	37.3	35.1	34.8	0.341	313	36.7	35.5	36.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	43.5	56.5	65.2	0.180	21	47.6	47.6	57.1	0.688
→INSTI	5	20.0	60.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	7	28.6	—	—	—	7	28.6	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	58	19.0	20.7	15.5	0.727	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-5(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
	対象者数 (延べ数)	副作用(ありの者の割合: %)			p値	対象者数 (延べ数)	副作用(ありの者の割合: %)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	1	—	0.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤	11	—	72.7	72.7	—	6	—	66.7	66.7	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	10	—	60.0	30.0	—	8	—	12.5	50.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	—	0.0	0.0	—	1	—	0.0	0.0	—
→NRTI 2剤	60	—	41.7	50.0	—	23	—	39.1	26.1	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	28	—	50.0	39.3	—	5	—	60.0	80.0	—
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	21	—	19.0	14.3	—
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2剤	878	9.9	10.5	12.9	0.002	408	5.6	6.1	7.8	0.083
→NRTI 2剤	19	21.1	68.4	57.9	0.016	10	30.0	40.0	30.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9	11.1	44.4	55.6	0.125	2	0.0	0.0	0.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	17	17.6	—	—	—	8	25.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2剤+PI 1・2剤	3337	38.9	39.1	39.0	0.866	3956	31.7	31.2	31.9	0.766
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	3105	37.8	38.1	38.0	0.754	3791	31.7	31.2	32.0	0.593
内訳 変更薬剤なし	136	50.7	50.0	51.5	0.869	107	32.7	32.7	29.0	0.488
変更薬剤 1剤	96	57.3	57.3	53.1	0.460	58	32.8	32.8	31.0	1.000
変更薬剤 2剤以上	39	59.0	61.5	56.4	1.000	17	29.4	41.2	35.3	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	109	48.6	42.2	33.9	0.002
→INSTI	49	49.0	—	—	—	15	40.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2剤+NNRTI	1496	39.8	39.7	40.0	0.852	1969	29.3	29.0	29.1	0.703
→NRTI 2剤+NNRTI	33	51.5	60.6	60.6	0.549	12	25.0	41.7	33.3	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	—	—	—	—	34	41.2	41.2	29.4	0.219
→INSTI	24	62.5	—	—	—	5	40.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	0	—	—	—	—	1967	27.5	26.2	25.7	0.006
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3403	80.5	80.0	79.3	0.025	1693	77.1	76.2	74.5	0.002
→NRTI 2 剤	12	58.3	58.3	58.3	1.000	6	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	42	73.8	66.7	69.0	0.688	23	69.6	56.5	56.5	0.250
→NRTI 2 剤+NNRTI	21	66.7	61.9	71.4	1.000	18	66.7	66.7	77.8	0.625
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1590	69.8	69.2	68.5	0.169	1113	67.1	66.8	65.9	0.295
→NRTI 2 剤	32	71.9	65.6	68.8	1.000	19	78.9	73.7	73.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	122	54.1	54.1	54.1	1.000	92	54.3	52.2	55.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	55.0	55.0	50.0	0.625	30	63.3	63.3	56.7	0.625
→INSTI	17	76.5	58.8	76.5	1.000	13	69.2	46.2	69.2	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	3040	69.6	68.3	66.8	0.000	1919	69.7	68.2	67.2	0.006
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	165	72.7	67.9	66.7	0.115	118	74.6	71.2	68.6	0.183
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	56.4	56.4	61.5	0.625	33	54.5	54.5	60.6	0.625
→投与なし(投与歴あり)	66	69.7	68.2	65.2	0.549	46	73.9	67.4	65.2	0.344
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10353	65.2	65.0	64.5	0.069	6084	64.1	64.2	63.4	0.153
内訳 変更薬剤なし	9711	65.2	65.0	64.6	0.122	5652	64.0	64.1	63.4	0.251
変更薬剤 1 剤	393	64.4	64.9	63.4	0.731	256	64.8	65.6	64.1	0.772
変更薬剤 2 剤以上	249	66.3	65.1	63.1	0.302	176	67.6	65.3	63.1	0.161
→NRTI 2 剤+NNRTI	93	69.9	74.2	76.3	0.180	58	74.1	82.8	77.6	0.688
→INSTI	104	66.3	66.3	66.3	1.000	61	60.7	62.3	60.7	1.000
→投与なし(投与歴あり)	102	50.0	49.0	52.0	0.804	64	51.6	46.9	48.4	0.727
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3617	67.5	67.5	67.4	0.817	2206	68.4	68.6	67.7	0.392
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	62	64.5	67.7	69.4	0.508	45	60.0	62.2	62.2	1.000
→INSTI	31	67.7	61.3	64.5	1.000	18	55.6	55.6	61.1	1.000
→投与なし(投与歴あり)	29	55.2	34.5	48.3	0.688	22	63.6	36.4	54.5	0.688
INSTI										
→INSTI	1873	66.8	66.4	66.0	0.311	1251	62.4	62.0	62.1	0.765

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1821	76.5	76.6	75.0	0.054	1502	81.8	81.3	80.5	0.103
→NRTI 2 剤	8	62.5	62.5	62.5	1.000	11	54.5	54.5	54.5	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	78.1	65.6	65.6	0.125	27	70.4	70.4	70.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	18	66.7	66.7	77.8	0.625	6	50.0	16.7	66.7	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1048	67.2	66.5	65.4	0.140	379	66.8	65.4	64.4	0.211
→NRTI 2 剤	13	76.9	76.9	69.2	1.000	26	73.1	65.4	69.2	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	88	54.5	53.4	55.7	1.000	42	50.0	47.6	50.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	58.6	58.6	51.7	0.625	7	57.1	42.9	42.9	1.000
→INSTI	12	66.7	41.7	66.7	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1210	72.3	70.2	68.4	0.001	1811	77.9	76.0	74.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	111	75.7	72.1	70.3	0.247	138	73.2	67.4	68.1	0.214
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	58.1	61.3	61.3	1.000	27	59.3	59.3	63.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	36	58.3	55.6	52.8	0.688	42	69.0	71.4	69.0	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1924	70.8	70.8	69.2	0.069	3427	70.6	70.3	69.8	0.242
内訳 変更薬剤なし	1697	71.6	71.5	69.9	0.066	3160	70.8	70.4	70.1	0.322
変更薬剤 1 剤	106	61.3	61.3	60.4	1.000	163	64.4	67.5	64.4	1.000
変更薬剤 2 剤以上	121	68.6	68.6	67.8	0.840	104	73.1	73.1	69.2	0.424
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	76.0	84.0	88.0	0.250	47	72.3	72.3	70.2	1.000
→INSTI	11	63.6	63.6	63.6	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	45	44.4	48.9	46.7	1.000	46	43.5	47.8	47.8	0.688
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	280	61.8	62.9	62.5	0.756	311	65.0	65.6	65.9	0.690
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	69.6	69.6	73.9	1.000	21	71.4	81.0	81.0	0.500
→INSTI	5	80.0	80.0	80.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	6	66.7	50.0	50.0	1.000	6	50.0	16.7	66.7	1.000
INSTI										
→INSTI	52	65.4	71.2	69.2	0.688	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-6(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1105	78.6	78.1	77.4	0.219	796	80.5	80.3	79.5	0.362
→NRTI 2剤	1	100.0	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	11	81.8	63.6	63.6	0.500	4	75.0	50.0	75.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	10	60.0	80.0	80.0	0.500	5	100.0	80.0	60.0	0.500
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	746	67.6	66.6	66.4	0.408	465	75.9	76.3	75.3	0.713
→NRTI 2剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	55	56.4	56.4	60.0	0.774	25	56.0	60.0	48.0	0.625
→NRTI 2剤+NNRTI	28	64.3	67.9	60.7	1.000	5	0.0	0.0	0.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	17	76.5	58.8	76.5	1.000
NRTI 2剤										
→NRTI 2剤	851	62.9	62.2	61.1	0.244	378	45.0	45.2	44.2	0.732
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	18	72.2	66.7	61.1	0.688	9	66.7	77.8	55.6	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	10	40.0	40.0	50.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	68.8	62.5	56.3	0.500	8	75.0	62.5	62.5	1.000
NRTI 2剤+PI 1・2剤										
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	3190	64.3	64.4	63.8	0.461	3736	61.0	60.8	60.2	0.222
内訳 変更薬剤なし	2973	64.7	64.8	64.1	0.464	3578	60.6	60.5	60.1	0.387
変更薬剤 1剤	128	60.2	61.7	60.2	1.000	102	69.6	64.7	65.7	0.503
変更薬剤 2剤以上	89	58.4	53.9	58.4	1.000	56	66.1	67.9	58.9	0.289
→NRTI 2剤+NNRTI	33	63.6	75.8	81.8	0.070	13	76.9	76.9	84.6	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	104	66.3	66.3	66.3	1.000
→投与なし(投与歴あり)	42	54.8	52.4	57.1	1.000	14	57.1	42.9	50.0	1.000
NRTI 2剤+NNRTI										
→NRTI 2剤+NNRTI	1431	66.7	66.6	66.6	0.941	1875	68.6	68.4	68.2	0.643
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	31	61.3	64.5	61.3	1.000	10	60.0	50.0	70.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	31	67.7	61.3	64.5	1.000
→投与なし(投与歴あり)	20	65.0	45.0	50.0	0.375	3	0.0	0.0	0.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	1873	66.8	66.4	66.0	0.311

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3294	74.9	74.0	73.1	0.000	1649	72.0	70.7	69.3	0.000
→NRTI 2 剤	13	53.8	53.8	46.2	1.000	7	71.4	71.4	71.4	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	35	71.4	62.9	65.7	0.625	24	62.5	54.2	54.2	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	68.0	60.0	56.0	0.375	22	68.2	59.1	54.5	0.375
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1552	58.6	57.9	57.0	0.037	1088	54.6	54.4	52.8	0.072
→NRTI 2 剤	28	64.3	64.3	64.3	1.000	19	68.4	68.4	63.2	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	119	46.2	43.7	44.5	0.824	91	44.0	40.7	41.8	0.791
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	54.3	57.1	42.9	0.289	27	44.4	51.9	40.7	1.000
→INSTI	20	45.0	50.0	50.0	1.000	16	37.5	43.8	43.8	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2816	68.0	67.4	66.6	0.008	1774	68.7	68.3	67.8	0.153
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	147	68.0	64.6	66.0	0.607	104	72.1	69.2	71.2	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	56.8	54.1	51.4	0.625	33	57.6	54.5	51.5	0.625
→投与なし(投与歴あり)	60	65.0	63.3	56.7	0.063	43	62.8	60.5	53.5	0.125
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9996	59.9	59.3	58.6	0.000	5848	58.8	58.2	57.4	0.000
内訳 変更薬剤なし	9381	59.9	59.4	58.7	0.000	5429	58.7	58.2	57.5	0.002
変更薬剤 1 剤	380	57.4	58.7	55.3	0.232	252	57.5	57.1	54.0	0.107
変更薬剤 2 剤以上	235	64.3	59.6	60.0	0.048	167	65.3	59.3	60.5	0.115
→NRTI 2 剤+NNRTI	92	57.6	53.3	57.6	1.000	59	57.6	55.9	59.3	1.000
→INSTI	103	48.5	47.6	49.5	1.000	60	45.0	46.7	48.3	0.774
→投与なし(投与歴あり)	95	44.2	43.2	45.3	1.000	58	43.1	41.4	43.1	1.000
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3533	56.6	56.4	56.3	0.453	2167	58.7	58.6	58.6	0.867
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	59	66.1	66.1	59.3	0.289	43	62.8	67.4	65.1	1.000
→INSTI	33	51.5	45.5	45.5	0.688	20	50.0	45.0	35.0	0.250
→投与なし(投与歴あり)	30	30.0	26.7	26.7	1.000	23	30.4	26.1	30.4	1.000
INSTI										
→INSTI	1901	50.3	49.9	49.3	0.123	1271	45.4	45.1	44.4	0.170

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1792	72.9	72.0	70.9	0.003	1417	78.1	77.3	76.4	0.011
→NRTI 2 剤	9	66.7	66.7	55.6	1.000	12	58.3	58.3	50.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	69.0	62.1	62.1	0.625	20	75.0	65.0	70.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	68.2	59.1	54.5	0.375	7	57.1	57.1	57.1	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1025	55.2	54.7	53.2	0.052	332	63.6	63.0	62.3	0.513
→NRTI 2 剤	11	54.5	54.5	45.5	1.000	21	61.9	61.9	61.9	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	88	44.3	39.8	40.9	0.581	38	57.9	55.3	52.6	0.727
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	53.8	53.8	38.5	0.219	6	83.3	83.3	50.0	0.500
→INSTI	15	33.3	40.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1105	69.2	68.2	67.6	0.060	1666	72.3	71.4	70.5	0.005
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	101	70.3	68.3	70.3	1.000	120	69.2	65.8	68.3	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	30	63.3	60.0	53.3	0.250	26	61.5	57.7	50.0	0.250
→投与なし(投与歴あり)	33	54.5	51.5	45.5	0.250	36	66.7	66.7	63.9	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1766	65.2	64.0	63.1	0.004	3087	67.8	67.4	66.5	0.039
内訳 変更薬剤なし	1544	65.8	64.6	63.6	0.003	2835	68.0	67.7	66.8	0.071
変更薬剤 1 剤	108	53.7	53.7	51.9	0.804	157	62.4	64.3	59.9	0.481
変更薬剤 2 剤以上	114	68.4	65.8	67.5	1.000	95	70.5	63.2	68.4	0.727
→NRTI 2 剤+NNRTI	24	66.7	62.5	62.5	1.000	42	61.9	54.8	61.9	1.000
→INSTI	10	40.0	40.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	39	38.5	41.0	38.5	1.000	38	44.7	44.7	52.6	0.453
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	257	61.5	61.1	61.5	1.000	276	55.8	56.5	57.6	0.327
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	61.9	66.7	66.7	0.940	18	66.7	77.8	72.2	1.000
→INSTI	5	100.0	80.0	40.0	0.250	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	20.0	20.0	20.0	1.000	6	50.0	33.3	33.3	1.000
INSTI										
→INSTI	54	46.3	46.3	46.3	1.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

表4-7-7(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成25年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1085	73.3	72.4	72.1	0.134	792	71.3	70.3	68.8	0.013
→NRTI 2剤	1	0.0	0.0	0.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	10	60.0	50.0	50.0	1.000	5	80.0	80.0	80.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	10	70.0	70.0	70.0	1.000	8	75.0	50.0	37.5	0.250
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	736	55.7	54.5	53.0	0.034	484	59.7	59.7	59.3	0.722
→NRTI 2剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	1	100.0	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	56	42.9	41.1	46.4	0.727	25	36.0	32.0	28.0	0.625
→NRTI 2剤+NNRTI	24	50.0	54.2	45.8	1.000	5	40.0	40.0	20.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	20	45.0	50.0	50.0	1.000
NRTI 2剤										
→NRTI 2剤	777	65.0	65.0	64.5	0.641	373	55.2	54.4	53.9	0.378
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	18	61.1	55.6	50.0	0.625	9	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	9	44.4	44.4	55.6	1.000	2	50.0	50.0	50.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	56.3	56.3	43.8	0.500	8	75.0	62.5	50.0	0.500
NRTI 2剤+PI 1・2剤										
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	3140	59.7	58.9	57.9	0.001	3769	53.7	53.2	52.6	0.014
内訳 変更薬剤なし	2924	60.1	59.3	58.5	0.003	3622	53.5	52.9	52.4	0.018
変更薬剤 1剤	127	52.0	51.2	48.0	0.302	96	56.3	59.4	57.3	1.000
変更薬剤 2剤以上	89	58.4	55.1	53.9	0.388	51	62.7	60.8	54.9	0.219
→NRTI 2剤+NNRTI	35	54.3	54.3	57.1	1.000	15	53.3	46.7	46.7	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	103	48.5	47.6	49.5	1.000
→投与なし(投与歴あり)	45	46.7	44.4	42.2	0.688	12	33.3	33.3	33.3	1.000
NRTI 2剤+NNRTI										
→NRTI 2剤+NNRTI	1397	57.1	57.1	56.8	0.707	1860	56.3	55.9	55.6	0.231
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	29	75.9	69.0	58.6	0.063	12	41.7	41.7	41.7	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	33	51.5	45.5	45.5	0.688
→投与なし(投与歴あり)	21	28.6	28.6	28.6	1.000	3	0.0	0.0	0.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	1901	50.3	49.9	49.3	0.123

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

8. AIDS発病・死亡と臨床・治療状況との関連

本節では、以下の表を示した。

表4-8-1. 観察当初のCD4値別、非発病生存割合の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

表4-8-2. 観察当初のCD4値別、AIDS発病・死亡の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

表4-8-3. 観察当初のCD4値別、非発病生存割合の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-4. 観察当初のCD4値別、AIDS発病・死亡の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-5. 観察当初のHIV-RNA量別、非発病生存割合の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-6. 観察当初のHIV-RNA量別、AIDS発病・死亡の推移
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-7. 観察当初の抗HIV薬の併用区分別、非発病生存割合の推移
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-8. 観察当初の抗HIV薬の併用区分別、AIDS発病・死亡の推移
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-9. AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値の関連
(平成5年度第4期事業対象者)

表4-8-10. AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の併用区分の関連
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-8-1. 観察当初のCD4値別、非発病生存割合の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	観察当初の CD4 値									
	～200 未満		200～350 未満		350～500 未満		500 以上		不明	
	対象者数 125		対象者数 118		対象者数 96		対象者数 53		対象者数 17	
	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合
平成5年度 第4期	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00
平成6年度	33	0.74	9	0.92	2	0.98	0	1.00	1	0.94
平成7年度	27	0.52	3	0.90	1	0.97	1	0.98	0	0.94
平成8年度	19	0.37	4	0.86	2	0.95	0	0.98	3	0.76
平成9年度	4	0.34	3	0.84	0	0.95	0	0.98	0	0.76
平成10年度	1	0.33	2	0.82	3	0.92	1	0.96	0	0.76
平成11年度	2	0.31	0	0.82	0	0.92	1	0.94	1	0.71
平成12年度	2	0.30	4	0.79	0	0.92	2	0.91	1	0.65
平成13年度	2	0.28	4	0.75	1	0.91	0	0.91	0	0.65
平成14年度	3	0.26	3	0.73	4	0.86	0	0.91	0	0.65
平成15年度	2	0.24	4	0.69	0	0.86	0	0.91	0	0.65
平成16年度	1	0.23	3	0.67	2	0.84	0	0.91	1	0.59
平成17年度	1	0.22	4	0.64	4	0.80	0	0.91	0	0.59
平成18年度	2	0.21	1	0.63	2	0.78	1	0.89	0	0.59
平成19年度 第1期	0	0.21	1	0.62	0	0.78	1	0.87	0	0.59
第2期	0	0.21	1	0.61	2	0.76	1	0.85	0	0.59
第3期	1	0.20	0	0.61	0	0.76	1	0.83	0	0.59
第4期	0	0.20	1	0.60	0	0.76	0	0.83	0	0.59
平成20年度 第1期	1	0.19	2	0.58	0	0.76	1	0.81	1	0.53
第2期	0	0.19	1	0.58	0	0.76	0	0.81	0	0.53
第3期	0	0.19	1	0.57	1	0.75	1	0.79	0	0.53
第4期	1	0.18	1	0.56	1	0.74	0	0.79	0	0.53
平成21年度 第1期	0	0.18	0	0.56	0	0.74	0	0.79	0	0.53
第2期	0	0.18	0	0.56	1	0.73	0	0.79	0	0.53
第3期	0	0.18	0	0.56	0	0.73	0	0.79	0	0.53
第4期	0	0.18	0	0.56	1	0.72	0	0.79	0	0.53
平成22年度 第1期	0	0.18	0	0.56	0	0.72	1	0.77	0	0.53
第2期	0	0.18	1	0.55	2	0.70	0	0.77	0	0.53
第3期	0	0.18	1	0.54	0	0.70	0	0.77	0	0.53
第4期	2	0.17	0	0.54	1	0.69	2	0.74	0	0.53
平成23年度 第1期	0	0.17	0	0.54	0	0.69	1	0.72	0	0.53
第2期	0	0.17	0	0.54	1	0.68	0	0.72	0	0.53
第3期	0	0.17	1	0.53	0	0.68	0	0.72	0	0.53
第4期	0	0.17	0	0.53	0	0.68	0	0.72	0	0.53
平成24年度 第1期	0	0.17	0	0.53	0	0.68	0	0.72	0	0.53
第2期	0	0.17	0	0.53	0	0.68	0	0.72	0	0.53
第3期	0	0.17	0	0.53	0	0.68	0	0.72	0	0.53
第4期	0	0.17	1	0.53	0	0.68	1	0.70	0	0.53
平成25年度 第1期	0	0.17	0	0.53	0	0.68	0	0.70	0	0.53
第2期	0	0.17	0	0.53	1	0.67	0	0.70	0	0.53
第3期	0	0.17	0	0.53	0	0.67	0	0.70	0	0.53
第4期	1	0.16	0	0.53	0	0.67	0	0.70	1	0.47

* 平成5年度第4期のAIDS発病・死亡者8人（AIDS発病5人、死亡3人）を除く
 平成6年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数、非発病生存割合は各年度第4期の値

表4-8-2. 観察当初のCD4値別、AIDS発病・死亡の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	観察当初の CD4 値									
	～200 未満		200～350 未満		350～500 未満		500 以上		不明	
	対象者数 125		対象者数 118		対象者数 96		対象者数 53		対象者数 17	
	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数
平成5年度 第4期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成6年度	25	8	6	3	1	1	0	0	1	0
平成7年度	17	10	3	0	1	0	1	0	0	0
平成8年度	14	5	2	2	1	1	0	0	3	0
平成9年度	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0
平成10年度	1	0	0	2	3	0	0	1	0	0
平成11年度	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
平成12年度	1	1	2	2	0	0	0	2	0	1
平成13年度	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0
平成14年度	0	3	1	2	1	3	0	0	0	0
平成15年度	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
平成16年度	0	1	1	2	0	2	0	0	0	1
平成17年度	0	1	1	3	0	4	0	0	0	0
平成18年度	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0
平成19年度	第1期	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	第2期	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	第3期	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	第4期	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平成20年度	第1期	0	1	0	2	0	0	1	0	1
	第2期	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	第3期	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	第4期	0	1	0	1	1	0	0	0	0
平成21年度	第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
平成22年度	第1期	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	第2期	0	0	0	1	0	2	0	0	0
	第3期	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	第4期	0	2	0	0	1	0	1	1	0
平成23年度	第1期	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	第3期	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	第4期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成24年度	第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4期	0	0	1	0	0	0	1	0	0
平成25年度	第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4期	0	1	0	0	0	0	0	0	1

* 平成5年度第4期のAIDS発病・死亡者8人（AIDS発病5人、死亡3人）を除く
平成6年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数

表4-8-3. 観察当初のCD4値別、非発病生存割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初の CD4 値										
	～200 未満		200～350 未満		350～500 未満		500 以上		不明		
	対象者数 133		対象者数 144		対象者数 134		対象者数 114		対象者数 76		
	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	
平成 9 年度	1	0.99	1	0.99	0	1.00	0	1.00	12	0.84	
平成10年度	4	0.96	4	0.97	2	0.99	2	0.98	1	0.83	
平成11年度	5	0.92	0	0.97	1	0.98	1	0.97	0	0.83	
平成12年度	11	0.84	1	0.96	3	0.96	2	0.96	1	0.82	
平成13年度	5	0.80	0	0.96	2	0.94	0	0.96	2	0.79	
平成14年度	10	0.77	16	0.92	6	0.92	6	0.95	4	0.79	
平成15年度	3	0.74	3	0.88	7	0.91	1	0.94	1	0.76	
平成16年度	1	0.73	3	0.85	1	0.90	3	0.90	4	0.74	
平成17年度	2	0.71	3	0.83	3	0.84	3	0.89	4	0.72	
平成18年度	5	0.70	4	0.81	2	0.84	6	0.87	1	0.67	
平成19年度	第 1 期	1	0.69	0	0.81	0	0.84	1	0.86	1	0.66
	第 2 期	0	0.69	2	0.79	2	0.82	1	0.85	1	0.64
	第 3 期	1	0.68	1	0.78	0	0.82	1	0.84	2	0.62
	第 4 期	0	0.68	0	0.78	1	0.81	0	0.84	0	0.62
平成20年度	第 1 期	2	0.67	1	0.78	1	0.81	3	0.82	1	0.61
	第 2 期	1	0.66	1	0.77	0	0.81	0	0.82	0	0.61
	第 3 期	0	0.66	1	0.76	1	0.80	1	0.81	0	0.61
	第 4 期	2	0.65	1	0.76	0	0.80	2	0.79	0	0.61
平成21年度	第 1 期	0	0.65	0	0.76	0	0.80	0	0.79	0	0.61
	第 2 期	0	0.65	0	0.76	1	0.79	1	0.78	0	0.61
	第 3 期	2	0.63	0	0.76	0	0.79	0	0.78	0	0.61
	第 4 期	0	0.63	1	0.75	1	0.78	0	0.78	0	0.61
平成22年度	第 1 期	0	0.63	1	0.74	0	0.78	1	0.77	1	0.59
	第 2 期	1	0.62	2	0.73	0	0.78	0	0.77	0	0.59
	第 3 期	1	0.62	1	0.72	0	0.78	0	0.77	0	0.59
	第 4 期	2	0.60	2	0.71	2	0.77	0	0.77	0	0.59
平成23年度	第 1 期	0	0.60	0	0.71	0	0.77	1	0.76	0	0.59
	第 2 期	0	0.60	1	0.70	0	0.77	0	0.76	0	0.59
	第 3 期	0	0.60	1	0.69	0	0.77	1	0.75	1	0.58
	第 4 期	0	0.60	0	0.69	1	0.76	0	0.75	1	0.57
平成24年度	第 1 期	0	0.60	0	0.69	0	0.76	0	0.75	0	0.57
	第 2 期	0	0.60	0	0.69	0	0.76	1	0.75	0	0.57
	第 3 期	0	0.60	0	0.69	1	0.75	0	0.75	0	0.57
	第 4 期	1	0.59	0	0.69	2	0.74	0	0.75	0	0.57
平成25年度	第 1 期	0	0.59	0	0.69	1	0.73	0	0.75	0	0.57
	第 2 期	0	0.59	0	0.69	0	0.73	0	0.75	1	0.55
	第 3 期	0	0.59	0	0.69	0	0.73	0	0.75	0	0.55
	第 4 期	0	0.59	2	0.68	0	0.73	0	0.75	0	0.55

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く
平成6年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数、非発病生存割合は各年度第4期の値

表4-8-4. 観察当初のCD4値別、AIDS発病・死亡の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初の CD4 値									
	～200 未満		200～350 未満		350～500 未満		500 以上		不明	
	対象者数 133		対象者数 144		対象者数 134		対象者数 114		対象者数 76	
	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数
平成9年度	1	0	1	0	0	0	0	0	2	10
平成10年度	3	1	1	3	1	1	0	2	1	0
平成11年度	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
平成12年度	6	5	0	1	0	3	0	2	0	1
平成13年度	1	4	0	0	1	1	0	0	1	1
平成14年度	1	4	2	3	0	3	0	1	0	0
平成15年度	0	3	2	5	0	1	0	1	1	1
平成16年度	1	1	2	2	0	2	0	4	0	2
平成17年度	0	3	0	3	1	6	0	1	1	0
平成18年度	0	1	2	1	0	1	0	3	0	4
平成19年度	第1期	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	第2期	0	0	0	2	0	2	0	1	0
	第3期	0	1	1	0	0	0	1	0	2
	第4期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
平成20年度	第1期	1	1	1	0	0	1	2	0	1
	第2期	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	第3期	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	第4期	0	2	0	1	0	0	1	0	0
平成21年度	第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	第3期	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	第4期	0	0	0	1	0	1	0	0	0
平成22年度	第1期	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	第2期	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	第3期	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	第4期	0	2	1	1	1	1	0	0	0
平成23年度	第1期	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	第2期	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	第3期	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	第4期	0	0	0	0	0	1	0	1	0
平成24年度	第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	第3期	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	第4期	1	0	0	0	1	1	0	0	0
平成25年度	第1期	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4期	0	0	0	2	0	0	0	0	0

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く
平成9年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数

表4-8-5. 観察当初のHIV-RNA量別、非発病生存割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初のHIV-RNA量													
	400未満		400～1000未満		1000～5000未満		5000～10000未満		10000～50000未満		50000以上		不明	
	対象者数 108		対象者数 30		対象者数 71		対象者数 38		対象者数 60		対象者数 50		対象者数 244	
	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合
平成9年度	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	1	0.98	13	0.95
平成10年度	3	0.97	0	1.00	1	0.99	0	1.00	4	0.93	2	0.94	3	0.93
平成11年度	0	0.97	0	1.00	1	0.97	0	1.00	0	0.93	4	0.86	2	0.93
平成12年度	4	0.94	1	0.97	2	0.94	2	0.95	2	0.90	2	0.82	5	0.91
平成13年度	1	0.93	0	0.97	1	0.93	1	0.92	1	0.88	1	0.80	4	0.89
平成14年度	2	0.91	2	0.90	0	0.93	1	0.89	1	0.87	1	0.78	7	0.86
平成15年度	1	0.90	0	0.90	0	0.93	0	0.89	0	0.87	5	0.68	8	0.83
平成16年度	1	0.89	2	0.83	2	0.90	1	0.87	2	0.83	2	0.64	4	0.81
平成17年度	3	0.86	2	0.77	2	0.87	2	0.82	1	0.82	2	0.60	3	0.80
平成18年度	2	0.84	1	0.73	0	0.87	0	0.82	2	0.78	0	0.60	7	0.77
平成19年度 第1期	0	0.84	0	0.73	0	0.87	0	0.82	0	0.78	1	0.58	2	0.76
第2期	0	0.84	0	0.73	0	0.87	0	0.82	1	0.77	0	0.58	5	0.74
第3期	0	0.84	0	0.73	1	0.86	0	0.82	0	0.77	0	0.58	4	0.73
第4期	0	0.84	0	0.73	0	0.86	0	0.82	0	0.77	0	0.58	1	0.72
平成20年度 第1期	2	0.82	0	0.73	0	0.86	0	0.82	2	0.73	1	0.56	3	0.71
第2期	0	0.82	0	0.73	1	0.85	0	0.82	0	0.73	1	0.54	0	0.71
第3期	1	0.81	0	0.73	0	0.85	0	0.82	0	0.73	0	0.54	2	0.70
第4期	1	0.81	1	0.70	0	0.85	0	0.82	1	0.72	0	0.54	2	0.69
平成21年度 第1期	0	0.81	0	0.70	0	0.85	0	0.82	0	0.72	0	0.54	0	0.69
第2期	0	0.81	0	0.70	0	0.85	0	0.82	0	0.72	0	0.54	2	0.68
第3期	0	0.81	0	0.70	0	0.85	0	0.82	1	0.70	1	0.52	0	0.68
第4期	1	0.80	0	0.70	0	0.85	0	0.82	0	0.70	0	0.52	1	0.68
平成22年度 第1期	0	0.80	0	0.70	0	0.85	0	0.82	1	0.68	0	0.52	2	0.67
第2期	0	0.80	0	0.70	0	0.85	0	0.82	1	0.67	0	0.52	2	0.66
第3期	0	0.80	0	0.70	1	0.83	0	0.82	0	0.67	1	0.50	0	0.66
第4期	2	0.78	0	0.70	0	0.83	1	0.79	1	0.65	0	0.50	2	0.66
平成23年度 第1期	0	0.78	0	0.70	0	0.83	0	0.79	0	0.65	0	0.50	1	0.65
第2期	0	0.78	0	0.70	0	0.83	0	0.79	0	0.65	0	0.50	1	0.65
第3期	0	0.78	0	0.70	0	0.83	0	0.79	2	0.62	0	0.50	1	0.64
第4期	1	0.77	0	0.70	0	0.83	0	0.79	0	0.62	0	0.50	1	0.64
平成24年度 第1期	0	0.77	0	0.70	0	0.83	0	0.79	0	0.62	0	0.50	0	0.64
第2期	1	0.76	0	0.70	0	0.83	0	0.79	0	0.62	0	0.50	0	0.64
第3期	0	0.76	0	0.70	1	0.82	0	0.79	0	0.62	0	0.50	0	0.64
第4期	1	0.75	0	0.70	1	0.80	0	0.79	1	0.60	0	0.50	0	0.64
平成25年度 第1期	0	0.75	0	0.70	1	0.79	0	0.79	0	0.60	0	0.50	0	0.64
第2期	0	0.75	0	0.70	0	0.79	0	0.79	0	0.60	0	0.50	1	0.64
第3期	0	0.75	0	0.70	0	0.79	0	0.79	0	0.60	0	0.50	0	0.64
第4期	1	0.74	0	0.70	0	0.79	0	0.79	0	0.60	0	0.50	1	0.63

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く
 平成9年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数、非発病生存割合は各年度第4期の値

表4-8-6. 観察当初のHIV-RNA量別、AIDS発病・死亡の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初のHIV-RNA量													
	400未満		400～1000未満		1000～5000未満		5000～10000未満		10000～50000未満		50000以上		不明	
	対象者数 108		対象者数 30		対象者数 71		対象者数 38		対象者数 60		対象者数 50		対象者数 244	
	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数
平成9年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10
平成10年度	1	2	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	2	1
平成11年度	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	0
平成12年度	1	3	0	1	0	2	0	2	1	1	1	1	3	2
平成13年度	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2
平成14年度	0	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5
平成15年度	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	8
平成16年度	0	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	1	0	4
平成17年度	0	3	0	2	1	1	0	2	0	1	0	2	1	2
平成18年度	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6
平成19年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
第3期	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
第4期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
平成20年度 第1期	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2
第2期	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
第3期	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
第4期	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
平成21年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
第4期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
平成22年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
第3期	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
第4期	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
平成23年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
第4期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
平成24年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
第4期	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平成25年度 第1期	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く

平成9年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数

表4-8-7. 観察当初の抗HIV薬の併用区分別、非発病生存割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初の抗HIV薬の併用区分													
	投与なし (投与歴なし)		投与なし (投与歴あり)		NRTI 1 剤		NRTI 2 剤		NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤		その他		不明	
	対象者数 124		対象者数 20		対象者数 58		対象者数 214		対象者数 91		対象者数 35		対象者数 59	
	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合	発病・ 死亡者数	非発病 生存割合
平成9年度	0	1.00	0	1.00	0	1.00	1	1.00	1	0.99	0	1.00	12	0.80
平成10年度	1	0.99	0	1.00	1	0.98	4	0.98	6	0.92	0	1.00	1	0.78
平成11年度	2	0.98	0	1.00	1	0.97	2	0.97	2	0.90	0	1.00	0	0.78
平成12年度	2	0.96	1	0.95	2	0.93	7	0.93	3	0.87	2	0.94	1	0.76
平成13年度	1	0.95	1	0.90	1	0.91	1	0.93	3	0.84	0	0.94	2	0.73
平成14年度	2	0.94	1	0.85	2	0.88	5	0.91	3	0.80	1	0.91	0	0.73
平成15年度	2	0.92	1	0.80	2	0.84	4	0.89	4	0.76	1	0.89	0	0.73
平成16年度	2	0.90	1	0.75	2	0.81	3	0.87	1	0.75	3	0.80	2	0.69
平成17年度	4	0.87	0	0.75	2	0.78	7	0.84	1	0.74	0	0.80	1	0.68
平成18年度	1	0.86	1	0.70	2	0.74	3	0.83	1	0.73	1	0.77	3	0.63
平成19年度 第1期	1	0.85	0	0.70	0	0.74	0	0.83	1	0.71	0	0.77	1	0.61
第2期	2	0.84	0	0.70	2	0.71	2	0.82	0	0.71	0	0.77	0	0.61
第3期	0	0.84	0	0.70	0	0.71	2	0.81	1	0.70	0	0.77	2	0.58
第4期	0	0.84	0	0.70	0	0.71	1	0.80	0	0.70	0	0.77	0	0.58
平成20年度 第1期	4	0.81	1	0.65	1	0.69	1	0.80	1	0.69	0	0.77	0	0.58
第2期	0	0.81	0	0.65	0	0.69	2	0.79	0	0.69	0	0.77	0	0.58
第3期	1	0.80	0	0.65	0	0.69	1	0.79	1	0.68	0	0.77	0	0.58
第4期	2	0.78	0	0.65	0	0.69	1	0.78	0	0.68	2	0.71	0	0.58
平成21年度 第1期	0	0.78	0	0.65	0	0.69	0	0.78	0	0.68	0	0.71	0	0.58
第2期	0	0.78	0	0.65	1	0.67	1	0.78	0	0.68	0	0.71	0	0.58
第3期	0	0.78	0	0.65	1	0.66	0	0.78	1	0.67	0	0.71	0	0.58
第4期	0	0.78	0	0.65	0	0.66	2	0.77	0	0.67	0	0.71	0	0.58
平成22年度 第1期	1	0.77	0	0.65	0	0.66	1	0.76	1	0.66	0	0.71	0	0.58
第2期	0	0.77	0	0.65	0	0.66	2	0.75	1	0.65	0	0.71	0	0.58
第3期	0	0.77	0	0.65	0	0.66	1	0.75	0	0.65	1	0.69	0	0.58
第4期	0	0.77	1	0.60	0	0.66	4	0.73	1	0.64	0	0.69	0	0.58
平成23年度 第1期	1	0.77	0	0.60	0	0.66	0	0.73	0	0.64	0	0.69	0	0.58
第2期	0	0.77	0	0.60	0	0.66	1	0.72	0	0.64	0	0.69	0	0.58
第3期	0	0.77	0	0.60	1	0.64	1	0.72	0	0.64	0	0.69	1	0.56
第4期	0	0.77	0	0.60	1	0.62	1	0.71	0	0.64	0	0.69	0	0.56
平成24年度 第1期	0	0.77	0	0.60	0	0.62	0	0.71	0	0.64	0	0.69	0	0.56
第2期	1	0.76	0	0.60	0	0.62	0	0.71	0	0.64	0	0.69	0	0.56
第3期	0	0.76	0	0.60	0	0.62	1	0.71	0	0.64	0	0.69	0	0.56
第4期	0	0.76	0	0.60	0	0.62	2	0.70	0	0.64	1	0.66	0	0.56
平成25年度 第1期	0	0.76	0	0.60	0	0.62	1	0.70	0	0.64	0	0.66	0	0.56
第2期	0	0.76	0	0.60	0	0.62	0	0.70	0	0.64	0	0.66	1	0.54
第3期	0	0.76	0	0.60	0	0.62	0	0.70	0	0.64	0	0.66	0	0.54
第4期	0	0.76	0	0.60	1	0.60	1	0.69	0	0.64	0	0.66	0	0.54

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く

* 観察当初のNRTI 2剤+NNRTI の対象者は0人

平成9年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数、非発病生存割合は各年度第4期の値

表4-8-8. 観察当初の抗HIV薬の併用区分別、AIDS発病・死亡の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	観察当初の抗HIV薬の併用区分													
	投与なし (投与歴なし)		投与なし (投与歴あり)		NRTI 1 剤		NRTI 2 剤		NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤		その他		不明	
	対象者数 124		対象者数 20		対象者数 58		対象者数 214		対象者数 91		対象者数 35		対象者数 59	
	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数	AIDS 発病者数	死亡者数
平成9年度	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	10
平成10年度	0	1	0	0	0	1	2	2	3	3	0	0	1	0
平成11年度	1	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
平成12年度	0	2	0	1	1	1	2	5	2	1	1	1	0	1
平成13年度	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1
平成14年度	0	2	0	1	1	1	2	3	0	3	0	1	0	0
平成15年度	1	1	0	1	1	1	0	4	1	3	0	1	0	0
平成16年度	0	2	0	1	0	2	1	2	0	1	2	1	0	2
平成17年度	0	4	0	0	0	2	1	6	0	1	0	0	1	0
平成18年度	0	1	1	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	3
平成19年度 第1期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
第2期	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2
第4期	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
平成20年度 第1期	1	3	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
第3期	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
第4期	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
平成21年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
第4期	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
平成22年度 第1期	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
第4期	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
平成23年度 第1期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
第4期	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
平成24年度 第1期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3期	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
第4期	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
平成25年度 第1期	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
第3期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4期	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

* 平成9年度第1期のAIDS発病・死亡者4人（AIDS発病3人、死亡1人）を除く

* 観察当初のNRTI 2剤+NNRTI の対象者は0人

平成9年度～平成18年度：発病・死亡者数は各年度1年間の人数

表4-8-9. AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値の関連（平成5年度第4期事業対象者）

A. 観察期間：平成5年度第4期～平成25年度末

		人数	ハザード比	95%信頼区間	p 値
CD4 値 (対象者数 392 人)	～200 未満	125	6.85	(4.03 – 11.66)	<0.001
	200～350 未満	118	1.95	(1.12 – 3.40)	0.018
	350～500 未満	96	1.18	(0.65 – 2.15)	0.593
	500 以上（参照カテゴリー）	53	1.00	—	—

B. 観察期間：平成5年度第4期～平成8年度末

		人数	ハザード比	95%信頼区間	p 値
CD4 値 (対象者数 392 人)	～200 未満	125	50.79	(7.06 – 365.30)	<0.001
	200～350 未満	118	7.73	(1.03 – 58.25)	0.047
	350～500 未満	96	2.81	(0.33 – 24.01)	0.346
	500 以上（参照カテゴリー）	53	1.00	—	—

C. 観察期間：平成9年度第1期～平成25年度末

		人数	ハザード比	95%信頼区間	p 値
CD4 値 (対象者数 291 人)	～200 未満	46	2.76	(1.46 – 5.22)	0.002
	200～350 未満	102	1.61	(0.89 – 2.91)	0.116
	350～500 未満	91	1.08	(0.57 – 2.04)	0.807
	500 以上（参照カテゴリー）	52	1.00	—	—

表4-8-10. AIDS発病・死亡に対する観察当初のCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の併用区分の関連（平成9年度第1期事業対象者）

		人数	ハザード比	95%信頼区間	p 値
CD4 値 (対象者数 525 人)	～200 未満	133	1.90	(1.21 - 2.98)	0.005
	200～350 未満	144	1.31	(0.82 - 2.08)	0.258
	350～500 未満	134	1.08	(0.66 - 1.75)	0.769
	500 以上 (参照カテゴリー)	114	1.00	—	—
HIV-RNA 量 (対象者数 357 人)	～400 未満 (参照カテゴリー)	108	1.00	—	—
	400～1000 未満	30	1.25	(0.59 - 2.65)	0.564
	1000～5000 未満	71	0.84	(0.45 - 1.55)	0.567
	5000～10000 未満	38	0.83	(0.38 - 1.83)	0.650
	10000～50000 未満	60	1.71	(0.99 - 2.95)	0.055
	50000 以上	50	2.62	(1.53 - 4.47)	<0.001
抗 HIV 薬の併用区分 (対象者数 542 人)	投与なし (投与歴なし) (参照カテゴリー)	124	1.00	—	—
	投与なし (投与歴あり)	20	1.82	(0.84 - 3.96)	0.129
	NRTI 1 剤	58	1.76	(1.03 - 3.02)	0.039
	NRTI 2 剤	214	1.26	(0.83 - 1.92)	0.278
	NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	91	1.69	(1.04 - 2.75)	0.036
	その他	35	1.46	(0.75 - 2.84)	0.266
CD4 値、 HIV-RNA 量 (対象者数 356 人)	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：～50000 未満 (参照カテゴリー)	243	1.00	—	—
	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：50000 以上	23	1.86	(0.95 - 3.65)	0.071
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：～50000 未満	64	1.57	(0.97 - 2.54)	0.066
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：50000 以上	26	3.47	(1.97 - 6.10)	<0.001
CD4 値、 抗 HIV 薬の併用区分 (対象者数 525 人)	CD4 値：200 以上、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外 (参照カテゴリー)	349	1.00	—	—
	CD4 値：200 以上、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	43	0.69	(0.35 - 1.37)	0.294
	CD4 値：～200 未満、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外	87	1.33	(0.89 - 1.98)	0.169
	CD4 値：～200 未満、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	46	2.29	(1.45 - 3.59)	<0.001
HIV-RNA 量、 抗 HIV 薬の併用区分 (対象者数 357 人)	HIV-RNA 量：～50000 未満、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外 (参照カテゴリー)	258	1.00	—	—
	HIV-RNA 量：～50000 未満、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	49	1.13	(0.64 - 2.01)	0.673
	HIV-RNA 量：50000 以上、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外	33	1.90	(1.09 - 3.33)	0.024
	HIV-RNA 量：50000 以上、抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	17	3.96	(2.09 - 7.49)	<0.001
CD4 値、 HIV-RNA 量、 抗 HIV 薬の併用区分 (対象者数 356 人)	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：～50000 未満、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外 (参照カテゴリー)	216	1.00	—	—
	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：～50000 未満、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	27	0.90	(0.39 - 2.10)	0.812
	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：50000 以上、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外	19	2.02	(0.99 - 4.11)	0.053
	CD4 値：200 以上、HIV-RNA 量：50000 以上、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	4	1.04	(0.14 - 7.54)	0.966
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：～50000 未満、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外	42	1.50	(0.85 - 2.66)	0.161
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：～50000 未満、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	22	1.66	(0.79 - 3.48)	0.184
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：50000 以上、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤以外	14	2.11	(0.91 - 4.89)	0.084
	CD4 値：～200 未満、HIV-RNA 量：50000 以上、 抗 HIV 薬：NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	12	5.92	(2.92 - 12.01)	<0.001

第Ⅲ部 資料

1. 対象者用健康状態報告書
2. 日常報告書

様式2-2

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が担当医師に当該年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の報告書（様式3）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願い致します。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分（Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月）、Ⅲ期（10～12月）、Ⅳ期（1～3月））記入して下さい。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック（✓）を入れ、（ ）には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載して下さい。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称						
住 所（〒 — ）						
電話番号 （ — — ）						
医師氏名 （診療科名						印 ）
備 考						

{ 1/4 }

A. 基礎疾患と肝炎等の状況				
基 礎 疾 患	☐ 血友病A ☐ 血友病B ☐ von Willebrand病 ☐ 二次感染 ☐ 三次感染 ☐ その他 ()			
肝炎等の有無	☐ 無し ☐ 慢性肝炎 ☐ 肝硬変 ☐ 肝臓 ☐ その他 ()			
HBs- 抗 原	☐ + ☐ - ☐ 不明	HCV-抗体	☐ + ☐ - ☐ 不明	
H C V - R N A	定量: ☐ TaqMan法 [() Log IU/mL ☐ 検出せず] ☐ RT-PCR法() $\times 10^3$ IU/mL ☐ 未検査			
血 小 板 数	() $\times 10^4$ /mm ³ ☐ 未検査	A F P	()ng-mL	☐ 未検査
T.bil	()mg/dL ☐ 未検査	クレアチニン	()mg/dL	☐ 未検査
ALT (GPT)	()IU/L ☐ 未検査	インターフェロン製剤 での治療歴 (リバビリンの併用の有無)	☐ 有 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 無	
アルブミン	()g/dL ☐ 未検査			
プロトロンビン	PT活性%()% ☐ 未検査	肝 移 植 歴	☐ 有 ☐ 無	
脳 血 管 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 脳出血 ☐ 脳梗塞 ☐ その他の脳血管疾患			
虚 血 性 心 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 心筋梗塞 ☐ その他の虚血性心疾患			
悪性新生物(肝以外)の有無	☐ 無し ☐ 肝臓以外の悪性新生物 (部位:)			
そ の 他 の 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 高血圧 ☐ 糖尿病 ☐ その他 ()			

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・AFP値・クレアチニン値については、単位にご注意のうえ () に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

B. 検査の実施状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
検査実施年月日	(13 / /)	(13 / /)	(13 / /)	(14 / /)
期間中の診察の有無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
期間中のCD4値検査の有無	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査
CD4値 (/ μ L)	()	()	()	()
CD4/CD8比	()	()	()	()
期間中のHIV-RNA量検査の有無	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査
HIV-RNA量の検査法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法
HIV-RNA量	() コピー/mL	() コピー/mL	() コピー/mL	() コピー/mL
*単位は「コピー/mL」でご記入下さい (例: $4.3 \times 10^3 \rightarrow 4300$ コピー/mL)。 *検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入下さい。	☐ 検出限界未満 () コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 () コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 () コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 () コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ザルシタビン [ddC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. ジドブジン・ラミブジン[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. テノフォビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. アバカビル・ラミブジン[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. テノフォビル・エムトリシタビン[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. デラビルジン [DLV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. リルビピリン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. インジナビル [IDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. ロビナビル・リトナビル[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他3 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック (✓) をし、記入例のように服薬状況を **5段階** から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック (✓) をして下さい。また、1～26以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の () に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	✓	(1 . ② . 3 . 4 . 5)		

D. インターフェロン製剤等の投与状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
2. リバビリソ	☐	☐	☐	☐
3. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（✓）をし、インターフェロン製剤等の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

E. 副作用の発現状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐
その他3 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（✓）して下さい。副作用の無かった場合は、「0.なし」にチェック（✓）して下さい。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入下さい。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. ペンタミジン点滴	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（✓）して下さい。投与が無かった場合は、「0.実施していない」をチェック（✓）して下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

G. 眼底検査実施の有無	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（✓）して下さい。

様式3

日常報告書

(本人記入用)

					個人番号	-0
氏名		男・女	身長	cm	生年月日	年 月 日
I 期	4月～6月分	平成 25 年 6 月 末日現在			体 重	kg

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても乾きやすい 1 2 3 4 5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない どちらとも言えない とても減りやすい 1 2 3 4 5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても息切れしやすい 1 2 3 4 5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても疲れやすい 1 2 3 4 5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる どちらとも言えない 全く眠れない 1 2 3 4 5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

〔1/4〕

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ○で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅱ期	7月～9月分	平成 25 年 9 月 末日現在	体 重	kg
----	--------	------------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1	どちらとも言えない 2	全くない 3	4	5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
3) □が乾きやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても乾きやすい 3	4	5
4) □内炎ができたり、□の中が痛いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1	どちらとも言えない 2	とても減りやすい 3	4	5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても息切れしやすい 3	4	5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても疲れやすい 3	4	5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものがでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1	どちらとも言えない 2	全く眠れない 3	4	5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

{2/4}

記入要領

- この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
- 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
- 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ〇で囲んで下さい。
- I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅲ期	10月～12月分	平成 25 年 12月 末日現在	体 重	kg
----	----------	------------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ〇で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても乾きやすい 1 2 3 4 5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない どちらとも言えない とても減りやすい 1 2 3 4 5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても息切れしやすい 1 2 3 4 5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても疲れやすい 1 2 3 4 5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる どちらとも言えない 全く眠れない 1 2 3 4 5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ〇で囲んで下さい。

- 全く健康。
- 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
- 努力して通常の生活を維持している。
- 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
- 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
- 介助が必要であり、医療も必要である。
- 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
- 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

[3/4]

Ⅳ期	1月～3月分	平成 26 年 月 日現在	体 重	kg
----	--------	---------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全くない
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても乾きやすい
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても減りやすい
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても息切れしやすい
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても疲れやすい
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全く眠れない

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。 2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。 3. 努力して通常の生活を維持している。 4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。 5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。 6. 介助が必要であり、医療も必要である。 7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。 8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。
--

備 考（日常生活で特に不自由な点、健康上留意しておられることなど有りましたらご記入下さい。）

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）：TEL — —

※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式5）を速やかに提出して下さいようお願い致します。

[4/4]

エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

平成 25 年度 報告書

発行日 平成 27 年 3 月 第 1 版

発行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV 感染者の調査研究班 事務局
国立大阪医療センター 臨床研究センター 内
〒540-0006
大阪市中央区法円坂 2-1-14
TEL 06 - 6942 - 1331 FAX 06 - 6946 - 3652

編集	班長	国立大阪医療センター	白阪 琢磨
	班員	国立国際医療研究センター	岡 慎一
		藤田保健衛生大学	川戸美由紀
		藤田保健衛生大学	橋本 修二
		兵庫医科大学	日笠 聡
		東京医科大学	福武 勝幸
		国立長崎医療センター	八橋 弘

印刷・製本 (株)太陽美術
