



エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV感染者の調査研究

平成26年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

研究班の構成

班長	白 阪 琢 磨	国立大阪医療センター
班員	岡 慎 一	国立国際医療研究センター
	川 戸 美由紀	藤田保健衛生大学
	橋 本 修 二	藤田保健衛生大学
	日 笠 聡	兵庫医科大学
	福 武 勝 幸	東京医科大学
	八 橋 弘	国立長崎医療センター

目 次

はじめに

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目的	1
第2章 結果の概要	2
1. 臨床・日常生活の現状	2
2. 治療の現状	6
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討	10

第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法	17
1. 集計の対象者	17
2. 集計の基礎資料	17
3. データの取り扱い	17
4. 結果表の作成方法	18
5. 集計結果を見る上での注意	21
第4章 結果表	25
1. 臨床・日常生活・治療の現状	25
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移	44
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）	58
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）	68
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）	78
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）	88
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連	98

第Ⅲ部 資料

1. 対象者用健康状態報告書	113
2. 日常報告書	117

参考資料 エイズ発症者の調査の概要

第1章 調査の目的と方法、結果の概要	121
第2章 集計方法	122
第3章 結果表	123
1. 臨床・治療状況	123
2. 生活状況	129
第4章 資料	137
1. 健康状態報告書	137
2. 生活状況報告書	141

は じ め に

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進展しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることも可能となった。また、これらの進展は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いわば「管理可能な慢性疾患」に近づきつつあるといえるが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることによって、これまでとは別の課題も表面化してきている。以前にもまして、臨床、日常生活と治療の現状や推移を的確に把握し、治療法変更の影響や AIDS 発病の関連要因の検討などを通して、HIV 感染者の QOL 向上を目指すことの重要性が大きくなってきている。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている（厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書）。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

本報告書は平成 26 年度までの本事業により集積された情報に基づいて、臨床・日常生活・治療の現状および推移を示したものである。肝炎の現状や治療法変更の影響の検討も試みている。「第Ⅰ部 目的、結果の概要」、「第Ⅱ部 集計方法、結果表」と「第Ⅲ部 資料」の 3 部から構成されている。第Ⅰ部には目的と結果の概要を示している。ここでは、本報告書の概要を理解したい読者を想定し、コンパクトかつ視覚的に提示することに留意した。第Ⅱ部には本報告書をより詳細に理解したい読者のために、詳細な集計方法を示すとともに、集計結果のすべてを結果表として提示した。第Ⅲ部には事業への報告書を資料として添付した。HIV 感染者やその家族、医師や医療関係者、行政関係者、研究者などの今後の活動において、本報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに公益財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

巻末に、参考資料として、「エイズ発症者の調査」の概要を付けた。これには、エイズ発症者の臨床・治療と生活の状況に関する調査結果が含まれている。エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症の HIV 感染者とともに、エイズ発症者の状況を考慮することが重要である。また、長期療養に関する今後の対応方策を検討する上で、HIV 感染者とエイズ発症者の臨床・治療と生活の状況の把握が大切と考えられる。

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目 的

第2章 結果の概要

1. 臨床・日常生活の現状
2. 治療の現状
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

第1章 目 的

抗HIV治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることによって、HIV感染者のQOL維持・向上において、臨床・日常生活・治療の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」（以下、本事業）は、血液製剤によるHIV感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成5年度から開始され、その対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。なお、AIDSを発病すると、本事業の対象から外れることになる。

研究目的は、血液製剤によるHIV感染者において、臨床・日常生活・治療についての平成26年度の現状および平成5～26年度の推移を明らかにすることにある。臨床状況としてはCD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、および、肝炎の状況などである。日常生活状況としては身体状況と日常生活動作などである。治療状況としては、抗HIV薬の併用状況、服用状況と副作用とともに、ニューモシスチス肺炎予防薬の投与と眼底検査実施の状況などである。HIV感染者において、抗HIV治療法変更の影響、臨床・日常生活・治療の最近の変化などが注目されていることから、これらの課題の検討を試みる。

第2章 結果の概要

平成26年度事業対象者は525人であった。平成26年度の開始者はなく、AIDS発病・死亡などに伴う中止者は7人であった。平成5～26年度では、事業対象者の実人数は945人であり、AIDS発病・死亡などに伴う中止者が427人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 臨床・日常生活の現状」、「2. 治療の現状」と「3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

1. 臨床・日常生活の現状

平成26年度第4期（27年1～3月）事業対象者519人において、CD4値、HIV-RNA量、身体状況と日常生活動作および肝炎の状況を観察した。なお、第4期データが未報告の場合、第1～3期のものを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、平成24年度と25年度の第4期の結果を付記）。CD4値は200／ μ l未満が8%、200～350未満が16%、350～500未満が26%、500以上が51%であった。HIV-RNA量は400コピー／ml未満が95%を占め、その中で、50未満（検出限界50以下）が91%であり、10,000以上は1%であった。平成24・25年度の結果と比べて、CD4値は500以上の割合が年々上昇し、HIV-RNA量は400未満の割合が平成25年度からきわめて高い値であった。

図2-1-3～4にCD4値別、身体状況と日常生活動作の良い者の割合を示す（表4-1-18～19を参照）。なお、身体状況の良い者とは食欲や疲れなどの13項目の平均が「どちらともいえない」よりも良い状態であり、日常生活動作の良い者とは「全く健康」または「軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる」である（「第3章 集計方法」を参照）。身体状況の良い者の割合は63%、日常生活動作の良い者の割合は52%であった。いずれも良い者の割合はCD4値が200未満で低い傾向であった。

図2-1-5～6に肝炎ウイルスと肝炎の状況を示す（表4-2-1～2を参照、平成24年度と25年度の第4期の結果を付記）。HCV抗体陽性は91%であった。肝炎の状況としては、肝がんが2%、肝硬変が11%、慢性肝炎が54%に見られた。平成24・25年度の結果と比べて、肝がんと肝硬変の割合に大きな変化がなかった

以上、CD4値とHIV-RNA量の良好な状態にある者が多かった。CD4値の低い者では日常生活状況が良くない傾向であった。肝がんや肝硬変が一部の者に見られ、慢性肝炎の者が多かった。

図2-1-1. CD4値の分布（平成24～平成26年度第4期事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（平成24～平成26年度第4期事業対象者）




図2-1-3. CD4値別、身体状況（平成26年度第4期事業対象者）

身体状況

良い者の割合
(%)




図2-1-4. CD4値別、日常生活動作（平成26年度第4期事業対象者）

日常生活動作

良い者の割合
(%)




図2-1-5. 肝炎ウイルスの状況（平成26年度第4期事業対象者）





図2-1-6. 肝炎の状況（平成24～平成26年度第4期事業対象者）



2. 治療の現状

平成26年度第4期事業対象者において、抗HIV薬の併用区分、服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査の状況を観察した。図2-2-1にCD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照）。抗HIV薬の併用区分としては、「INSTI」（インテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせ）が57%と最も多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が16%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が14%、それ以外の投与状況が8%であった。投与なしは過去の投与歴なしが5%、過去の投与歴ありが2%であった。なお、投与歴なしは本事業の対象者となった時点以降に抗HIV薬の投与がないことを指し、それ以前の投与ありが一部含まれている可能性がある。

図2-2-2に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の7つの組み合わせが10人以上に投与され、投与者全体の51%を占めていた。その中で、4つの組み合わせが「INSTI」（TDF+FTC+RAL、TDF+FTC+DTG、3TC+ABC+RAL、3TC+ABC+DTG）であり、193人（投与者全体の40%）に投与されていた。なお、この併用区分は各期間内に投与された薬剤に基づくものであり、同時併用と異なるケースも若干含まれることに注意を要する。

図2-2-3～4に抗HIV薬の併用区分別、服用状況と副作用を示す（表4-1-7～8を参照）。「全部服用」の割合が97%と高く、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」ごとにみても同様であった。副作用としては、リポジストロフィーが多く、それ以外は「NRTI2剤+PI1・2剤」の下痢の6%などであった。なお、副作用は各期間またはそれ以前に投与された薬剤に基づくものであり、投与中の薬剤によらないもの（副作用によって薬剤が変更される場合など）が含まれることに注意を要する。図2-2-5にCD値別、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を示す（表4-1-12～13を参照）。CD4値が200未満では、ニューモシスチス肺炎予防薬が29%に投与されていた。

以上、抗HIV薬の投与はインテグラーゼ阻害薬を含む、いくつかの組み合わせにかなり集中していた。服薬状況はきわめて良好であったが、一方、リポジストロフィーなどの副作用もみられた。最新の知見に基づく適切な治療が実施されているように思われる。HIV-RNA量とCD4値、服用状況と副作用に留意しつつ、「抗HIV治療ガイドライン（2015年3月）」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）による「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班」）を参考にして、一層の適切な治療へ向かうことを望みたい。

図2-2-1. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成26年度第4期事業対象者）







図2-2-2. 抗HIV薬の併用の主な組み合わせ（平成26年度第4期事業対象者）



* 10例以上のみ表示

図2-2-3. 抗HIV薬の併用区分別、服薬状況（平成26年度第4期事業対象者）



抗 HIV 薬の併用区分

図2-2-4. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成26年度第4期事業対象者）






図2-2-5. CD4値別、ニューモシスチス肺炎(PCP)予防薬と眼底検査(平成26年度第4期事業対象者)



3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

平成5年度第4期当初の事業対象者417人と平成9年度第1期当初の事業対象者605人において、[図2-3-1～2](#)にAIDS発病・死亡者数の推移を示す。AIDS発病・死亡者数は平成5～8年度に多かったが、平成9年度以降に著しく減少し、さらに平成23年度以降に若干の減少がみられた。

[図2-3-3～6](#)にCD4値とHIV-RNA量の推移を示す（[表4-5-1、5](#)を参照）。CD4値の中央値について、AIDS未発病の生存者では、平成9～13年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいが続いたが、平成20年度頃から上昇傾向がみられた。AIDS発病・死亡者を最悪値とみて観察対象に含めると、CD4値の中央値は平成14～17年度に低下傾向、その後ほぼ横ばい、最近に若干の上昇傾向であった。CD4値350以上の割合もほぼ同様の傾向であった。HIV-RNA量の中央値は平成9年度第1期以降急激に低下し、平成11年度第3期から400未満（検出限界以下）であった。400未満の割合は上昇を継続しており、AIDS未発病の生存者では90%以上であった。[図2-3-7～8](#)に身体状況と日常生活動作の推移を示す（[表4-5-3～4](#)を参照）。身体状況と日常生活動作の良い者の割合は平成9年度から低下したが、AIDS未発病の生存者では平成14～16年度以降に横ばいまたは若干の低下傾向であった。

[図2-3-9](#)に抗HIV薬の併用区分の推移を示す（[表4-5-6](#)を参照）。「NRTI2剤+PI1・2剤」の割合は平成11年度まで急激に上昇し、その後に低下と上昇を経て、最近、低下傾向であった。「NRTI2剤+NNRTI」の割合は平成15年度まで急激に上昇したが、その後にほぼ横ばいが続き、最近はや低下傾向であった。平成20年度から「INSTI」の急激な増加が開始し、平成26年度には投与者全体の50%以上となった。[図2-3-10](#)に平成9年度第2期～24年度第3期の間で抗HIV薬の併用区分が変更された主なケース（変更なしは参考）について、変更前後のCD4値の中央値を示す（[表4-6-2](#)を参照）。CD4値の中央値は、「投与なし（投与歴なし）」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により100程度の上昇、「投与なし（投与歴あり）」と「NRTI2剤」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により50程度の上昇が見られた。また、「NRTI2剤+PI1・2剤」からの変更は「NRTI2剤」からの変更と比べてCD4値の良い状況で変更されていた。

以上、AIDS発病・死亡は以前より著しく減少し、最近、さらに若干の減少がみられた。HIV-RNA量とCD4値の改善が進むとともに、身体状況と日常生活動作の悪化が止まりつつある傾向であった。抗HIV薬の併用区分として、「INSTI」が急激に増加し、投与者全体の50%以上となった。抗HIV薬の変更とCD4値の変化との間には強い関連性が示唆された。今後、さらに推移観察を継続するとともに、推移の関連要因の検討を進めることが重要であろう。

図2-3-1. AIDS発病・死亡者数の推移（平成5年度第4期事業対象者）

AIDS 発病・
死亡者数





図2-3-2. AIDS発病・死亡者数の推移（平成9年度第1期事業対象者）

AIDS 発病・
死亡者数







図2-3-5. CD4値350以上の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-6. HIV-RNA量400未満の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-7. 身体状況の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-8. 日常生活動作の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-9. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）





図2-3-10. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）



第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法

1. 集計の対象者
2. 集計の基礎資料
3. データの取り扱い
4. 結果表の作成方法
5. 集計結果を見る上での注意

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

第3章 集計方法

1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～26年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。平成5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、平成9年度以降はその制限がなくなっている。また、AIDSを発病すると、本事業の対象から外れることになる。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。平成5～26年度に一度でも本事業の対象になった実人数は945人である。その中で、平成5年度に本事業の対象となった者が48%、平成6～9年度が8～12%、平成10～16年度が1～3%、平成17～26年度が1%未満であった。本事業の中止者は427人であり、中止理由のほとんどはAIDS発病・死亡に伴うものである。その中で、平成8年度末までの中止者が177人であり、41%を占めている。平成26年度第4期での本事業対象者は525人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（AIDS既発症者と死亡者を除く）は2014年5月時点で569人とされており、その92%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は平成5～26年度に本事業対象者から提出された調査票である。調査票には「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」があり、いずれも四半期ごとに提出される（「日常報告書」は平成5～8年度には毎月提出された）。

「対象者用健康状態報告書」の主な項目は、年齢、CD4値、CD4/CD8比、抗HIV薬の投与状況などである。平成9年度以降にはHIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用などが追加されている。肝炎ウイルスと肝炎に関係する項目は平成14年度以降に順次拡充されている。抗HIV薬の投与状況としては平成5～8年度ではAZTとddIを挙げて、それ以外は薬剤名を記入する方式になっていた。平成9年度以降では抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名を追加し、それ以外は薬剤名を記入する方式となっている（記入された薬剤名もすべて計上した）。副作用としては平成14年度には中枢神経症状とリポジストロフィー（平成13年度までは「その他」に含む）、平成16年度にはすべての副作用の有無が追加された。

「日常報告書」の主な項目は、体重、身体状況、日常生活動作などである。身体状況と日常生活動作は平成5～8年度と平成9年度以降で一部変更がある。平成26年度の「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」を「第Ⅲ部 資料」に付けた。

3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化した。CD4値のカテゴリーは200未満、200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。臨床・日常生活・治療の現状の集計（「4. 結果表の作

成方法」を参照)では、HIV-RNA量について、最近の検査法の検出限界50を考慮して、400未満を、検出せず、50未満と50～400未満に細分した。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし(投与歴なし)」と「投与なし(投与歴あり)」に区分した。投与ありについては、「NRTI1剤」、「NRTI2剤」、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」と「その他」に区分した。「NRTI2剤+PI1・2剤」とはNRTI2剤とPI1剤または2剤とした。「NRTI2剤+NNRTI」とはNRTI2剤とNNRTI1剤とした。「INSTI」とはインテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせとした。なお、コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

身体状況は食欲や疲れなどの項目からなり、平成5～8年度では11項目、平成9年度以降では13項目である。各項目は「とてもある」などから「全くない」などまでの5段階の選択肢であり、項目ごとに好ましい選択肢から順に「1」～「5」までのスコアを与えた。また、項目全体の総合スコアとして、項目全体の平均スコアを算出し、1～2未満、2～3未満、3～4未満、4～5の4カテゴリーまたは1～3未満とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、総合スコアのCronbachの α 係数は平成9年度第1期～第4期で0.90～0.91であり、高い内的整合性を示した。総合スコアの4カテゴリーは平成9年度第1期と第2期の κ 係数(抗HIV薬の併用区分に変化のない者451人)が0.80(重み付き κ 係数0.84)であり、高い再現性を示した。

日常生活動作は平成5～8年度では「無症状で、通常の活動が可能」から「過去1か月間、日中の半分以上、床上安静生活を行った」までの4段階の選択肢であり、平成9年度以降では「全く健康」から「重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある」までの8段階の選択肢である。好ましい選択肢の順に「1」からスコアを与え、1、2、3、4以上の4カテゴリーまたは1・2とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、この4カテゴリーは平成9年度第1期と第2期の κ 係数(抗HIV薬の併用区分に変化のない者420人)が0.87(重み付き κ 係数0.91)であり、高い再現性を示した。

4. 結果表の作成方法

本集計は7つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も7つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

(1) 臨床・日常生活・治療の現状

本集計は本事業対象者の臨床・日常生活・治療の現状把握を目指したものである。集計対象者は平成26年度第4期の事業対象者519人とした。基礎資料は同時点(最新)のものとし、抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量が未報告の場合、第1～3期の最も新しい時点に変更した(表3-4-1)。集計対象項目は基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、抗HIV薬の投与・服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬、眼底検査、体重、身体状況と日常生活動作のすべてを取り上げた。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した(表4-1-1～2)。CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した(表4-1-3～4)。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した(表4-1-5)。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した(表4-1-6)。抗HIV薬

の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。また、CD4値別に、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を集計した（表4-1-12～13）。

体重、身体状況、日常生活動作はCD4値別に基礎統計量を示した（表4-1-14）。身体状況と日常生活動作は年齢別の分布（表4-1-15～16）を示した。CD4値と抗HIV薬の併用区分別に、体重、身体状況と日常生活動作の分布（表4-1-17～19）を示した。CD4値別または抗HIV薬の併用区分別に、身体状況の各項目を集計した（表4-1-20～21）。疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、高血圧・糖尿病）を集計した（表4-1-22）。

（2）臨床（肝炎関連）の現状と推移

本集計は本事業対象者の臨床（肝炎関連）の現状と推移の把握を目指したものである。現状の把握では、集計対象者は平成26年度第4期の事業対象者とし、基礎資料は最新のもので「(1)」と同じとした。推移の把握では、集計対象者は平成17年第1期当初（平成17年4月1日）の事業対象者629人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。集計対象項目は肝炎の状況、肝炎ウイルス（HBs抗原、HCV抗体、HCV-RNA定性、HCV-RNA定量）、血小板数と総ビリルビン、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植、および、インターフェロン製剤等の現在の投与状況とし、それ以外にCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況などを取り上げた。

肝炎関連の現状として、肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-2-1～2）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-2-3）。肝炎の状況別に、HCV-RNA定量、血小板数、ALT(GPT)、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、AFP、クレアチニンの分布を示した（表4-2-4～12）。肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植歴、インターフェロン製剤等の現在の投与状況を示した（表4-2-13～15）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、抗HIV薬、身体状況、日常生活動作の分布を集計した（表4-2-15～21）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分を組み合わせ集計した（表4-2-22）。

肝炎関連の推移として、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-23）。観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況のそれぞれ別に、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-24～26）。

（3）臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本集計は各時点の本事業対象者の臨床・日常生活・治療状況の把握を目指したものである。集計対象者は各時点の事業対象者とし、各時点の基礎資料を用いた。結果表には平成5～22年度の各第1期と平成23～26年度の各四半期の結果を示した。CD4値、CD4/CD8比は各時点の分布と中央値を示した（表4-3-1～2）。身体状況は総合スコアの各時点の分布と割合（スコア1～3未満の割合）を示した（表4-3-3）。日常生活動作は各時点の分布と割合（スコア1と2の割合）を示した（表4-3-4）。また、HIV-RNA量は各時点（平成9年度以降）の分布と中央値を示した（表4-3-5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-3-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は各時点（平成9年度以降）の分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-3-7～8）。

この集計では、各時点の事業対象者に入出りがあることに注意を要する。また、身体状況と日常生活動作では平成5～8年度と平成9年度以降で調査内容が異なる。

(4) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は平成5年度第4期当初（平成6年1月1日時点）の事業対象者417人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には平成5年度第4期、平成6～22年度の各第1期と平成23～26年度の各四半期の結果を示した。なお、観察開始を平成5年度第4期としたのは、より長い期間の推移を観察することを目指し、事業対象者がある程度の人数になった時点を選んだものである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-4-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-4-7～8）。HIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用は平成9年度以降である。

本集計対象者にはAIDS発病・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、AIDS発病・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。AIDS発病・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。AIDS発病・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。AIDS発病・死亡の割合は、測定値の不明者を除くと、平成15年度以降では40％程度以上と大きいことから、中央値と割合の精度が高くないことに注意を要する。なお、集計対象者および中央値の計算方法が異なる以外は「(3)」の集計方法と同じである。

(5) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は平成9年度第1期当初（平成9年4月1日時点）の事業対象者605人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には平成9～22年度の各第1期と平成23～26年度の各四半期の結果を示した。平成9年度第1期としたのは、その時点で調査項目の大幅な変更（HIV-RNA量などの追加、身体状況などの項目の変更）があったためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-5-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-5-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-5-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。一方、AIDS発病・死亡の割合は平成26年度第4期でも40％程度であることから、「(4)」と異なり、AIDS発病・死亡を含めた場合の中央値と割合の精度はそれほど低くない。

(6) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本集計は、同一集団の臨床・日常生活・治療状況について、最近の推移把握を目指したものである。集計対象者は平成19年度第1期当初（平成19年4月1日時点）の事業対象者601人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。平成19年度第1期としたのは、最近の抗HIV治療の進展を考慮したためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-6-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-6-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-6-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」と「(5)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。

(7) 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本集計では、抗HIV薬の併用区分・併用薬剤の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連について検討を試みた。集計対象者は平成9年度第1期当初（平成9年4月1日時点）の事業対象者とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。

平成9年度第2期～26年度第4期までの時点ごとに、前の時点と当該時点の抗HIV薬の併用区分の組み合わせ別に該当する人数を集計した（表4-7-1）。また、平成9年度第2期～26年度第3期に生じた抗HIV薬の併用区分の変更状況別の延べ対象者について、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」のCD4値とHIV-RNA量の中央値を算定するとともに、「前の時点」と「後の時点」の間の差を符号付きWilcoxon検定により検定した（表4-7-2～3）。「前の時点」におけるCD4値が500未満の者、HIV-RNA量が400以上の者に限定した集計、および、3期間（平成9～13年度、平成14～18年度、平成19～26年度）別の集計も行った。同様に、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」における服用状況、副作用、身体状況、日常生活動作について集計した（表4-7-4～7）。なお、HIV-RNA量について、中央値の算定では、検出限界の検査結果は検出限界区間の半分の値（400未満では200、50未満では25など）とし、また、検出せずの検査結果は0とした。

集計対象について詳しく説明する。たとえば、平成9年度第2期において、抗HIV薬の併用区分が「NRTI2剤」であって、かつ、その前の時点（平成9年度第1期）のそれが「投与なし（投与歴あり）」であれば、抗HIV薬の併用区分の変更は「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に分類され、また、「前の時点」が平成9年度第1期、「その時点」が第2期、「後の時点」が第3期となる。本集計では「延べ対象者」と呼んでいるが、これは、たとえば「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」の者が「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に2人、「NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）」に1人と数えられるためである。なお、「NRTI2剤+PI1・2剤→NRTI2剤+PI1・2剤」の分類には前後の抗HIV薬の比較により「変更薬剤なし」、「変更薬剤1剤」と「変更薬剤2剤以上」の細分類も加えた。

5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第2章 結果の概要」と「第4章 結果表」に示した。これらの集計結果を見る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関わる注意点として、データの正確性と精度などがある。データの正確性としては、たとえば、データの記載間違い、データのコンピュータ媒体への入力段階での誤りなどの可能性がある。AIDSの診断には基準があるが、すべての例が完全にその基準に従っている保証はない。また、本事業対象者のAIDS発病・死亡がすべて把握されているとは限らない。なお、死亡原因、AIDS発病者のその後の死亡状況、および、死亡者の死亡時点でのAIDS発病状況は不明である。データの精度としては、たとえば、CD4値やHIV-RNA量などは四半期内の1回の測定によるものであり、測定精度が関係する。抗HIV薬の併用区分は「対象者用健康状態報告書」に記載された抗HIV薬の投与状況によって分類しているが、平成5～8年度と平成9年度以降では調査票の形式が異なる。投与歴の有無は、あくまでも、本事業対象者になった時点以降の抗HIV薬の投与状況に基づいており、それ以前の投与状況は考慮されていない。副作用は抗HIV薬に限

って調査したものではなく、その関係もあって「投与なし」にも副作用は若干存在する。身体状況と日常生活動作は先に述べた通り平成5～8年度と平成9年度以降では調査内容が異なることから、この2つの期間では厳密な比較ができない。HIV-RNA量の測定方法は年次とともに変更されてきたが、その違いによる測定値への影響を考慮していない。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表4-4-1～5、表4-5-1～5などでは、2通りの中央値または割合を示している。これはAIDS発病・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。さらに、治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連（表4-7-1～7）については、それ以外の表とは全く集計方法が異なるが、結果表を見る上では、その集計方法を十分に理解することが大切である（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

それ以外の注意点として、たとえば、表4-1-6にCD4値とHIV-RNA量別の抗HIV薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4値とHIV-RNA量によって抗HIV薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗HIV薬の併用によってCD4値とHIV-RNA量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗HIV薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況（集計対象者）

		全体	各期ごと			
			第1期	第2期	第3期	第4期
平成5年度	事業対象者数	453	385	384	415	438
	開始者数	453	385	0	35	33
	中止者数	23	1	4	10	8
平成6年度	事業対象者数	530	463	489	487	492
	開始者数	100	33	34	13	20
	中止者数	55	8	15	15	17
平成7年度	事業対象者数	552	490	498	496	510
	開始者数	77	15	20	16	26
	中止者数	50	12	18	12	8
平成8年度	事業対象者数	603	553	554	558	561
	開始者数	101	51	21	13	16
	中止者数	49	20	9	13	7
平成9年度	事業対象者数	667	621	633	642	654
	開始者数	113	67	16	15	15
	中止者数	18	4	6	3	5
平成10年度	事業対象者数	672	658	656	662	661
	開始者数	23	9	2	7	5
	中止者数	15	4	1	6	4
平成11年度	事業対象者数	682	666	667	674	676
	開始者数	25	9	3	8	5
	中止者数	9	2	1	3	3
平成12年度	事業対象者数	682	677	673	668	662
	開始者数	9	4	4	1	0
	中止者数	20	8	6	6	0
平成13年度	事業対象者数	670	666	664	663	662
	開始者数	8	4	1	3	0
	中止者数	9	3	4	1	1
平成14年度	事業対象者数	673	666	666	666	664
	開始者数	12	5	2	2	3
	中止者数	16	2	2	5	7
平成15年度	事業対象者数	663	662	661	657	652
	開始者数	6	5	1	0	0
	中止者数	20	2	4	5	9
平成16年度	事業対象者数	648	645	646	646	641
	開始者数	5	2	1	1	1
	中止者数	15	0	1	6	8
平成17年度	事業対象者数	634	633	628	625	620
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	18	5	3	6	4
平成18年度	事業対象者数	618	617	614	609	605
	開始者数	2	1	0	0	1
	中止者数	17	3	5	5	4
平成19年度	事業対象者数	603	601	598	593	586
	開始者数	2	0	0	1	1
	中止者数	18	3	6	8	1
平成20年度	事業対象者数	587	587	579	576	572
	開始者数	2	2	0	0	0
	中止者数	20	8	3	4	5
平成21年度	事業対象者数	567	567	566	564	561
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	8	1	2	3	2
平成22年度	事業対象者数	563	559	560	556	554
	開始者数	4	0	4	0	0
	中止者数	15	3	4	2	6
平成23年度	事業対象者数	548	548	547	546	543
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	1	1	3	2
平成24年度	事業対象者数	541	541	538	536	535
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	9	3	2	1	3
平成25年度	事業対象者数	534	532	532	529	529
	開始者数	2	0	1	0	1
	中止者数	9	1	3	1	4
平成26年度	事業対象者数	525	525	523	522	519
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	2	1	3	1

表3-4-1. 臨床・日常生活・治療の現状の平成26年度集計における基礎資料の時点

基礎資料の報告状況	集計に用いた時点					
	第1期	第2期	第3期	第4期	なし	計
1. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量の報告あり	0	5	64	437	—	506
2. 抗HIV薬、CD4値の報告あり	0	1	0	6	—	7
3. 抗HIV薬、HIV-RNA量の報告あり	0	1	0	2	—	3
4. 抗HIV薬の報告あり	0	0	0	1	—	1
5. CD4値、HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	1	—	1
6. CD4値の報告あり	0	0	0	0	—	0
7. HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
8. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量以外の報告あり	0	0	0	0	—	0
9. データなし	—	—	—	—	1	1
計	0	7	64	447	1	519

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状

本節では、以下の表を示した。

表4-1-1.	基礎疾患	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-2.	性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布	
表4-1-3.	年齢別、CD4値	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-4.	年齢別、HIV-RNA量	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-5.	CD4値別、HIV-RNA量	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-6.	CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-7.	抗HIV薬の併用区分別、服用状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-8.	抗HIV薬の併用区分別、副作用	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-9.	抗HIV薬の併用薬剤	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-10.	抗HIV薬別、服用状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-11.	抗HIV薬別、副作用	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-12.	CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-13.	CD4値別、眼底検査	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-14.	CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-15.	年齢別、身体状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-16.	年齢別、日常生活動作	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-17.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-18.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-19.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-20.	CD4値別、身体状況の各項目	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-21.	抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-1-22.	疾患の有無	(平成26年度第4期事業対象者)

表4-1-1. 基礎疾患（平成26年度第4期事業対象者）

基礎疾患	人数	(%)
血友病A	374	(72.1)
血友病B	112	(21.6)
von Willebrand 病	3	(0.6)
二次感染	20	(3.9)
三次感染	2	(0.4)
その他	8	(1.5)
計	519	

表4-1-2. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（平成26年度第4期事業対象者）

		人数	(%)			人数	(%)	
性別	男	493	(95.0)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	2	(0.4)	
	女	26	(5.0)		0.10～0.50 未満	78	(16.3)	
	計	519			0.50～1.00 未満	224	(46.7)	
年齢	0～10 歳未満	1	(0.2)	CD4/CD8 比	1.00～1.50 未満	114	(23.8)	
	10～20 歳未満	1	(0.2)		1.50 以上	62	(12.9)	
	20～30 歳未満	2	(0.4)		不明	39	—	
	30～40 歳未満	147	(28.3)		計	519		
	40～50 歳未満	240	(46.2)		平均値 0.921 （標準偏差 0.478） 中央値 0.835			
	50～60 歳未満	95	(18.3)		HIV-RNA 量	検出せず ^a	278	(54.2)
	60 歳以上	33	(6.4)			50 未満*	188	(36.6)
	計	519				50～400 未満	23	(4.4)
	平均値 44.6 歳 （標準偏差 8.6 歳） 中央値 43.0 歳					400～1000 未満	7	(1.3)
CD4 値	～200 未満	39	(7.6)	1000～5000 未満		13	(2.5)	
	200～350 未満	81	(15.8)	5000～10000 未満		3	(0.6)	
	350～500 未満	133	(25.9)	10000～50000 未満		4	(0.8)	
	500 以上	261	(50.8)	50000 以上		1	(0.2)	
	不明	5	—	不明		6	—	
	計	519		計	519			
	平均値 523.6 （標準偏差 250.0） 中央値 506.0			中央値 検出せず ^a				

()：計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表4-1-3. 年齢別、CD4値（平成26年度第4期事業対象者）

年齢	CD4 値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
20～30歳未満	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
30～40歳未満	11 (7.6)	18 (12.4)	41 (28.3)	75 (51.7)	2	147
40～50歳未満	18 (7.6)	36 (15.1)	64 (26.9)	120 (50.4)	2	240
50歳以上	8 (6.3)	27 (21.3)	28 (22.0)	64 (50.4)	1	128
計	39 (7.6)	81 (15.8)	133 (26.0)	259 (50.6)	5	517

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-4. 年齢別、HIV-RNA量（平成26年度第4期事業対象者）

年齢	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
20～30歳未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
30～40歳未満	126 (87.5)	8 (5.6)	1 (0.7)	6 (4.2)	3 (2.1)	3	147
40～50歳未満	217 (91.2)	8 (3.4)	3 (1.3)	8 (3.4)	2 (0.8)	2	240
50歳以上	120 (94.5)	5 (3.9)	1 (0.8)	1 (0.8)	0 (0.0)	1	128
計	464 (90.8)	21 (4.1)	5 (1.0)	16 (3.1)	5 (1.0)	6	517

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-5. CD4値別、HIV-RNA量（平成26年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満†	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	31 (79.5)	4 (10.3)	1 (2.6)	1 (2.6)	2 (5.1)	0	39
200～350未満	73 (90.1)	3 (3.7)	1 (1.2)	3 (3.7)	1 (1.2)	0	81
350～500未満	122 (93.1)	3 (2.3)	1 (0.8)	5 (3.8)	0 (0.0)	2	133
500以上	239 (92.3)	9 (3.5)	2 (0.8)	7 (2.7)	2 (0.8)	2	261
不明	1 —	2 —	0 —	0 —	0 —	2	5
計	466 (90.8)	21 (4.1)	5 (1.0)	16 (3.1)	5 (1.0)	6	519

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-6. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成26年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.5)	5 (16.1)	21 (67.7)	3 (9.7)	0	31
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	1000～10000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000 以上	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (2.6)	4 (10.3)	5 (12.8)	25 (64.1)	4 (10.3)	0	39
200 ～350未満	50 未満*	2 (2.7)	1 (1.4)	9 (12.3)	9 (12.3)	47 (64.4)	5 (6.8)	0	73
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0	3
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (4.9)	2 (2.5)	10 (12.3)	9 (11.1)	50 (61.7)	6 (7.4)	0	81
350 ～500未満	50 未満*	2 (1.7)	1 (0.8)	24 (19.8)	13 (10.7)	69 (57.0)	12 (9.9)	1	122
	50～400 未満†	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0	3
	400～1000 未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	計	7 (5.3)	2 (1.5)	26 (19.7)	14 (10.6)	70 (53.0)	13 (9.8)	1	133
500以上	50 未満*	2 (0.8)	1 (0.4)	38 (15.9)	42 (17.6)	141 (59.0)	15 (6.3)	0	239
	50～400 未満†	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	4 (44.4)	0 (0.0)	0	9
	400～1000 未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0	2
	1000～10000 未満	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0	7
	10000 以上	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0	0	1	0	1	0	0	2
	計	11 (4.2)	3 (1.1)	40 (15.3)	42 (16.1)	148 (56.7)	17 (6.5)	0	261
不明	50 未満*	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400 未満†	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	1	0	0	0	1	2
	計	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5
計	50 未満*	7 (1.5)	3 (0.6)	73 (15.7)	69 (14.8)	278 (59.8)	35 (7.5)	1	466
	50～400 未満†	5 (23.8)	1 (4.8)	3 (14.3)	0 (0.0)	10 (47.6)	2 (9.5)	0	21
	400～1000 未満	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0	5
	1000～10000 未満	9 (56.3)	3 (18.8)	1 (6.3)	0 (0.0)	2 (12.5)	1 (6.3)	0	16
	10000 以上	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0	5
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1	6
	計	24 (4.6)	8 (1.5)	81 (15.7)	70 (13.5)	294 (56.9)	40 (7.7)	2	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（平成26年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	76 (93.8)	5 (6.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	81
NRTI 2剤+NNRTI	69 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	70
INSTI	282 (96.6)	8 (2.7)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	294
その他	39 (97.5)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	40
計	466 (96.7)	14 (2.9)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	485

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成26年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	15 (19.5)	62 (80.5)	4	115
NRTI 2剤+NNRTI	11 (16.2)	57 (83.8)	2	88
INSTI	40 (13.9)	247 (86.1)	7	234
その他	6 (15.0)	34 (85.0)	0	51
計	72 (15.3)	400 (84.7)	13	488

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (1.3)	5 (6.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	1 (1.5)	3 (4.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)
INSTI	5 (1.7)	4 (1.4)	1 (0.3)	1 (0.3)	3 (1.0)	5 (1.7)
その他	0 (0.0)	3 (7.5)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	7 (1.5)	15 (3.2)	4 (0.8)	1 (0.2)	4 (0.8)	6 (1.3)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボストロフィー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	2 (2.6)	3 (3.9)	3 (3.9)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.4)	7 (10.3)	0 (0.0)	2 (2.9)
INSTI	3 (1.0)	2 (0.7)	6 (2.1)	21 (7.3)	2 (0.7)	8 (2.8)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.0)	2 (5.0)	1 (2.5)	1 (2.5)
計	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	32 (6.8)	6 (1.3)	14 (3.0)

(): 投与者数より不明を除いた数にしろる%

表4-1-9. 抗HIV薬の併用薬剤（平成26年度第4期事業対象者）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	NRTI 2 剤+NNRTI	件数
TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 16 例)	16 (19.8)	TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 27 例)	29 (41.4)
3TC+ABC +RTV+DRV (エブリコム服用 9 例)	10 (12.3)	TDF+FTC +RPV (ツルバダ服用 9 例)	9 (12.9)
TDF+FTC +RTV+ATV (ツルバダ服用 8 例)	8 (9.9)	3TC+ABC +RPV (エブリコム服用 7 例)	8 (11.4)
3TC+ABC +RTV+LPV (エブリコム服用 3 例)	5 (6.2)	3TC+ABC +EFV (エブリコム服用 5 例)	7 (10.0)
3TC+ABC +ATV (エブリコム服用 4 例)	4 (4.9)	3TC+ABC +NPV (エブリコム服用 4 例)	4 (5.7)
TDF+FTC +RTV+LPV (ツルバダ服用 4 例)	4 (4.9)	3TC+ABC +EFV (コンビビル服用 2 例)	4 (5.7)
TDF+FTC + ATV (ツルバダ服用 3 例)	3 (3.7)	AZT+3TC +NVP	3 (4.3)
TDF+FTC +DRV (ツルバダ服用 3 例)	3 (3.7)	3TC+ABC +ETR (エブリコム服用 2 例)	2 (2.9)
3TC+ABC +RTV+ATV (エブリコム服用 2 例)	2 (2.5)	3TC+ABC +ETR (エブリコム服用 2 例)	2 (2.3)
3TC+ABC +RTV+FPV (エブリコム服用 2 例)	2 (2.5)	3TC+TDF +EFV	2 (2.9)
3TC+TDF +FPV	2 (2.5)	3TC+d4T +EFV	2 (2.9)
3TC+TDF +RTV+FPV	2 (2.5)	計 (10 通り)	70 (100.0)
AZT+3TC +NVP	2 (2.5)	INSTI	件数
AZT+3TC +RTV+LPV (コンビビル服用 1 例)	2 (2.5)	TDF+FTC +RAL (ツルバダ服用 71 例)	71 (24.1)
TDF+FTC +RTV+LPV (ツルバダ服用 2 例)	2 (2.5)	3TC+ABC +RAL (エブリコム服用 43 例)	51 (17.3)
3TC+ABC + SQV+RTV (エブリコム服用 1 例)	1 (1.2)	TDF+FTC +DTG (ツルバダ服用 42 例)	42 (14.3)
3TC+TDF +ATV	1 (1.2)	3TC+ABC +DTG (エブリコム服用 27 例)	29 (9.9)
3TC+TDF + RTV+FPV	1 (1.2)	ETR +RAL	8 (2.7)
3TC+d4T +NVP	1 (1.2)	RTV+DRV +RAL	8 (2.7)
3TC+d4T +SQV+RTV	1 (1.2)	TDF+FTC +EVG+COBI	8 (2.7)
ABC+TDF +RTV+ATV	1 (1.2)	AZT+3TC +RAL (コンビビル服用 2 例)	4 (1.4)
ABC+TDF +RTV+LPV	1 (1.2)	RTV+DRV +ETR +RAL	4 (1.4)
AZT+3TC +ATV	1 (1.2)	TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 4 例)	4 (1.4)
AZT+3TC +FPV	1 (1.2)	3TC +ETR +RAL	3 (1.0)
AZT+3TC +RTV	1 (1.2)	3TC +RTV+DRV +RAL	3 (1.0)
AZT+3TC +RTV+FPV	1 (1.2)	3TC+TDF +RAL	3 (1.0)
TDF+FTC + FPV (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.2)	TDF +ETR +RAL	3 (1.0)
TDF+FTC +SQV+RTV (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.2)	TDF+FTC +ETR +RAL (ツルバダ服用 3 例)	3 (1.0)
ddl+ABC +RTV+LPV	1 (1.2)	TDF+FTC +RPV +DTG (ツルバダ服用 3 例)	3 (1.0)
計 (29 通り)	81 (100.0)	(次ページへ続く)	

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-9 (続き)。抗HIV薬の併用薬剤 (平成26年度第4期事業対象者)

INSTI (続き)	件数	INSTI (続き)	件数
3TC +RPV +RAL	2 (0.7)	TDF+FTC +RTV+DRV +RPV +DTG (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)
3TC+ABC +RTV+DRV +RAL (エブジコム服用 2例)	2 (0.7)	TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)
ABC +TDF +RAL	2 (0.7)	d4T+TDF+FTC +EVG+COBI	1 (0.3)
ETR +RAL +MVC	2 (0.7)	計 (47 通り)	294 (100.0)
RPV +RAL	2 (0.7)	その他	件数
RTV+LPV +RAL	2 (0.7)	AZT+3TC (コンビビル服用 1例)	6 (15.0)
TDF +RAL	2 (0.7)	TDF+FTC (ツルバダ服用 1例)	2 (5.0)
TDF+FTC +RAL +MVC (ツルバダ服用 2例)	2 (0.7)	ABC+TDF	1 (2.5)
3TC+ABC +DRV +RAL (エブジコム服用 1例)	1 (0.3)	AZT+d4T	1 (2.5)
3TC+ABC +ETR +RAL (エブジコム服用 1例)	1 (0.3)	RTV+DRV +MVC	2 (5.0)
3TC+ABC +RAL +MVC (エブジコム服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +MVC (ツルバダ服用 2例)	2 (5.0)
3TC+ABC+TDF +RAL (エブジコム服用 1例)	1 (0.3)	3TC +ETR +MVC	1 (2.5)
ABC +EFV +RAL	1 (0.3)	3TC +RTV+DRV +MVC	1 (2.5)
ABC +RAL	1 (0.3)	DRV +MVC	1 (2.5)
ABC+FTC +RAL	1 (0.3)	TDF+FTC +ETR +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
ABC+TDF +DTG	1 (0.3)	3TC +NFV	3 (7.5)
AZT +ETR +RAL	1 (0.3)	3TC +RTV+DRV	1 (2.5)
AZT+3TC +DTG	1 (0.3)	3TC +RTV+LPV +ETR	1 (2.5)
AZT+3TC +ETR +RAL	1 (0.3)	3TC+ABC +RTV+DRV +ETR (エブジコム服用 1例)	1 (2.5)
AZT+3TC+ABC +RAL (コンビビル服用 1例)	1 (0.3)	3TC+ABC +RTV+LPV +EFV (エブジコム服用 1例)	1 (2.5)
AZT+3TC+TDF+FTC +NFV +DTG (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	ABC +RTV+LPV	1 (2.5)
AZT+ddi+3TC +SQV +DTG (コンビビル服用 1例)	1 (0.3)	ABC+TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
DRV +ETR +RAL	1 (0.3)	AZT+3TC+TDF +RTV+LPV (コンビビル服用 1例)	1 (2.5)
EFV +RAL	1 (0.3)	RTV+DRV +RPV	1 (2.5)
FTC +RAL	1 (0.3)	RTV+LPV	1 (2.5)
RPV +DTG	1 (0.3)	RTV+LPV+EFV	1 (2.5)
RTV+DRV +EFV +RAL	1 (0.3)	TDF +RTV+ATV +EFV	1 (2.5)
RTV+DRV +RAL +MVC	1 (0.3)	TDF +RTV+ATV +RPV	1 (2.5)
SQV+RTV +RAL	1 (0.3)	TDF +RTV+LPV+DRV	1 (2.5)
TDF+FTC +EFV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +DRV +RPV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
TDF+FTC +ETR +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +NFV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
TDF+FTC +FPV +DTG (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +RTV+DRV +RPV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
TDF+FTC +FPV +RPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +RTV+FPV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
TDF+FTC +RTV +ATV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +RTV+LPV +DRV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.5)
TDF+FTC +RTV+DRV +ETR +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	d4T +RTV+LPV +NVP	1 (2.5)
TDF+FTC +RTV+DRV +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	計 (30 通り)	40 (100.0)

() : 各併用区分の計を分母とする%

(右上へ続く)

表4-1-10. 抗 HIV 薬別、服用状況（平成26年度第4期事業対象者）

抗 HIV 薬	服 用 状 況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
AZT	24 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	24
ddl	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
3TC	67 (98.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	68
d4T	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
AZT/3TC	8 (88.9)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
ABC	29 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	29
TDF	29 (96.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	30
3TC/ABC	114 (97.4)	3 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	117
FTC	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
TDF/FTC	210 (95.9)	7 (3.2)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	222
IDV	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
SQV	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
RTV	80 (95.2)	4 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	85
NFV	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
LPV	25 (92.6)	2 (7.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	27
ATV	22 (95.7)	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	23
FPV	13 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	13
DRV	64 (95.5)	3 (4.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	68
NVP	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
EFV	53 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	54
DLV	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
ETR	34 (97.1)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	35
RPV	31 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	31
RAL	197 (97.0)	4 (2.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	204
STB	8 (88.9)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
DTG	77 (96.3)	3 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	81
MVC	13 (86.7)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	16

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-11. 抗HIV薬別、副作用（平成26年度第4期事業対象者）

抗HIV薬	副作用			投与者数	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
AZT	7 (31.8)	15 (68.2)	2	24	0 (0.0)	2 (9.1)	1 (4.5)	0 (0.0)
ddl	0 (0.0)	2 (100.0)	0	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	16 (25.0)	48 (75.0)	4	68	1 (1.6)	4 (6.3)	1 (1.6)	1 (1.6)
d4T	1 (14.3)	6 (85.7)	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	2 (22.2)	7 (77.8)	0	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	4 (14.3)	24 (85.7)	1	29	0 (0.0)	1 (3.6)	0 (0.0)	1 (3.6)
TDF	4 (13.8)	25 (86.2)	1	30	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC/ABC	18 (15.8)	96 (84.2)	3	117	3 (2.6)	4 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
FTC	0 (0.0)	5 (100.0)	0	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	25 (11.6)	191 (88.4)	6	222	3 (1.4)	3 (1.4)	2 (0.9)	0 (0.0)
IDV	—	—	—	0	—	—	—	—
SQV	0 (0.0)	5 (100.0)	0	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	17 (20.5)	66 (79.5)	2	85	1 (1.2)	1 (1.2)	1 (1.2)	0 (0.0)
NFV	2 (25.0)	6 (75.0)	0	8	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	6 (24.0)	19 (76.0)	2	27	0 (0.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	0 (0.0)
ATV	6 (26.1)	17 (73.9)	0	23	0 (0.0)	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
FPV	1 (8.3)	11 (91.7)	1	13	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV	14 (21.2)	52 (78.8)	2	68	1 (1.5)	2 (3.0)	1 (1.5)	0 (0.0)
NVP	2 (25.0)	6 (75.0)	0	8	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)
EFV	8 (15.4)	44 (84.6)	2	54	0 (0.0)	2 (3.8)	1 (1.9)	0 (0.0)
DLV	—	—	—	0	—	—	—	—
ETR	6 (17.1)	29 (82.9)	0	35	1 (2.9)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV	5 (16.1)	26 (83.9)	0	31	1 (3.2)	2 (6.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
RAL	28 (14.0)	172 (86.0)	4	204	3 (1.5)	4 (2.0)	1 (0.5)	1 (0.5)
STB	1 (11.1)	8 (88.9)	0	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DTG	11 (14.1)	67 (85.9)	3	81	2 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
MVC	3 (18.8)	13 (81.3)	0	16	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

抗HIV薬	副作用（項目別）							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボストロフィー	黄疸	その他
AZT	0 (0.0)	1 (4.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)	1 (4.5)	1 (4.5)
ddl	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	2 (3.1)	3 (4.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (12.5)	2 (3.1)	3 (4.7)
d4T	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	1 (11.1)
ABC	2 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.7)	0 (0.0)	1 (3.6)
TDF	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.9)	1 (3.4)	0 (0.0)
3TC/ABC	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	2 (1.8)	4 (3.5)	8 (7.0)	2 (1.8)	2 (1.8)
FTC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	1 (0.5)	1 (0.5)	3 (1.4)	1 (0.5)	3 (1.4)	11 (5.1)	1 (0.5)	5 (2.3)
IDV	—	—	—	—	—	—	—	—
SQV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.6)	6 (7.2)	4 (4.8)	4 (4.8)
NFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ATV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.3)	4 (17.4)	0 (0.0)
FPV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)
DRV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.5)	6 (9.1)	1 (1.5)	3 (4.5)
NVP	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)
EFV	0 (0.0)	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.8)	7 (13.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
DLV	—	—	—	—	—	—	—	—
ETR	0 (0.0)	3 (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (11.4)	0 (0.0)	2 (5.7)
RPV	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.5)	2 (6.5)	1 (3.2)	1 (3.2)
RAL	2 (1.0)	4 (2.0)	2 (1.0)	1 (0.5)	5 (2.5)	16 (8.0)	1 (0.5)	6 (3.0)
STB	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)
DTG	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)
MVC	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-12. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬（平成26年度第4期事業対象者）

CD4 値	ニューモシスチス肺炎予防薬						計
	あり	ニューモシスチス肺炎予防薬の種類			なし	不明	
		ST 合剤	ペンタミジン吸入	ペンタミジン点滴			
～200未満	10 (28.6)	7 (20.0)	2 (5.7)	1 (2.9)	25 (71.4)	4	39
200～350未満	3 (3.7)	2 (2.5)	1 (1.2)	0 (0.0)	78 (96.3)	0	81
350～500未満	2 (1.5)	1 (0.8)	1 (0.8)	0 (0.0)	131 (98.5)	0	133
500以上	3 (1.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	256 (98.8)	2	261
不明	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	1	5
計	19 (3.7)	13 (2.5)	5 (1.0)	2 (0.4)	493 (96.3)	7	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-13. CD4値別、眼底検査（平成26年度第4期事業対象者）

CD4 値	眼底検査			計
	あり	なし	不明	
～200未満	0 (0.0)	37 (100.0)	2	39
200～350未満	3 (3.7)	78 (96.3)	0	81
350～500未満	3 (2.3)	130 (97.7)	0	133
500以上	5 (1.9)	254 (98.1)	2	261
不明	0 (0.0)	4 (100.0)	1	5
計	11 (2.1)	503 (97.9)	5	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-14. CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量（平成26年度第4期事業対象者）

	CD4 値	人 数	平 均	標準偏差
体重*	～200 未満	36	61.7	10.9
	200～350 未満	74	59.2	8.9
	350～500 未満	126	60.7	10.1
	500 以上	247	62.3	10.2
	不明	3	60.1	12.6
	全体	486	61.3	10.0
身体状況の総合スコア	～200 未満	37	2.7	0.8
	200～350 未満	79	2.6	0.9
	350～500 未満	132	2.6	0.9
	500 以上	258	2.5	0.8
	不明	4	2.8	1.2
	全体	510	2.6	0.9
日常生活動作	～200 未満	37	3.3	1.4
	200～350 未満	78	2.9	1.6
	350～500 未満	131	2.7	1.4
	500 以上	255	2.5	1.4
	不明	3	3.3	3.2
	全体	504	2.7	1.5

* 体重の集計対象：20 歳以上男性

表4-1-15. 年齢別、身体状況の総合スコア（平成26年度第4期事業対象者）

年齢	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
20～30 歳未満	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)
30～40 歳未満	47 (32.9)	52 (36.4)	37 (25.9)	7 (4.9)	4	147	99 (69.2)
40～50 歳未満	65 (27.4)	80 (33.8)	83 (35.0)	9 (3.8)	3	240	145 (61.2)
50 歳以上	28 (22.2)	45 (35.7)	48 (38.1)	5 (4.0)	2	128	73 (57.9)
計	140 (27.6)	178 (35.0)	169 (33.3)	21 (4.1)	9	517	318 (62.6)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-16. 年齢別、日常生活動作（平成26年度第4期事業対象者）

年齢	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
20～30 歳未満	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)
30～40 歳未満	36 (26.1)	41 (29.7)	34 (24.6)	27 (19.6)	9	147	77 (55.8)
40～50 歳未満	67 (28.4)	66 (28.0)	55 (23.3)	48 (20.3)	4	240	133 (56.4)
50 歳以上	23 (18.1)	25 (19.7)	29 (22.8)	50 (39.4)	1	128	48 (37.8)
計	127 (25.2)	132 (26.2)	119 (23.7)	125 (24.9)	14	517	259 (51.5)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-17. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重（平成26年度第4期事業対象者）

CD4値	抗HIV薬の併用区分	体重							計
		～40未満	40～ 50未満	50～ 60未満	60～ 70未満	70～ 80未満	80以上	不明	
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0	—	0	—	0	—	0	0
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	—	1	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0	5
	INSTI	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (47.8)	8 (34.8)	3 (13.0)	1 (4.3)	0	23
	その他	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0	4
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	1 (2.8)	2 (5.6)	15 (41.7)	9 (25.0)	7 (19.4)	2 (5.6)	1	37
200 ～350未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (50.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0	10
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (37.5)	5 (62.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
	INSTI	0 (0.0)	7 (15.6)	17 (37.8)	16 (35.6)	5 (11.1)	0 (0.0)	2	47
	その他	1 (16.7)	0 (0.0)	2 (33.3)	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	6
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	1 (1.4)	8 (10.8)	29 (39.2)	29 (39.2)	5 (6.8)	2 (2.7)	2	76
350 ～500未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0	2
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (4.0)	13 (52.0)	9 (36.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0	25
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (8.3)	1 (8.3)	3 (25.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0	12
	INSTI	0 (0.0)	7 (10.4)	26 (38.8)	21 (31.3)	10 (14.9)	3 (4.5)	0	67
	その他	0 (0.0)	1 (8.3)	5 (41.7)	5 (41.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	0	12
	不明	0	—	0	—	0	—	0	1
	計	1 (0.8)	10 (7.9)	50 (39.7)	46 (36.5)	14 (11.1)	5 (4.0)	0	126
500以上	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (36.4)	2 (18.2)	4 (36.4)	1 (9.1)	0	11
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	5 (13.5)	14 (37.8)	13 (35.1)	4 (10.8)	1 (2.7)	1	38
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	1 (2.5)	15 (37.5)	14 (35.0)	5 (12.5)	5 (12.5)	0	40
	INSTI	0 (0.0)	13 (9.2)	48 (34.0)	56 (39.7)	19 (13.5)	5 (3.5)	1	142
	その他	0 (0.0)	1 (6.3)	7 (43.8)	5 (31.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	0	16
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	0 (0.0)	20 (8.1)	89 (36.0)	90 (36.4)	35 (14.2)	13 (5.3)	2	249
不明	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1	2
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	—	0	0
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	NRTI 2剤+NNRTI	0	—	0	—	0	—	0	0
	INSTI	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	その他	0	—	0	—	0	—	0	0
	不明	0	—	0	—	0	—	1	1
	計	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2	5
計	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	1 (4.3)	9 (39.1)	7 (30.4)	5 (21.7)	1 (4.3)	1	24
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1	6
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	8 (10.4)	33 (42.9)	26 (33.8)	8 (10.4)	2 (2.6)	1	78
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (1.5)	2 (3.1)	24 (36.9)	26 (40.0)	6 (9.2)	6 (9.2)	0	65
	INSTI	0 (0.0)	28 (10.1)	102 (36.8)	101 (36.5)	37 (13.4)	9 (3.2)	3	280
	その他	2 (5.3)	2 (5.3)	15 (39.5)	13 (34.2)	3 (7.9)	3 (7.9)	0	38
	不明	0	—	0	—	0	—	1	2
	計	3 (0.6)	41 (8.4)	184 (37.9)	174 (35.8)	62 (12.8)	22 (4.5)	7	493

対象：20歳以上男性

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-18. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況（平成26年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)		
		1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明				
～200 未満	投与なし（投与歴なし）	0	—	0	—	0	0	0	—	
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	1	1	0	—
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0	4	1 (25.0)		
	NRTI 2剤+NNRTI	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0	5	4 (80.0)		
	INSTI	6 (25.0)	10 (41.7)	7 (29.2)	1 (4.2)	1	25	16 (66.7)		
	その他	1 (25.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0	4	1 (25.0)		
	不明	0	—	0	—	0	0	0	—	
	計	9 (24.3)	13 (35.1)	14 (37.8)	1 (2.7)	2	39	22 (59.5)		
200 ～350 未満	投与なし（投与歴なし）	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4	4 (100.0)		
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)		
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (20.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	0	10	5 (50.0)		
	NRTI 2剤+NNRTI	2 (22.2)	4 (44.4)	2 (22.2)	1 (11.1)	0	9	6 (66.7)		
	INSTI	12 (25.0)	15 (31.3)	20 (41.7)	1 (2.1)	2	50	27 (56.3)		
	その他	2 (33.3)	1 (16.7)	3 (50.0)	0 (0.0)	0	6	3 (50.0)		
	不明	0	—	0	—	0	0	0	—	
	計	21 (26.6)	25 (31.6)	30 (38.0)	3 (3.8)	2	81	46 (58.2)		
350 ～500 未満	投与なし（投与歴なし）	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0	7	6 (85.7)		
	投与なし（投与歴あり）	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)		
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	5 (19.2)	9 (34.6)	10 (38.5)	2 (7.7)	0	26	14 (53.8)		
	NRTI 2剤+NNRTI	5 (35.7)	7 (50.0)	1 (7.1)	1 (7.1)	0	14	12 (85.7)		
	INSTI	19 (27.5)	27 (39.1)	18 (26.1)	5 (7.2)	1	70	46 (66.7)		
	その他	2 (15.4)	5 (38.5)	4 (30.8)	2 (15.4)	0	13	7 (53.8)		
	不明	0	—	1	—	0	1	0	—	
	計	37 (28.0)	50 (37.9)	35 (26.5)	10 (7.6)	1	133	87 (65.9)		
500 以上	投与なし（投与歴なし）	6 (54.5)	4 (36.4)	1 (9.1)	0 (0.0)	0	11	10 (90.9)		
	投与なし（投与歴あり）	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)		
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (23.7)	12 (31.6)	16 (42.1)	1 (2.6)	2	40	21 (55.3)		
	NRTI 2剤+NNRTI	8 (19.0)	16 (38.1)	17 (40.5)	1 (2.4)	0	42	24 (57.1)		
	INSTI	46 (31.1)	53 (35.8)	45 (30.4)	4 (2.7)	0	148	99 (66.9)		
	その他	3 (18.8)	5 (31.3)	7 (43.8)	1 (6.3)	1	17	8 (50.0)		
	不明	0	—	0	—	0	0	0	—	
	計	73 (28.3)	91 (35.3)	87 (33.7)	7 (2.7)	3	261	164 (63.6)		
不明	投与なし（投与歴なし）	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)		
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	0	0	—	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)		
	NRTI 2剤+NNRTI	0	—	0	—	0	0	0	—	
	INSTI	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)		
	その他	0	—	0	—	0	0	0	—	
	不明	0	—	0	—	1	1	0	—	
	計	1 (25.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)		
計	投与なし（投与歴なし）	14 (58.3)	7 (29.2)	3 (12.5)	0 (0.0)	0	24	21 (87.5)		
	投与なし（投与歴あり）	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	1	8	5 (71.4)		
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	16 (20.3)	25 (31.6)	34 (43.0)	4 (5.1)	2	81	41 (51.9)		
	NRTI 2剤+NNRTI	17 (24.3)	29 (41.4)	21 (30.0)	3 (4.3)	0	70	46 (65.7)		
	INSTI	83 (28.6)	105 (36.2)	91 (31.4)	11 (3.8)	4	294	188 (64.8)		
	その他	8 (20.5)	11 (28.2)	17 (43.6)	3 (7.7)	1	40	19 (48.7)		
	不明	0	—	1	—	1	2	0	—	
	計	141 (27.6)	179 (35.1)	169 (33.1)	21 (4.1)	9	519	320 (62.7)		

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-19. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作（平成26年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4 (4~8)	不明		
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0	—	0	—	0	0	0
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	1	1	0
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	0	4	0 (0.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	0	5	2 (40.0)
	INSTI	2 (8.3)	7 (29.2)	3 (12.5)	12 (50.0)	1	25	9 (37.5)
	その他	0 (0.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0	4	1 (25.0)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	3 (8.1)	9 (24.3)	8 (21.6)	17 (45.9)	2	39	12 (32.4)
200 ～350未満	投与なし（投与歴なし）	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0	4	3 (75.0)
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0	2	0 (0.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (20.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0	10	5 (50.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	5 (55.6)	0	9	3 (33.3)
	INSTI	12 (25.5)	7 (14.9)	13 (27.7)	15 (31.9)	3	50	19 (40.4)
	その他	3 (50.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	1 (16.7)	0	6	3 (50.0)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	19 (24.4)	14 (17.9)	21 (26.9)	24 (30.8)	3	81	33 (42.3)
350 ～500未満	投与なし（投与歴なし）	4 (57.1)	1 (14.3)	2 (28.6)	0 (0.0)	0	7	5 (71.4)
	投与なし（投与歴あり）	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	7 (28.0)	5 (20.0)	10 (40.0)	3 (12.0)	1	26	12 (48.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	3 (21.4)	5 (35.7)	4 (28.6)	2 (14.3)	0	14	8 (57.1)
	INSTI	10 (14.5)	24 (34.8)	14 (20.3)	21 (30.4)	1	70	34 (49.3)
	その他	4 (30.8)	0 (0.0)	5 (38.5)	4 (30.8)	0	13	4 (30.8)
	不明	0	—	1	—	0	1	0
	計	30 (22.9)	35 (26.7)	36 (27.5)	30 (22.9)	2	133	65 (49.6)
500以上	投与なし（投与歴なし）	5 (45.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	0	11	7 (63.6)
	投与なし（投与歴あり）	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (20.0)	15 (37.5)	12 (30.0)	5 (12.5)	0	40	23 (57.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	11 (26.2)	11 (26.2)	8 (19.0)	12 (28.6)	0	42	22 (52.4)
	INSTI	44 (30.6)	41 (28.5)	26 (18.1)	33 (22.9)	4	148	85 (59.0)
	その他	4 (26.7)	5 (33.3)	5 (33.3)	1 (6.7)	2	17	9 (60.0)
	不明	0	—	0	—	0	0	0
	計	74 (29.0)	74 (29.0)	54 (21.2)	53 (20.8)	6	261	148 (58.0)
不明	投与なし（投与歴なし）	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0	2	1 (50.0)
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	0	0
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	0	—	0	—	0	0	0
	INSTI	0	—	0	—	1	1	0
	その他	0	—	0	—	0	0	0
	不明	0	—	0	—	1	1	0
	計	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	2	5	2 (66.7)
計	投与なし（投与歴なし）	11 (45.8)	5 (20.8)	4 (16.7)	4 (16.7)	0	24	16 (66.7)
	投与なし（投与歴あり）	4 (57.1)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	1	8	4 (57.1)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	17 (21.3)	24 (30.0)	27 (33.8)	12 (15.0)	1	81	41 (51.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	16 (22.9)	19 (27.1)	13 (18.6)	22 (31.4)	0	70	35 (50.0)
	INSTI	68 (23.9)	79 (27.8)	56 (19.7)	81 (28.5)	10	294	147 (51.8)
	その他	11 (28.9)	6 (15.8)	15 (39.5)	6 (15.8)	2	40	17 (44.7)
	不明	0	—	1	—	1	2	0
	計	127 (25.2)	133 (26.4)	119 (23.6)	125 (24.8)	15	519	260 (51.6)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20. CD4値別、身体状況の各項目（平成26年度第4期事業対象者）

身体状況の項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	～200未満	7 (18.4)	15 (39.5)	10 (26.3)	5 (13.2)	1 (2.6)	1	39	22 (57.9)
	200～350未満	19 (23.8)	33 (41.3)	22 (27.5)	6 (7.5)	0 (0.0)	1	81	52 (65.0)
	350～500未満	47 (35.3)	45 (33.8)	29 (21.8)	10 (7.5)	2 (1.5)	0	133	92 (69.2)
	500以上	95 (36.5)	96 (36.9)	55 (21.2)	14 (5.4)	0 (0.0)	1	261	191 (73.5)
	不明	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	5	2 (50.0)
	計	169 (32.8)	190 (36.9)	118 (22.9)	35 (6.8)	3 (0.6)	4	519	359 (69.7)
味覚	～200未満	16 (42.1)	10 (26.3)	7 (18.4)	5 (13.2)	0 (0.0)	1	39	26 (68.4)
	200～350未満	34 (42.5)	19 (23.8)	19 (23.8)	7 (8.8)	1 (1.3)	1	81	53 (66.3)
	350～500未満	61 (45.9)	27 (20.3)	35 (26.3)	6 (4.5)	4 (3.0)	0	133	88 (66.2)
	500以上	131 (50.4)	51 (19.6)	61 (23.5)	16 (6.2)	1 (0.4)	1	261	182 (70.0)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	243 (47.2)	107 (20.8)	124 (24.1)	35 (6.8)	6 (1.2)	4	519	350 (68.0)
口乾	～200未満	5 (13.2)	10 (26.3)	10 (26.3)	10 (26.3)	3 (7.9)	1	39	15 (39.5)
	200～350未満	18 (22.5)	11 (13.8)	17 (21.3)	24 (30.0)	10 (12.5)	1	81	29 (36.3)
	350～500未満	31 (23.3)	24 (18.0)	29 (21.8)	34 (25.6)	15 (11.3)	0	133	55 (41.4)
	500以上	64 (24.6)	50 (19.2)	59 (22.7)	63 (24.2)	24 (9.2)	1	261	114 (43.8)
	不明	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1	5	2 (50.0)
	計	119 (23.1)	96 (18.6)	115 (22.3)	133 (25.8)	52 (10.1)	4	519	215 (41.7)
口内炎・ 口の中の痛み	～200未満	14 (36.8)	7 (18.4)	10 (26.3)	6 (15.8)	1 (2.6)	1	39	21 (55.3)
	200～350未満	27 (33.8)	20 (25.0)	15 (18.8)	15 (18.8)	3 (3.8)	1	81	47 (58.8)
	350～500未満	46 (34.6)	29 (21.8)	26 (19.5)	26 (19.5)	6 (4.5)	0	133	75 (56.4)
	500以上	95 (36.5)	48 (18.5)	56 (21.5)	50 (19.2)	11 (4.2)	1	261	143 (55.0)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	183 (35.5)	104 (20.2)	109 (21.2)	98 (19.0)	21 (4.1)	4	519	287 (55.7)
下痢	～200未満	9 (23.7)	8 (21.1)	8 (21.1)	11 (28.9)	2 (5.3)	1	39	17 (44.7)
	200～350未満	14 (17.5)	20 (25.0)	15 (18.8)	21 (26.3)	10 (12.5)	1	81	34 (42.5)
	350～500未満	20 (15.0)	25 (18.8)	43 (32.3)	29 (21.8)	16 (12.0)	0	133	45 (33.8)
	500以上	52 (20.1)	54 (20.8)	63 (24.3)	62 (23.9)	28 (10.8)	2	261	106 (40.9)
	不明	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	5	2 (50.0)
	計	96 (18.7)	108 (21.0)	131 (25.5)	123 (23.9)	56 (10.9)	5	519	204 (39.7)
体重減少	～200未満	12 (31.6)	10 (26.3)	8 (21.1)	7 (18.4)	1 (2.6)	1	39	22 (57.9)
	200～350未満	27 (33.8)	15 (18.8)	29 (36.3)	7 (8.8)	2 (2.5)	1	81	42 (52.5)
	350～500未満	45 (33.8)	32 (24.1)	45 (33.8)	8 (6.0)	3 (2.3)	0	133	77 (57.9)
	500以上	103 (39.6)	59 (22.7)	71 (27.3)	23 (8.8)	4 (1.5)	1	261	162 (62.3)
	不明	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	5	2 (50.0)
	計	188 (36.5)	117 (22.7)	155 (30.1)	45 (8.7)	10 (1.9)	4	519	305 (59.2)
息切れ	～200未満	2 (5.3)	5 (13.2)	11 (28.9)	13 (34.2)	7 (18.4)	1	39	7 (18.4)
	200～350未満	16 (20.0)	12 (15.0)	22 (27.5)	22 (27.5)	8 (10.0)	1	81	28 (35.0)
	350～500未満	26 (19.7)	13 (9.8)	28 (21.2)	39 (29.5)	26 (19.7)	1	133	39 (29.5)
	500以上	51 (19.6)	37 (14.2)	67 (25.8)	74 (28.5)	31 (11.9)	1	261	88 (33.8)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	96 (18.7)	67 (13.0)	129 (25.1)	150 (29.2)	72 (14.0)	5	519	163 (31.7)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20 (続き). CD4値別、身体状況の各項目 (平成26年度第4期事業対象者)

身体状況の項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	～200未満	0 (0.0)	7 (18.9)	7 (18.9)	12 (32.4)	11 (29.7)	2	39	7 (18.9)
	200～350未満	10 (12.7)	9 (11.4)	20 (25.3)	21 (26.6)	19 (24.1)	2	81	19 (24.1)
	350～500未満	12 (9.0)	19 (14.3)	22 (16.5)	49 (36.8)	31 (23.3)	0	133	31 (23.3)
	500以上	28 (10.8)	30 (11.5)	59 (22.7)	89 (34.2)	54 (20.8)	1	261	58 (22.3)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	51 (9.9)	65 (12.7)	109 (21.2)	173 (33.7)	115 (22.4)	6	519	116 (22.6)
手足のしびれ・痛み	～200未満	11 (28.9)	5 (13.2)	8 (21.1)	11 (28.9)	3 (7.9)	1	39	16 (42.1)
	200～350未満	25 (31.3)	16 (20.0)	11 (13.8)	20 (25.0)	8 (10.0)	1	81	41 (51.3)
	350～500未満	43 (32.3)	26 (19.5)	27 (20.3)	26 (19.5)	11 (8.3)	0	133	69 (51.9)
	500以上	76 (29.2)	31 (11.9)	48 (18.5)	74 (28.5)	31 (11.9)	1	261	107 (41.2)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	156 (30.3)	78 (15.1)	94 (18.3)	134 (26.0)	53 (10.3)	4	519	234 (45.4)
37℃以上の発熱	～200未満	13 (34.2)	8 (21.1)	12 (31.6)	5 (13.2)	0 (0.0)	1	39	21 (55.3)
	200～350未満	33 (41.3)	21 (26.3)	17 (21.3)	7 (8.8)	2 (2.5)	1	81	54 (67.5)
	350～500未満	57 (42.9)	23 (17.3)	29 (21.8)	18 (13.5)	6 (4.5)	0	133	80 (60.2)
	500以上	101 (39.0)	57 (22.0)	59 (22.8)	36 (13.9)	6 (2.3)	2	261	158 (61.0)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	205 (39.9)	109 (21.2)	119 (23.2)	67 (13.0)	14 (2.7)	5	519	314 (61.1)
皮膚の湿疹・かゆみ・できもの	～200未満	7 (18.4)	6 (15.8)	6 (15.8)	11 (28.9)	8 (21.1)	1	39	13 (34.2)
	200～350未満	15 (18.8)	18 (22.5)	13 (16.3)	22 (27.5)	12 (15.0)	1	81	33 (41.3)
	350～500未満	29 (21.8)	25 (18.8)	19 (14.3)	40 (30.1)	20 (15.0)	0	133	54 (40.6)
	500以上	51 (19.6)	41 (15.8)	48 (18.5)	73 (28.1)	47 (18.1)	1	261	92 (35.4)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1	5	1 (25.0)
	計	103 (20.0)	90 (17.5)	87 (16.9)	147 (28.5)	88 (17.1)	4	519	193 (37.5)
視野	～200未満	16 (42.1)	6 (15.8)	10 (26.3)	5 (13.2)	1 (2.6)	1	39	22 (57.9)
	200～350未満	41 (51.3)	16 (20.0)	15 (18.8)	6 (7.5)	2 (2.5)	1	81	57 (71.3)
	350～500未満	68 (51.1)	22 (16.5)	31 (23.3)	10 (7.5)	2 (1.5)	0	133	90 (67.7)
	500以上	135 (51.9)	41 (15.8)	53 (20.4)	26 (10.0)	5 (1.9)	1	261	176 (67.7)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	261 (50.7)	85 (16.5)	111 (21.6)	48 (9.3)	10 (1.9)	4	519	346 (67.2)
睡眠	～200未満	11 (28.9)	5 (13.2)	11 (28.9)	10 (26.3)	1 (2.6)	1	39	16 (42.1)
	200～350未満	16 (20.0)	17 (21.3)	23 (28.8)	20 (25.0)	4 (5.0)	1	81	33 (41.3)
	350～500未満	33 (24.8)	23 (17.3)	39 (29.3)	29 (21.8)	9 (6.8)	0	133	56 (42.1)
	500以上	78 (30.0)	53 (20.4)	57 (21.9)	64 (24.6)	8 (3.1)	1	261	131 (50.4)
	不明	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1	5	1 (25.0)
	計	139 (27.0)	98 (19.0)	132 (25.6)	124 (24.1)	22 (4.3)	4	519	237 (46.0)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21. 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目（平成26年度第4期事業対象者）

身体状況の 項目	抗 HIV 薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	投与なし(投与歴なし)	16 (66.7)	5 (20.8)	3 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	24	21 (87.5)
	投与なし(投与歴あり)	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	1	8	5 (71.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	18 (22.2)	34 (42.0)	20 (24.7)	9 (11.1)	0 (0.0)	0	81	52 (64.2)
	NRTI 2剤+NNRTI	22 (31.4)	28 (40.0)	16 (22.9)	4 (5.7)	0 (0.0)	0	70	50 (71.4)
	INSTI	99 (33.8)	106 (36.2)	68 (23.2)	17 (5.8)	3 (1.0)	1	294	205 (70.0)
	その他	8 (20.5)	17 (43.6)	10 (25.6)	4 (10.3)	0 (0.0)	1	40	25 (64.1)
	不明	1	0	0	0	0	1	2	1
	計	169 (32.8)	190 (36.9)	118 (22.9)	35 (6.8)	3 (0.6)	4	519	359 (69.7)
味覚	投与なし(投与歴なし)	18 (75.0)	4 (16.7)	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	24	22 (91.7)
	投与なし(投与歴あり)	5 (71.4)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8	5 (71.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	31 (38.3)	23 (28.4)	20 (24.7)	6 (7.4)	1 (1.2)	0	81	54 (66.7)
	NRTI 2剤+NNRTI	36 (51.4)	13 (18.6)	14 (20.0)	6 (8.6)	1 (1.4)	0	70	49 (70.0)
	INSTI	140 (47.8)	56 (19.1)	72 (24.6)	22 (7.5)	3 (1.0)	1	294	196 (66.9)
	その他	13 (33.3)	11 (28.2)	13 (33.3)	1 (2.6)	1 (2.6)	1	40	24 (61.5)
	不明	0	0	1	0	0	1	2	0
	計	243 (47.2)	107 (20.8)	124 (24.1)	35 (6.8)	6 (1.2)	4	519	350 (68.0)
口乾	投与なし(投与歴なし)	13 (54.2)	4 (16.7)	2 (8.3)	3 (12.5)	2 (8.3)	0	24	17 (70.8)
	投与なし(投与歴あり)	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	2 (28.6)	1	8	3 (42.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	16 (19.8)	11 (13.6)	20 (24.7)	22 (27.2)	12 (14.8)	0	81	27 (33.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	14 (20.0)	14 (20.0)	16 (22.9)	18 (25.7)	8 (11.4)	0	70	28 (40.0)
	INSTI	63 (21.5)	60 (20.5)	71 (24.2)	74 (25.3)	25 (8.5)	1	294	123 (42.0)
	その他	10 (25.6)	7 (17.9)	6 (15.4)	13 (33.3)	3 (7.7)	1	40	17 (43.6)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	119 (23.1)	96 (18.6)	115 (22.3)	133 (25.8)	52 (10.1)	4	519	215 (41.7)
口内炎・ 口の中の痛み	投与なし(投与歴なし)	13 (54.2)	5 (20.8)	2 (8.3)	4 (16.7)	0 (0.0)	0	24	18 (75.0)
	投与なし(投与歴あり)	4 (57.1)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)	1	8	5 (71.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	25 (30.9)	15 (18.5)	20 (24.7)	17 (21.0)	4 (4.9)	0	81	40 (49.4)
	NRTI 2剤+NNRTI	24 (34.3)	19 (27.1)	13 (18.6)	11 (15.7)	3 (4.3)	0	70	43 (61.4)
	INSTI	109 (37.2)	54 (18.4)	63 (21.5)	56 (19.1)	11 (3.8)	1	294	163 (55.6)
	その他	8 (20.5)	10 (25.6)	10 (25.6)	9 (23.1)	2 (5.1)	1	40	18 (46.2)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	183 (35.5)	104 (20.2)	109 (21.2)	98 (19.0)	21 (4.1)	4	519	287 (55.7)
下痢	投与なし(投与歴なし)	10 (41.7)	7 (29.2)	4 (16.7)	2 (8.3)	1 (4.2)	0	24	17 (70.8)
	投与なし(投与歴あり)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	1	8	3 (42.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (11.3)	10 (12.5)	20 (25.0)	24 (30.0)	17 (21.3)	1	81	19 (23.8)
	NRTI 2剤+NNRTI	15 (21.4)	17 (24.3)	17 (24.3)	13 (18.6)	8 (11.4)	0	70	32 (45.7)
	INSTI	55 (18.8)	69 (23.5)	77 (26.3)	68 (23.2)	24 (8.2)	1	294	124 (42.3)
	その他	6 (15.4)	3 (7.7)	12 (30.8)	14 (35.9)	4 (10.3)	1	40	9 (23.1)
	不明	0	0	0	0	1	1	2	0
	計	96 (18.7)	108 (21.0)	131 (25.5)	123 (23.9)	56 (10.9)	5	519	204 (39.7)
体重減少	投与なし(投与歴なし)	13 (54.2)	8 (33.3)	3 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	24	21 (87.5)
	投与なし(投与歴あり)	6 (85.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	1	8	6 (85.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	23 (28.4)	14 (17.3)	33 (40.7)	10 (12.3)	1 (1.2)	0	81	37 (45.7)
	NRTI 2剤+NNRTI	31 (44.3)	13 (18.6)	21 (30.0)	3 (4.3)	2 (2.9)	0	70	44 (62.9)
	INSTI	105 (35.8)	73 (24.9)	83 (28.3)	25 (8.5)	7 (2.4)	1	294	178 (60.8)
	その他	10 (25.6)	9 (23.1)	14 (35.9)	6 (15.4)	0 (0.0)	1	40	19 (48.7)
	不明	0	0	1	0	0	1	2	0
	計	188 (36.5)	117 (22.7)	155 (30.1)	45 (8.7)	10 (1.9)	4	519	305 (59.2)
息切れ	投与なし(投与歴なし)	8 (33.3)	5 (20.8)	7 (29.2)	2 (8.3)	2 (8.3)	0	24	13 (54.2)
	投与なし(投与歴あり)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	1	8	3 (42.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	13 (16.0)	14 (17.3)	16 (19.8)	28 (34.6)	10 (12.3)	0	81	27 (33.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	12 (17.1)	11 (15.7)	17 (24.3)	18 (25.7)	12 (17.1)	0	70	23 (32.9)
	INSTI	53 (18.2)	32 (11.0)	84 (28.8)	83 (28.4)	40 (13.7)	2	294	85 (29.1)
	その他	7 (17.9)	5 (12.8)	4 (10.3)	16 (41.0)	7 (17.9)	1	40	12 (30.8)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	96 (18.7)	67 (13.0)	129 (25.1)	150 (29.2)	72 (14.0)	5	519	163 (31.7)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21 (続き). 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目 (平成26年度第4期事業対象者)

身体状況の項目	抗HIV薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	投与なし(投与歴なし)	6 (25.0)	4 (16.7)	7 (29.2)	4 (16.7)	3 (12.5)	0	24	10 (41.7)
	投与なし(投与歴あり)	2 (28.6)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	1	8	2 (28.6)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (11.1)	10 (12.3)	17 (21.0)	30 (37.0)	15 (18.5)	0	81	19 (23.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	7 (10.0)	14 (20.0)	10 (14.3)	21 (30.0)	18 (25.7)	0	70	21 (30.0)
	INSTI	22 (7.6)	32 (11.0)	69 (23.7)	102 (35.1)	66 (22.7)	3	294	54 (18.6)
	その他	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	14 (35.9)	10 (25.6)	1	40	10 (25.6)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	51 (9.9)	65 (12.7)	109 (21.2)	173 (33.7)	115 (22.4)	6	519	116 (22.6)
手足のしびれ・ 痛み	投与なし(投与歴なし)	14 (58.3)	0 (0.0)	1 (4.2)	6 (25.0)	3 (12.5)	0	24	14 (58.3)
	投与なし(投与歴あり)	3 (42.9)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	1	8	3 (42.9)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	18 (22.2)	17 (21.0)	17 (21.0)	25 (30.9)	4 (4.9)	0	81	35 (43.2)
	NRTI 2剤+NNRTI	18 (25.7)	16 (22.9)	13 (18.6)	14 (20.0)	9 (12.9)	0	70	34 (48.6)
	INSTI	93 (31.7)	42 (14.3)	53 (18.1)	74 (25.3)	31 (10.6)	1	294	135 (46.1)
	その他	10 (25.6)	3 (7.7)	8 (20.5)	13 (33.3)	5 (12.8)	1	40	13 (33.3)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	156 (30.3)	78 (15.1)	94 (18.3)	134 (26.0)	53 (10.3)	4	519	234 (45.4)
37℃以上の 発熱	投与なし(投与歴なし)	18 (75.0)	3 (12.5)	2 (8.3)	1 (4.2)	0 (0.0)	0	24	21 (87.5)
	投与なし(投与歴あり)	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	1	8	5 (71.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	28 (35.0)	15 (18.8)	23 (28.8)	13 (16.3)	1 (1.3)	1	81	43 (53.8)
	NRTI 2剤+NNRTI	31 (44.3)	18 (25.7)	13 (18.6)	5 (7.1)	3 (4.3)	0	70	49 (70.0)
	INSTI	113 (38.6)	66 (22.5)	66 (22.5)	40 (13.7)	8 (2.7)	1	294	179 (61.1)
	その他	10 (25.6)	7 (17.9)	14 (35.9)	6 (15.4)	2 (5.1)	1	40	17 (43.6)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	205 (39.9)	109 (21.2)	119 (23.2)	67 (13.0)	14 (2.7)	5	519	314 (61.1)
皮膚の湿疹・ かゆみ・ できもの	投与なし(投与歴なし)	7 (29.2)	4 (16.7)	3 (12.5)	5 (20.8)	5 (20.8)	0	24	11 (45.8)
	投与なし(投与歴あり)	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	2 (28.6)	1	8	4 (57.1)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	17 (21.0)	10 (12.3)	15 (18.5)	27 (33.3)	12 (14.8)	0	81	27 (33.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	12 (17.1)	14 (20.0)	13 (18.6)	17 (24.3)	14 (20.0)	0	70	26 (37.1)
	INSTI	58 (19.8)	56 (19.1)	49 (16.7)	83 (28.3)	47 (16.0)	1	294	114 (38.9)
	その他	5 (12.8)	6 (15.4)	7 (17.9)	13 (33.3)	8 (20.5)	1	40	11 (28.2)
	不明	0	0	0	1	0	1	2	0
	計	103 (20.0)	90 (17.5)	87 (16.9)	147 (28.5)	88 (17.1)	4	519	193 (37.5)
視野	投与なし(投与歴なし)	18 (75.0)	4 (16.7)	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	24	22 (91.7)
	投与なし(投与歴あり)	5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8	6 (85.7)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	38 (46.9)	11 (13.6)	24 (29.6)	7 (8.6)	1 (1.2)	0	81	49 (60.5)
	NRTI 2剤+NNRTI	38 (54.3)	13 (18.6)	12 (17.1)	5 (7.1)	2 (2.9)	0	70	51 (72.9)
	INSTI	145 (49.5)	50 (17.1)	59 (20.1)	33 (11.3)	6 (2.0)	1	294	195 (66.6)
	その他	17 (43.6)	6 (15.4)	12 (30.8)	3 (7.7)	1 (2.6)	1	40	23 (59.0)
	不明	0	0	1	0	0	1	2	0
	計	261 (50.7)	85 (16.5)	111 (21.6)	48 (9.3)	10 (1.9)	4	519	346 (67.2)
睡眠	投与なし(投与歴なし)	12 (50.0)	4 (16.7)	4 (16.7)	4 (16.7)	0 (0.0)	0	24	16 (66.7)
	投与なし(投与歴あり)	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	1	8	5 (71.4)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	15 (18.5)	15 (18.5)	27 (33.3)	21 (25.9)	3 (3.7)	0	81	30 (37.0)
	NRTI 2剤+NNRTI	21 (30.0)	14 (20.0)	13 (18.6)	16 (22.9)	6 (8.6)	0	70	35 (50.0)
	INSTI	78 (26.6)	58 (19.8)	76 (25.9)	71 (24.2)	10 (3.4)	1	294	136 (46.4)
	その他	8 (20.5)	7 (17.9)	11 (28.2)	11 (28.2)	2 (5.1)	1	40	15 (38.5)
	不明	0	0	0	0	1	1	2	0
	計	139 (27.0)	98 (19.0)	132 (25.6)	124 (24.1)	22 (4.3)	4	519	237 (46.0)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-22. 疾患の有無（平成26年度第4期事業対象者）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	26 (5.1)	488 (94.9)	5	519
(内訳) 脳出血	22 (4.3)			
脳梗塞	1 (0.2)			
その他の脳血管疾患	3 (0.6)			
虚血性心疾患	5 (1.0)	510 (99.0)	4	519
(内訳) 心筋梗塞	3 (0.6)			
その他の虚血性心疾患	2 (0.4)			
肝以外の悪性新生物	8 (1.6)	505 (98.4)	6	519
高血圧・糖尿病	119 (23.4)	389 (76.6)	11	519
(内訳) 高血圧	93 (18.3)			
糖尿病	41 (8.1)			

2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移

本節では、以下の表を示した。

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-5. 肝炎の状況別、血小板数	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-6. 肝炎の状況別、ALT(GPT)	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-7. 肝炎の状況別、総ビリルビン	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-8. 肝炎の状況別、アルブミン	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-9. 肝炎の状況別、プロトロンビン	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-10. 肝炎の状況別、AFP	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-11. 肝炎の状況別、クレアチニン	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-12. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-13. 肝炎の状況別、肝移植歴	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-15. 肝炎の状況別、CD4値	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-16. 肝炎の状況別、HIV-RNA量	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-17. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-19. 肝炎の状況別、身体状況	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-20. 肝炎の状況別、日常生活動作	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-21. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ	(平成26年度第4期事業対象者)
表4-2-22. 肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-23. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-24. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-25. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況（平成26年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	1 (5.0)	1 (5.0)	11 (55.0)	7 (35.0)	0	20
陰性	7 (1.6)	55 (12.7)	232 (53.5)	140 (32.3)	3	437
不明	2 (3.4)	2 (3.4)	33 (55.9)	22 (37.3)	3	62
計	10 (1.9)	58 (11.3)	276 (53.8)	169 (32.9)	6	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況（平成26年度第4期事業対象者）

HCV 抗体の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	10 (2.3)	52 (12.0)	257 (59.1)	116 (26.7)	3	438
陰性	0 (0.0)	2 (4.5)	3 (6.8)	39 (88.6)	1	45
不明	0 (0.0)	4 (11.8)	16 (47.1)	14 (41.2)	2	36
計	10 (1.9)	58 (11.3)	276 (53.8)	169 (32.9)	6	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況（平成26年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	HCV 抗体の保有状況			計
	陽性	陰性	不明	
陽性	16 (80.0)	4 (20.0)	0	20
陰性	373 (90.1)	41 (9.9)	23	437
不明	49 (100.0)	0 (0.0)	13	62
計	438 (90.7)	45 (9.3)	36	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (LogIU/ml)							計
	検出せず	～3.7 未満	3.7～6.0 未満	6.0～6.7 未満	6.7 以上	未実施	不明	
肝がんあり	5 (50.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	0	10
肝硬変あり	18 (31.0)	0 (0.0)	14 (24.1)	9 (15.5)	4 (6.9)	10 (10.0)	3	58
慢性肝炎あり	104 (37.7)	5 (1.8)	33 (12.0)	44 (15.9)	31 (11.2)	47 (10.1)	12	276
いずれもなし	106 (62.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)	43 (31.3)	18	169
不明	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	6
計	236 (45.5)	6 (1.2)	49 (9.4)	53 (10.2)	37 (7.1)	102 (17.0)	36	519

() : 各行の計に対する%

表4-2-5. 肝炎の状況別、血小板数（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	血小板数 ($\times 10^4/\text{mm}^3$)					計
	～15 未満	15～20 未満	20～25 未満	25 以上～	不明	
肝がんあり	9 (90.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	42 (72.4)	11 (19.0)	3 (5.2)	2 (3.4)	0	58
慢性肝炎あり	87 (32.0)	86 (31.6)	62 (22.8)	37 (13.6)	4	276
いずれもなし	18 (10.8)	52 (31.1)	49 (29.3)	48 (28.7)	2	169
不明	1 (20.0)	1 (20.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	1	6
計	157 (30.7)	150 (29.3)	117 (22.9)	88 (17.2)	7	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-6. 肝炎の状況別、ALT(GPT) (平成26年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	ALT(GPT) (IU/L)					計
	～40 未満	40～80 未満	80～120 未満	120 以上～	不明	
肝がんあり	4 (40.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	35 (60.3)	15 (25.9)	7 (12.1)	1 (1.7)	0	58
慢性肝炎あり	148 (54.4)	75 (27.6)	28 (10.3)	21 (7.7)	4	276
いずれもなし	133 (80.1)	27 (16.3)	5 (3.0)	1 (0.6)	3	169
不明	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	325 (63.6)	122 (23.9)	41 (8.0)	23 (4.5)	8	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-7. 肝炎の状況別、総ビリルビン (平成26年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	総ビリルビン (mg/dl)					計
	～0.7 未満	0.7～1.3 未満	1.3～1.6 未満	1.6 以上～	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0	10
肝硬変あり	22 (37.9)	19 (32.8)	5 (8.6)	12 (20.7)	0	58
慢性肝炎あり	118 (44.2)	113 (42.3)	16 (6.0)	20 (7.5)	9	276
いずれもなし	82 (50.9)	60 (37.3)	9 (5.6)	10 (6.2)	8	169
不明	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1	6
計	228 (45.5)	198 (39.5)	31 (6.2)	44 (8.8)	18	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-8. 肝炎の状況別、アルブミン (平成26年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	アルブミン (g/dL)					計
	～3.0 未満	3.0～3.5 未満	3.5～4.0 未満	4.0 以上～	不明	
肝がんあり	3 (30.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0	10
肝硬変あり	6 (10.7)	11 (19.6)	13 (23.2)	26 (46.4)	2	58
慢性肝炎あり	2 (0.8)	9 (3.6)	27 (10.7)	214 (84.9)	24	276
いずれもなし	0 (0.0)	1 (0.7)	5 (3.5)	136 (95.8)	27	169
不明	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	1	6
計	11 (2.4)	25 (5.4)	46 (9.9)	383 (82.4)	54	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-9. 肝炎の状況別、プロトロンビン (平成26年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	プロトロンビン PT 活性% (%)					計
	～50 未満	50～70 未満	70～100 未満	100 以上～	不明	
肝がんあり	1 (16.7)	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	4	10
肝硬変あり	0 (0.0)	9 (20.9)	29 (67.4)	5 (11.6)	15	58
慢性肝炎あり	1 (0.6)	8 (4.6)	114 (65.1)	52 (29.7)	101	276
いずれもなし	1 (1.1)	3 (3.4)	38 (43.7)	45 (51.7)	82	169
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	5	6
計	3 (1.0)	21 (6.7)	184 (59.0)	104 (33.3)	207	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-10. 肝炎の状況別、AFP（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	AFP (ng/mL)					計
	～3 未満	3～6 未満	6～20 未満	20 以上～	不明	
肝がんあり	2 (22.2)	3 (33.3)	2 (22.2)	2 (22.2)	1	10
肝硬変あり	10 (20.8)	20 (41.7)	13 (27.1)	5 (10.4)	10	58
慢性肝炎あり	70 (40.7)	67 (39.0)	24 (14.0)	11 (6.4)	104	276
いずれもなし	32 (64.0)	13 (26.0)	3 (6.0)	2 (4.0)	119	169
不明	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5	6
計	115 (41.1)	103 (36.8)	42 (15.0)	20 (7.1)	239	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-11. 肝炎の状況別、クレアチニン（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	クレアチニン (mg/dL)					計
	～0.6 未満	0.6～1.2 未満	1.2～1.8 未満	1.8 以上～	不明	
肝がんあり	3 (30.0)	7 (70.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	8 (14.5)	39 (70.9)	2 (3.6)	6 (10.9)	3	58
慢性肝炎あり	34 (13.1)	214 (82.6)	7 (2.7)	4 (1.5)	17	276
いずれもなし	24 (14.8)	132 (81.5)	4 (2.5)	2 (1.2)	7	169
不明	2 (40.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	71 (14.5)	395 (80.4)	13 (2.6)	12 (2.4)	28	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-12. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤での治療歴						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	6 (60.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	4 (40.0)	0	10
肝硬変あり	38 (67.9)	31 (55.4)	4 (7.1)	3 (5.4)	18 (32.1)	2	58
慢性肝炎あり	157 (58.1)	131 (48.5)	18 (6.7)	8 (3.0)	113 (41.9)	6	276
いずれもなし	57 (34.3)	40 (24.1)	11 (6.6)	6 (3.6)	109 (65.7)	3	169
不明	3 (60.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	1	6
計	261 (51.5)	210 (41.4)	34 (6.7)	17 (3.4)	246 (48.5)	12	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-13. 肝炎の状況別、肝移植歴（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	肝移植歴			計
	あり	なし	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	10 (100.0)	0	10
肝硬変あり	2 (3.5)	55 (96.5)	1	58
慢性肝炎あり	4 (1.5)	263 (98.5)	9	276
いずれもなし	0 (0.0)	164 (100.0)	5	169
不明	0 (0.0)	5 (100.0)	1	6
計	6 (1.2)	497 (98.8)	16	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤の現在の投与状況						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)	0	10
肝硬変あり	3 (5.4)	0 (0.0)	3 (5.4)	0 (0.0)	53 (94.6)	2	58
慢性肝炎あり	19 (7.0)	6 (2.2)	11 (4.0)	2 (0.7)	253 (93.0)	4	276
いずれもなし	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	167 (100.0)	2	169
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)	1	6
計	22 (4.3)	6 (1.2)	14 (2.7)	2 (0.4)	488 (95.7)	9	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

肝炎の状況	インターフェロン製剤の種類（重複あり）					投与あり					
	インターフェロン		シメプレビル	ダクラタスビル	レジパスビル／ソホスブビル						
	α	ペグ									
肝がんあり	0	－	0	－	0	－	0				
肝硬変あり	1	(33.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)	3		
慢性肝炎あり	1	(5.3)	13	(68.4)	3	(15.8)	2	(10.5)	0	(0.0)	19
いずれもなし	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0
不明	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0
計	2	(9.1)	13	(59.1)	3	(13.6)	2	(9.1)	1	(4.5)	22

() : 各行のインターフェロン製剤等投与ありの数を分母とする%

表4-2-15. 肝炎の状況別、CD4値（平成26年度第4期事業対象者）

	CD4 値					計
	～200 未満	200～350 未満	350～500 未満	500 以上	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	0	10
肝硬変あり	15 (25.9)	13 (22.4)	14 (24.1)	16 (27.6)	0	58
慢性肝炎あり	15 (5.5)	37 (13.6)	78 (28.7)	142 (52.2)	4	276
いずれもなし	7 (4.1)	25 (14.8)	37 (21.9)	100 (59.2)	0	169
不明	0 (0.0)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1	6
計	39 (7.6)	81 (15.8)	133 (25.9)	261 (50.8)	5	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-16. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HIV-RNA 量						計
	50 未満*	50～ 400 未満†	400～ 1000 未満	1000～ 10000 未満	10000 以上	不明	
肝がんあり	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	55 (94.8)	2 (3.4)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	58
慢性肝炎あり	252 (92.0)	10 (3.6)	1 (0.4)	9 (3.3)	2 (0.7)	2	276
いずれもなし	146 (86.9)	9 (5.4)	3 (1.8)	7 (4.2)	3 (1.8)	1	169
不明	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	6
計	466 (90.8)	21 (4.1)	5 (1.0)	16 (3.1)	5 (1.0)	6	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-17. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬の併用区分							計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	6 (60.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (12.1)	7 (12.1)	38 (65.5)	6 (10.3)	0	58
慢性肝炎あり	12 (4.4)	5 (1.8)	34 (12.4)	34 (12.4)	168 (61.1)	22 (8.0)	1	276
いずれもなし	12 (7.1)	3 (1.8)	38 (22.5)	25 (14.8)	80 (47.3)	11 (6.5)	0	169
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1	6
計	24 (4.6)	8 (1.5)	81 (15.7)	70 (13.5)	294 (56.9)	40 (7.7)	2	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬							
	AZT	ddl	ddC	3TC	d4T	AZT/3TC	ABC	TDF
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 -	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	2 (20.0)
肝硬変あり	1 (1.7)	0 (0.0)	0 -	13 (22.4)	1 (1.7)	0 (0.0)	8 (13.8)	1 (1.7)
慢性肝炎あり	14 (5.1)	1 (0.4)	0 -	32 (11.6)	4 (1.4)	7 (2.5)	12 (4.3)	16 (5.8)
いずれもなし	8 (4.7)	1 (0.6)	0 -	22 (13.0)	2 (1.2)	2 (1.2)	8 (4.7)	11 (6.5)
不明	1 (16.7)	0 (0.0)	0 -	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	24 (4.6)	2 (0.4)	0 -	68 (13.1)	7 (1.3)	9 (1.7)	29 (5.6)	30 (5.8)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	3TC/ABC	FTC	TDF/FTC	IDV	SQV	RTV	NFV	LPV
肝がんあり	3 (30.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	0 -	0 (0.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)
肝硬変あり	13 (22.4)	1 (1.7)	24 (41.4)	0 -	0 (0.0)	10 (17.2)	1 (1.7)	4 (6.9)
慢性肝炎あり	56 (20.3)	3 (1.1)	125 (45.3)	0 -	4 (1.4)	43 (15.6)	6 (2.2)	10 (3.6)
いずれもなし	45 (26.6)	0 (0.0)	64 (37.9)	0 -	1 (0.6)	29 (17.2)	0 (0.0)	13 (7.7)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (66.7)	0 -	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	117 (22.5)	5 (1.0)	222 (42.8)	0 -	5 (1.0)	85 (16.4)	8 (1.5)	27 (5.2)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	ATV	FPV	DRV	NVP	EFV	DLV	ETR	RPV
肝がんあり	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	0 -	1 (10.0)	0 (0.0)
肝硬変あり	1 (1.7)	1 (1.7)	8 (13.8)	0 (0.0)	8 (13.8)	0 -	5 (8.6)	1 (1.7)
慢性肝炎あり	12 (4.3)	6 (2.2)	35 (12.7)	5 (1.8)	30 (10.9)	0 -	18 (6.5)	12 (4.3)
いずれもなし	9 (5.3)	6 (3.6)	23 (13.6)	3 (1.8)	11 (6.5)	0 -	11 (6.5)	18 (10.7)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	2 (33.3)	0 -	0 (0.0)	0 (0.0)
計	23 (4.4)	13 (2.5)	68 (13.1)	8 (1.5)	54 (10.4)	0 -	35 (6.7)	31 (6.0)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	RAL	STB	MVC					対象者数
肝がんあり	5 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					10
肝硬変あり	33 (56.9)	0 (0.0)	5 (8.6)					58
慢性肝炎あり	111 (40.2)	5 (1.8)	6 (2.2)					276
いずれもなし	53 (31.4)	4 (2.4)	5 (3.0)					169
不明	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)					6
計	204 (39.3)	9 (1.7)	16 (3.1)					519

(): 対象者数を分母とする%

表4-2-19. 肝炎の状況別、身体状況（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
肝がんあり	1 (10.0)	4 (40.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0	10	5 (50.0)
肝硬変あり	12 (21.1)	18 (31.6)	24 (42.1)	3 (5.3)	1	58	30 (52.6)
慢性肝炎あり	76 (27.7)	98 (35.8)	89 (32.5)	11 (4.0)	2	276	174 (63.5)
いずれもなし	51 (31.1)	57 (34.8)	52 (31.7)	4 (2.4)	5	169	108 (65.9)
不明	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1	6	3 (60.0)
計	141 (27.6)	179 (35.1)	169 (33.1)	21 (4.1)	9	519	320 (62.7)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-20. 肝炎の状況別、日常生活動作（平成26年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
肝がんあり	0 (0.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	0	10	3 (30.0)
肝硬変あり	8 (14.0)	8 (14.0)	10 (17.5)	31 (54.4)	1	58	16 (28.1)
慢性肝炎あり	78 (29.1)	70 (26.1)	64 (23.9)	56 (20.9)	8	276	148 (55.2)
いずれもなし	40 (24.4)	51 (31.1)	41 (25.0)	32 (19.5)	5	169	91 (55.5)
不明	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1	6	2 (40.0)
計	127 (25.2)	133 (26.4)	119 (23.6)	125 (24.8)	15	519	260 (51.6)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-21. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成26年度第4期事業対象者）

A. 肝硬変あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.4)	1 (7.7)	9 (69.2)	1 (7.7)	0	13
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)	1 (6.7)	9 (60.0)	2 (13.3)	0	15
200 ～350 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	3 (23.1)	8 (61.5)	1 (7.7)	0	13
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	3 (23.1)	8 (61.5)	1 (7.7)	0	13
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (14.3)	2 (14.3)	8 (57.1)	2 (14.3)	0	14
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (14.3)	2 (14.3)	8 (57.1)	2 (14.3)	0	14
500 以上	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	12 (80.0)	1 (6.7)	0	15
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	1 (6.3)	13 (81.3)	1 (6.3)	0	16
不明	50未満*	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
計	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (10.9)	7 (12.7)	37 (67.3)	5 (9.1)	0	55
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (12.1)	7 (12.1)	38 (65.5)	6 (10.3)	0	58

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-21 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成26年度第4期事業対象者）

B. 慢性肝炎あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (27.3)	7 (63.6)	1 (9.1)	0	11
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)	11 (73.3)	1 (6.7)	0	15
200 ～350 未満	50未満*	2 (5.6)	1 (2.8)	4 (11.1)	2 (5.6)	25 (69.4)	2 (5.6)	0	36
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	1000～10000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	10000以上	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	計	2 (5.4)	1 (2.7)	4 (10.8)	2 (5.4)	26 (70.3)	2 (5.4)	0	37
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	1 (1.4)	11 (15.7)	7 (10.0)	43 (61.4)	8 (11.4)	1	71
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	400～1000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	1000～10000未満	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	10000以上	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	2 (2.6)	2 (2.6)	13 (16.9)	7 (9.1)	44 (57.1)	9 (11.7)	1	78
500 以上	50未満*	2 (1.5)	0 (0.0)	16 (12.0)	22 (16.5)	85 (63.9)	8 (6.0)	0	133
	50～400未満†	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	1000～10000未満	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0	4
	10000以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	計	6 (4.2)	2 (1.4)	16 (11.3)	22 (15.5)	86 (60.6)	10 (7.0)	0	142
不明	50未満*	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	1000～10000未満	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	10000以上	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0	4
計	50未満*	5 (2.0)	2 (0.8)	31 (12.4)	34 (13.5)	160 (63.7)	19 (7.6)	1	252
	50～400未満†	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	0	10
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	1000～10000未満	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	0	9
	10000以上	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	計	12 (4.4)	5 (1.8)	34 (12.4)	34 (12.4)	168 (61.1)	22 (8.0)	1	276

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-21 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成26年度第4期事業対象者）

C. いずれもなし

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0	5
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	4 (57.1)	0 (0.0)	0	7
200 ～350未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (16.7)	3 (16.7)	10 (55.6)	2 (11.1)	0	18
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (8.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	12 (48.0)	3 (12.0)	0	25
350 ～500未満	50未満*	2 (5.9)	0 (0.0)	10 (29.4)	3 (8.8)	17 (50.0)	2 (5.9)	0	34
	50～400未満†	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5 (13.5)	0 (0.0)	10 (27.0)	3 (8.1)	17 (45.9)	2 (5.4)	0	37
500以上	50未満*	0 (0.0)	1 (1.1)	21 (23.6)	18 (20.2)	43 (48.3)	6 (6.7)	0	89
	50～400未満†	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0	5
	400～1000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	10000以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	5 (5.0)	1 (1.0)	23 (23.0)	18 (18.0)	47 (47.0)	6 (6.0)	0	100
不明	50未満*	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
計	50未満*	2 (1.4)	1 (0.7)	34 (23.3)	25 (17.1)	74 (50.7)	10 (6.8)	0	146
	50～400未満†	2 (22.2)	0 (0.0)	2 (22.2)	0 (0.0)	4 (44.4)	1 (11.1)	0	9
	400～1000未満	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	1000～10000未満	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
	10000以上	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	12 (7.1)	3 (1.8)	38 (22.5)	25 (14.8)	80 (47.3)	11 (6.5)	0	169

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-22. 肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象者）

年度	肝炎の状況							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (1.0)	49 (8.1)	431 (70.9)	122 (20.1)	25	—	—	633
平成18年度	5 (0.8)	47 (7.6)	412 (67.0)	133 (21.6)	18	3 (0.5)	15 (2.4)	633
平成19年度	4 (0.7)	43 (7.0)	396 (64.5)	137 (22.3)	19	5 (0.8)	29 (4.7)	633
平成20年度	8 (1.3)	48 (7.7)	360 (58.0)	153 (24.6)	12	9 (1.4)	43 (6.9)	633
平成21年度	8 (1.3)	49 (8.0)	340 (55.3)	146 (23.7)	18	16 (2.6)	56 (9.1)	633
平成22年度	6 (1.0)	57 (9.1)	334 (53.6)	146 (23.4)	10	16 (2.6)	64 (10.3)	633
平成23年度	6 (1.0)	57 (9.1)	323 (51.7)	145 (23.2)	8	20 (3.2)	74 (11.8)	633
平成24年度	5 (0.8)	58 (9.4)	315 (50.9)	140 (22.6)	14	21 (3.4)	80 (12.9)	633
平成25年度	12 (1.9)	65 (10.5)	270 (43.4)	165 (26.5)	11	23 (3.7)	87 (14.0)	633
平成26年度	10 (1.6)	60 (9.6)	272 (43.5)	164 (26.2)	8	23 (3.7)	96 (15.4)	633

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-23. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝がんあり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (100.0)	—	—	—	—	—	—	6
平成18年度	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (50.0)	6
平成19年度	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	0 (0.0)	4 (80.0)	6
平成20年度	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	5 (83.3)	6
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成23年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成25年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成26年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝硬変あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	49 (100.0)	—	—	—	—	—	49
平成18年度	0 (0.0)	33 (67.3)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	1 (2.0)	6 (12.2)	49
平成19年度	1 (2.0)	24 (49.0)	7 (14.3)	3 (6.1)	0	2 (4.1)	12 (24.5)	49
平成20年度	1 (2.0)	21 (42.9)	8 (16.3)	2 (4.1)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成21年度	2 (4.1)	22 (44.9)	7 (14.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成22年度	2 (4.2)	21 (43.8)	5 (10.4)	3 (6.3)	1	2 (4.2)	15 (31.3)	49
平成23年度	1 (2.0)	20 (40.8)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	17 (34.7)	49
平成24年度	2 (4.2)	19 (39.6)	6 (12.5)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	17 (35.4)	49
平成25年度	3 (6.3)	20 (41.7)	3 (6.3)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	18 (37.5)	49
平成26年度	3 (6.1)	17 (34.7)	6 (12.2)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	20 (40.8)	49

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝慢性肝炎あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	431 (100.0)	—	—	—	—	431
平成18年度	2 (0.5)	11 (2.6)	376 (89.7)	27 (6.4)	12	2 (0.5)	1 (0.2)	431
平成19年度	2 (0.5)	17 (4.0)	355 (84.3)	37 (8.8)	10	3 (0.7)	7 (1.7)	431
平成20年度	6 (1.4)	24 (5.7)	321 (75.7)	54 (12.7)	7	5 (1.2)	14 (3.3)	431
平成21年度	6 (1.4)	25 (6.0)	302 (72.2)	52 (12.4)	13	10 (2.4)	23 (5.5)	431
平成22年度	4 (0.9)	33 (7.7)	296 (69.2)	54 (12.6)	3	10 (2.3)	31 (7.2)	431
平成23年度	5 (1.2)	33 (7.7)	281 (65.8)	58 (13.6)	4	14 (3.3)	36 (8.4)	431
平成24年度	3 (0.7)	36 (8.5)	275 (64.6)	56 (13.1)	5	15 (3.5)	41 (9.6)	431
平成25年度	8 (1.9)	40 (9.4)	239 (56.4)	77 (18.2)	7	17 (4.0)	43 (10.1)	431
平成26年度	7 (1.6)	39 (9.2)	234 (55.1)	78 (18.4)	6	17 (4.0)	50 (11.8)	431

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝いずれもなし の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	122 (100.0)	—	—	—	122
平成18年度	0 (0.0)	1 (0.8)	20 (16.9)	97 (82.2)	4	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成19年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.9)	90 (78.3)	7	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成20年度	0 (0.0)	2 (1.7)	21 (17.9)	90 (76.9)	5	1 (0.9)	3 (2.6)	122
平成21年度	0 (0.0)	1 (0.9)	22 (18.8)	86 (73.5)	5	2 (1.7)	6 (5.1)	122
平成22年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.7)	83 (71.6)	6	2 (1.7)	6 (5.2)	122
平成23年度	0 (0.0)	3 (2.5)	24 (20.2)	82 (68.9)	3	2 (1.7)	8 (6.7)	122
平成24年度	0 (0.0)	2 (1.7)	24 (20.7)	79 (68.1)	6	2 (1.7)	9 (7.8)	122
平成25年度	1 (0.8)	3 (2.5)	20 (16.5)	82 (67.8)	1	2 (1.7)	13 (10.7)	122
平成26年度	0 (0.0)	2 (1.7)	21 (17.5)	82 (68.3)	2	2 (1.7)	13 (10.8)	122

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-23 (続き). 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移 (平成17年度第1期事業対象)

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝不明 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	—	25	—	—	25
平成18年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	8 (34.8)	2	0 (0.0)	5 (21.7)	25
平成19年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	7 (29.2)	1	0 (0.0)	6 (25.0)	25
平成20年度	0 (0.0)	1 (4.0)	10 (40.0)	7 (28.0)	0	1 (4.0)	6 (24.0)	25
平成21年度	0 (0.0)	1 (4.0)	9 (36.0)	7 (28.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成22年度	0 (0.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	6 (24.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成23年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	4 (16.7)	1	2 (8.3)	7 (29.2)	25
平成24年度	0 (0.0)	1 (4.3)	10 (43.5)	3 (13.0)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25
平成25年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	4 (17.4)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25
平成26年度	0 (0.0)	2 (8.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	0	2 (8.0)	7 (28.0)	25

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-24. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移 (平成17年度第1期事業対象)

年度	HBs抗原の保有状況： 平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	3 (7.7)	32 (82.1)	4 (10.3)	0	—	—	39
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.6)	30 (78.9)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	0 (0.0)	39
平成19年度	1 (2.7)	1 (2.7)	29 (78.4)	5 (13.5)	2	1 (2.7)	0 (0.0)	39
平成20年度	1 (2.6)	1 (2.6)	27 (69.2)	8 (20.5)	0	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成21年度	1 (2.6)	1 (2.6)	28 (73.7)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成22年度	1 (2.6)	1 (2.6)	25 (64.1)	9 (23.1)	0	1 (2.6)	2 (5.1)	39
平成23年度	0 (0.0)	3 (7.7)	27 (69.2)	5 (12.8)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39
平成24年度	1 (2.6)	1 (2.6)	24 (63.2)	8 (21.1)	1	1 (2.6)	3 (7.9)	39
平成25年度	1 (2.6)	3 (7.7)	21 (53.8)	10 (25.6)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39
平成26年度	1 (2.6)	1 (2.6)	23 (59.0)	9 (23.1)	0	1 (2.6)	4 (10.3)	39

年度	HBs抗原の保有状況： 平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.1)	44 (9.5)	320 (69.1)	94 (20.3)	9	—	—	472
平成18年度	4 (0.9)	43 (9.3)	307 (66.3)	100 (21.6)	9	0 (0.0)	9 (1.9)	472
平成19年度	3 (0.7)	38 (8.2)	290 (62.9)	106 (23.0)	11	2 (0.4)	22 (4.8)	472
平成20年度	6 (1.3)	42 (9.1)	267 (57.5)	112 (24.1)	8	4 (0.9)	33 (7.1)	472
平成21年度	4 (0.9)	43 (9.3)	253 (55.0)	109 (23.7)	12	9 (2.0)	42 (9.1)	472
平成22年度	4 (0.9)	50 (10.8)	239 (51.5)	114 (24.6)	8	9 (1.9)	48 (10.3)	472
平成23年度	6 (1.3)	46 (9.9)	233 (50.1)	111 (23.9)	7	13 (2.8)	56 (12.0)	472
平成24年度	3 (0.6)	50 (10.8)	225 (48.7)	108 (23.4)	10	14 (3.0)	62 (13.4)	472
平成25年度	10 (2.2)	50 (10.8)	197 (42.4)	124 (26.7)	7	16 (3.4)	68 (14.6)	472
平成26年度	8 (1.7)	48 (10.3)	191 (41.1)	126 (27.1)	7	16 (3.4)	76 (16.3)	472

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-25. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.0)	45 (8.6)	401 (77.0)	70 (13.4)	10	—	—	531
平成18年度	4 (0.8)	45 (8.7)	377 (72.8)	80 (15.4)	13	2 (0.4)	10 (1.9)	531
平成19年度	3 (0.6)	40 (7.8)	356 (69.5)	86 (16.8)	19	4 (0.8)	23 (4.5)	531
平成20年度	7 (1.3)	47 (9.0)	325 (62.5)	100 (19.2)	11	6 (1.2)	35 (6.7)	531
平成21年度	8 (1.6)	47 (9.1)	308 (59.7)	96 (18.6)	15	12 (2.3)	45 (8.7)	531
平成22年度	6 (1.1)	56 (10.7)	298 (57.0)	99 (18.9)	8	12 (2.3)	52 (9.9)	531
平成23年度	6 (1.1)	53 (10.1)	289 (55.2)	99 (18.9)	7	16 (3.1)	61 (11.6)	531
平成24年度	5 (1.0)	56 (10.8)	283 (54.4)	93 (17.9)	11	17 (3.3)	66 (12.7)	531
平成25年度	12 (2.3)	60 (11.5)	245 (47.0)	113 (21.7)	10	19 (3.6)	72 (13.8)	531
平成26年度	9 (1.7)	56 (10.7)	243 (46.3)	117 (22.3)	6	19 (3.6)	81 (15.4)	531

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	2 (4.7)	5 (11.6)	36 (83.7)	2	—	—	45
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.2)	6 (13.3)	38 (84.4)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	45
平成19年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (17.8)	36 (80.0)	0	0 (0.0)	1 (2.2)	45
平成20年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	34 (77.3)	1	1 (2.3)	2 (4.5)	45
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (16.3)	32 (74.4)	2	1 (2.3)	3 (7.0)	45
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成23年度	0 (0.0)	1 (2.3)	6 (13.6)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (14.3)	32 (76.2)	3	1 (2.4)	3 (7.1)	45
平成25年度	0 (0.0)	2 (4.4)	4 (8.9)	34 (75.6)	0	1 (2.2)	4 (8.9)	45
平成26年度	1 (2.3)	1 (2.3)	4 (9.3)	32 (74.4)	2	1 (2.3)	4 (9.3)	45

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

	CD4 値					計	中央値
	～200 未満	200～ 350 未満	350～ 500 未満	500 以上	不明		
平成5年度 第1期	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	379	385	163
平成6年度 第1期	103 (32.7)	95 (30.2)	68 (21.6)	49 (15.6)	148	463	288
平成7年度 第1期	134 (36.2)	99 (26.8)	87 (23.5)	50 (13.5)	120	490	277
平成8年度 第1期	141 (34.4)	117 (28.5)	93 (22.7)	59 (14.4)	143	553	286
平成9年度 第1期	136 (25.2)	148 (27.4)	139 (25.7)	117 (21.7)	81	621	332
平成10年度 第1期	104 (17.8)	177 (30.4)	155 (26.6)	147 (25.2)	75	658	356
平成11年度 第1期	79 (13.0)	178 (29.3)	182 (29.9)	169 (27.8)	58	666	389
平成12年度 第1期	83 (13.8)	167 (27.8)	175 (29.1)	176 (29.3)	76	677	394
平成13年度 第1期	71 (12.2)	154 (26.4)	179 (30.7)	179 (30.7)	83	666	398
平成14年度 第1期	68 (11.3)	169 (28.2)	156 (26.0)	207 (34.5)	66	666	412
平成15年度 第1期	74 (13.0)	157 (27.6)	166 (29.2)	171 (30.1)	94	662	402
平成16年度 第1期	74 (12.7)	150 (25.7)	165 (28.3)	195 (33.4)	61	645	408
平成17年度 第1期	59 (10.5)	157 (27.9)	152 (27.0)	194 (34.5)	71	633	408
平成18年度 第1期	77 (13.6)	154 (27.3)	136 (24.1)	198 (35.0)	52	617	395
平成19年度 第1期	67 (12.2)	172 (31.4)	136 (24.9)	172 (31.4)	54	601	381
平成20年度 第1期	70 (13.0)	155 (28.9)	155 (28.9)	157 (29.2)	50	587	389
平成21年度 第1期	50 (9.5)	141 (26.7)	127 (24.1)	210 (39.8)	39	567	432
平成22年度 第1期	56 (10.6)	133 (25.3)	153 (29.1)	184 (35.0)	33	559	432
平成23年度 第1期	49 (9.6)	118 (23.1)	150 (29.4)	193 (37.8)	38	548	442
平成24年度 第1期	37 (7.4)	107 (21.4)	149 (29.7)	208 (41.5)	40	541	459
第2期	37 (7.4)	117 (23.4)	140 (28.1)	205 (41.1)	39	538	449
第3期	35 (7.0)	118 (23.7)	131 (26.4)	213 (42.9)	39	536	467
第4期	31 (6.9)	102 (22.7)	121 (26.9)	196 (43.6)	85	535	467
平成25年度 第1期	34 (6.8)	117 (23.5)	120 (24.1)	226 (45.5)	35	532	469
第2期	40 (8.0)	96 (19.2)	149 (29.7)	216 (43.1)	31	532	465
第3期	41 (8.2)	91 (18.1)	139 (27.6)	232 (46.1)	26	529	473
第4期	29 (6.4)	93 (20.7)	124 (27.6)	204 (45.3)	79	529	481
平成26年度 第1期	36 (7.3)	90 (18.4)	131 (26.7)	233 (47.6)	35	525	485
第2期	41 (8.3)	80 (16.2)	135 (27.3)	239 (48.3)	28	523	492
第3期	37 (7.5)	68 (13.8)	132 (26.9)	254 (51.7)	31	522	507
第4期	34 (7.4)	74 (16.2)	115 (25.1)	235 (51.3)	61	519	508

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

	CD4 / CD8 比						計	中央値
	～0.10未満	0.10～ 0.50 未満	0.50～ 1.00 未満	1.00～ 1.50 未満	1.50 以上	不明		
平成5年度 第1期	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	379	385	0.17
平成6年度 第1期	45 (14.5)	168 (54.2)	90 (29.0)	4 (1.3)	3 (1.0)	153	463	0.31
平成7年度 第1期	45 (12.2)	199 (53.8)	114 (30.8)	12 (3.2)	0 (0.0)	120	490	0.34
平成8年度 第1期	59 (14.5)	231 (56.6)	109 (26.7)	8 (2.0)	1 (0.2)	145	553	0.34
平成9年度 第1期	31 (5.9)	281 (53.6)	185 (35.3)	26 (5.0)	1 (0.2)	97	621	0.40
平成10年度 第1期	18 (3.1)	280 (48.4)	241 (41.6)	37 (6.4)	3 (0.5)	79	658	0.48
平成11年度 第1期	20 (3.4)	283 (48.3)	227 (38.7)	50 (8.5)	6 (1.0)	80	666	0.48
平成12年度 第1期	11 (1.9)	273 (46.9)	236 (40.5)	50 (8.6)	12 (2.1)	95	677	0.50
平成13年度 第1期	11 (2.0)	244 (43.5)	239 (42.6)	52 (9.3)	15 (2.7)	105	666	0.51
平成14年度 第1期	9 (1.6)	249 (43.6)	236 (41.3)	60 (10.5)	17 (3.0)	95	666	0.52
平成15年度 第1期	8 (1.5)	227 (42.2)	222 (41.3)	61 (11.3)	20 (3.7)	124	662	0.54
平成16年度 第1期	10 (1.8)	219 (40.4)	231 (42.6)	60 (11.1)	22 (4.1)	103	645	0.55
平成17年度 第1期	11 (2.1)	204 (38.3)	234 (43.9)	59 (11.1)	25 (4.7)	100	633	0.57
平成18年度 第1期	11 (2.1)	175 (33.2)	243 (46.1)	64 (12.1)	34 (6.5)	90	617	0.60
平成19年度 第1期	4 (0.8)	189 (36.7)	213 (41.4)	81 (15.7)	28 (5.4)	86	601	0.59
平成20年度 第1期	7 (1.4)	165 (32.1)	232 (45.1)	86 (16.7)	24 (4.7)	73	587	0.61
平成21年度 第1期	6 (1.2)	147 (30.1)	208 (42.5)	98 (20.0)	30 (6.1)	78	567	0.67
平成22年度 第1期	6 (1.2)	132 (26.7)	231 (46.7)	91 (18.4)	35 (7.1)	64	559	0.70
平成23年度 第1期	3 (0.6)	122 (25.5)	220 (46.0)	84 (17.6)	49 (10.3)	70	548	0.72
平成24年度 第1期	1 (0.2)	104 (22.0)	220 (46.6)	98 (20.8)	49 (10.4)	69	541	0.76
第2期	0 (0.0)	103 (21.9)	210 (44.6)	110 (23.4)	48 (10.2)	67	538	0.79
第3期	1 (0.2)	104 (22.3)	203 (43.5)	105 (22.5)	54 (11.6)	69	536	0.80
第4期	1 (0.2)	87 (20.5)	183 (43.2)	102 (24.1)	51 (12.0)	111	535	0.80
平成25年度 第1期	1 (0.2)	103 (21.7)	217 (45.7)	96 (20.2)	58 (12.2)	57	532	0.75
第2期	1 (0.2)	92 (19.4)	230 (48.4)	95 (20.0)	57 (12.0)	57	532	0.78
第3期	2 (0.4)	82 (17.2)	231 (48.4)	108 (22.6)	54 (11.3)	52	529	0.80
第4期	2 (0.5)	79 (18.5)	196 (46.0)	93 (21.8)	56 (13.1)	103	529	0.80
平成26年度 第1期	2 (0.4)	82 (17.8)	225 (48.8)	96 (20.8)	56 (12.1)	64	525	0.77
第2期	2 (0.4)	84 (18.1)	221 (47.5)	101 (21.7)	57 (12.3)	58	523	0.80
第3期	1 (0.2)	69 (14.9)	224 (48.3)	103 (22.2)	67 (14.4)	58	522	0.82
第4期	2 (0.5)	72 (16.5)	195 (44.6)	110 (25.2)	58 (13.3)	82	519	0.85

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

	身体状況の総合スコア					計	1～3未満 (再掲)
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	不明		
平成5年度 第1期	214 (56.8)	101 (26.8)	50 (13.3)	12 (3.2)	8	385	315 (83.6)
平成6年度 第1期	254 (56.1)	135 (29.8)	51 (11.3)	13 (2.9)	10	463	389 (85.9)
平成7年度 第1期	269 (55.5)	140 (28.9)	61 (12.6)	15 (3.1)	5	490	409 (84.2)
平成8年度 第1期	293 (53.8)	162 (29.7)	75 (13.8)	15 (2.8)	8	553	455 (83.0)
平成9年度 第1期	232 (39.9)	233 (40.0)	110 (18.9)	7 (1.2)	39	621	465 (79.9)
平成10年度 第1期	217 (35.4)	268 (43.7)	121 (19.7)	7 (1.1)	45	658	485 (79.1)
平成11年度 第1期	217 (34.3)	247 (39.0)	157 (24.8)	12 (1.9)	33	666	464 (73.3)
平成12年度 第1期	197 (31.2)	268 (42.4)	156 (24.7)	11 (1.7)	45	677	465 (73.6)
平成13年度 第1期	187 (29.5)	261 (41.2)	175 (27.6)	11 (1.7)	32	666	448 (70.7)
平成14年度 第1期	191 (29.8)	280 (43.6)	157 (24.5)	14 (2.2)	24	666	471 (73.4)
平成15年度 第1期	177 (28.0)	253 (40.0)	184 (29.1)	19 (3.0)	29	662	430 (67.9)
平成16年度 第1期	166 (27.0)	268 (43.6)	160 (26.1)	20 (3.3)	31	645	434 (70.7)
平成17年度 第1期	160 (26.7)	257 (42.8)	168 (28.0)	15 (2.5)	33	633	417 (69.5)
平成18年度 第1期	157 (26.1)	241 (40.1)	183 (30.4)	20 (3.3)	16	617	398 (66.1)
平成19年度 第1期	154 (26.7)	240 (41.6)	163 (28.2)	20 (3.5)	24	601	394 (68.3)
平成20年度 第1期	151 (26.5)	233 (40.9)	162 (28.4)	24 (4.2)	17	587	384 (67.4)
平成21年度 第1期	137 (25.0)	230 (42.0)	168 (30.7)	12 (2.2)	20	567	367 (67.0)
平成22年度 第1期	143 (26.3)	216 (39.8)	165 (30.4)	19 (3.5)	16	559	359 (66.1)
平成23年度 第1期	137 (25.8)	219 (41.2)	152 (28.6)	24 (4.5)	16	548	356 (66.9)
平成24年度 第1期	144 (27.6)	205 (39.3)	160 (30.7)	13 (2.5)	19	541	349 (66.6)
第2期	148 (28.6)	194 (37.5)	157 (30.4)	18 (3.5)	21	538	342 (65.9)
第3期	151 (29.0)	186 (35.7)	167 (32.1)	17 (3.3)	15	536	337 (64.4)
第4期	150 (29.0)	187 (36.1)	167 (32.2)	14 (2.7)	17	535	337 (64.8)
平成25年度 第1期	133 (26.1)	206 (40.5)	156 (30.6)	14 (2.8)	23	532	339 (66.5)
第2期	140 (27.6)	186 (36.6)	165 (32.5)	17 (3.3)	24	532	326 (64.2)
第3期	138 (27.3)	187 (37.0)	162 (32.0)	19 (3.8)	23	529	325 (64.2)
第4期	138 (26.8)	189 (36.7)	167 (32.4)	21 (4.1)	14	529	327 (63.5)
平成26年度 第1期	141 (27.4)	199 (38.6)	162 (31.5)	13 (2.5)	10	525	340 (66.0)
第2期	138 (27.1)	188 (36.9)	169 (33.1)	15 (2.9)	13	523	326 (63.9)
第3期	144 (27.9)	179 (34.7)	175 (33.9)	18 (3.5)	6	522	323 (62.6)
第4期	140 (27.5)	183 (36.0)	166 (32.6)	20 (3.9)	10	519	323 (63.5)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4~8)	不明		
平成5年度 第1期	236 (66.5)	86 (24.2)	19 (5.4)	14 (3.9)	30	385	322 (90.7)
平成6年度 第1期	280 (67.8)	90 (21.8)	22 (5.3)	21 (5.1)	50	463	370 (89.6)
平成7年度 第1期	287 (66.3)	103 (23.8)	17 (3.9)	26 (6.0)	57	490	390 (90.1)
平成8年度 第1期	330 (66.8)	110 (22.3)	28 (5.7)	26 (5.3)	59	553	440 (89.1)
平成9年度 第1期	236 (43.5)	159 (29.3)	75 (13.8)	73 (13.4)	78	621	395 (72.7)
平成10年度 第1期	230 (40.4)	181 (31.8)	88 (15.4)	71 (12.5)	88	658	411 (72.1)
平成11年度 第1期	224 (37.9)	199 (33.7)	83 (14.0)	85 (14.4)	75	666	423 (71.6)
平成12年度 第1期	202 (34.9)	197 (34.1)	88 (15.2)	91 (15.7)	99	677	399 (69.0)
平成13年度 第1期	196 (33.9)	196 (33.9)	99 (17.1)	88 (15.2)	87	666	392 (67.7)
平成14年度 第1期	192 (32.5)	205 (34.7)	106 (17.9)	88 (14.9)	75	666	397 (67.2)
平成15年度 第1期	176 (30.5)	186 (32.2)	121 (21.0)	94 (16.3)	85	662	362 (62.7)
平成16年度 第1期	171 (28.0)	191 (31.3)	139 (22.7)	110 (18.0)	34	645	362 (59.2)
平成17年度 第1期	173 (29.1)	191 (32.1)	117 (19.7)	114 (19.2)	38	633	364 (61.2)
平成18年度 第1期	155 (25.1)	186 (30.1)	124 (20.1)	123 (19.9)	29	617	341 (55.3)
平成19年度 第1期	153 (27.0)	182 (32.1)	124 (21.9)	108 (19.0)	34	601	335 (59.1)
平成20年度 第1期	145 (25.5)	175 (30.8)	140 (24.6)	109 (19.2)	18	587	320 (56.2)
平成21年度 第1期	143 (26.4)	165 (30.5)	135 (25.0)	98 (18.1)	26	567	308 (56.9)
平成22年度 第1期	140 (25.7)	167 (30.6)	122 (22.4)	116 (21.3)	14	559	307 (56.3)
平成23年度 第1期	138 (26.1)	159 (30.1)	122 (23.1)	109 (20.6)	20	548	297 (56.3)
平成24年度 第1期	139 (26.7)	151 (29.0)	120 (23.0)	111 (21.3)	20	541	290 (55.7)
第2期	138 (26.7)	142 (27.5)	125 (24.2)	111 (21.5)	22	538	280 (54.3)
第3期	132 (25.8)	147 (28.7)	116 (22.7)	117 (22.9)	24	536	279 (54.5)
第4期	131 (25.3)	148 (28.6)	120 (23.2)	118 (22.8)	18	535	279 (54.0)
平成25年度 第1期	129 (25.3)	143 (28.1)	123 (24.2)	114 (22.4)	23	532	272 (53.4)
第2期	131 (25.8)	134 (26.4)	129 (25.4)	113 (22.3)	25	532	265 (52.3)
第3期	128 (25.3)	135 (26.7)	131 (25.9)	112 (22.1)	23	529	263 (52.0)
第4期	132 (25.9)	134 (26.3)	125 (24.6)	118 (23.2)	20	529	266 (52.3)
平成26年度 第1期	126 (24.7)	142 (27.8)	121 (23.7)	122 (23.9)	14	525	268 (52.4)
第2期	121 (23.8)	136 (26.8)	127 (25.0)	124 (24.4)	15	523	257 (50.6)
第3期	125 (24.8)	133 (26.4)	115 (22.8)	131 (26.0)	18	522	258 (51.2)
第4期	127 (25.1)	136 (26.9)	119 (23.6)	123 (24.4)	14	519	263 (52.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

	HIV-RNA 量					計	中央値
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	不明		
平成9年度 第1期	109 (30.0)	30 (8.3)	112 (30.9)	112 (30.9)	258	621	2600
平成10年度 第1期	207 (38.3)	71 (13.1)	161 (29.8)	102 (18.9)	117	658	930
平成11年度 第1期	284 (48.6)	52 (8.9)	161 (27.6)	87 (14.9)	82	666	435
平成12年度 第1期	325 (55.1)	48 (8.1)	135 (22.9)	82 (13.9)	87	677	400 未満
平成13年度 第1期	346 (59.9)	39 (6.7)	118 (20.4)	75 (13.0)	88	666	400 未満
平成14年度 第1期	356 (60.4)	48 (8.1)	113 (19.2)	72 (12.2)	77	666	400 未満
平成15年度 第1期	353 (62.5)	34 (6.0)	93 (16.5)	85 (15.0)	97	662	400 未満
平成16年度 第1期	371 (64.0)	40 (6.9)	86 (14.8)	83 (14.3)	65	645	400 未満
平成17年度 第1期	379 (68.7)	24 (4.3)	71 (12.9)	78 (14.1)	81	633	400 未満
平成18年度 第1期	410 (73.5)	29 (5.2)	68 (12.2)	51 (9.1)	59	617	400 未満
平成19年度 第1期	414 (76.2)	27 (5.0)	51 (9.4)	51 (9.4)	58	601	400 未満
平成20年度 第1期	415 (77.9)	37 (6.9)	44 (8.3)	37 (6.9)	54	587	400 未満
平成21年度 第1期	443 (84.9)	16 (3.1)	32 (6.1)	31 (5.9)	45	567	400 未満
平成22年度 第1期	467 (90.0)	8 (1.5)	33 (6.4)	11 (2.1)	40	559	400 未満
平成23年度 第1期	460 (90.0)	13 (2.5)	23 (4.5)	15 (2.9)	37	548	400 未満
平成24年度 第1期	461 (91.5)	10 (2.0)	18 (3.6)	15 (3.0)	37	541	400 未満
第2期	469 (92.7)	10 (2.0)	11 (2.2)	16 (3.2)	32	538	400 未満
第3期	472 (93.5)	9 (1.8)	11 (2.2)	13 (2.6)	31	536	400 未満
第4期	421 (93.8)	8 (1.8)	8 (1.8)	12 (2.7)	86	535	400 未満
平成25年度 第1期	470 (94.6)	8 (1.6)	12 (2.4)	7 (1.4)	35	532	400 未満
第2期	472 (95.0)	6 (1.2)	12 (2.4)	7 (1.4)	35	532	400 未満
第3期	483 (96.0)	6 (1.2)	10 (2.0)	4 (0.8)	26	529	400 未満
第4期	437 (96.3)	5 (1.1)	8 (1.8)	4 (0.9)	75	529	400 未満
平成26年度 第1期	469 (96.1)	4 (0.8)	13 (2.7)	2 (0.4)	37	525	400 未満
第2期	472 (95.5)	8 (1.6)	8 (1.6)	6 (1.2)	29	523	400 未満
第3期	471 (95.0)	7 (1.4)	13 (2.6)	5 (1.0)	26	522	400 未満
第4期	430 (95.1)	4 (0.9)	14 (3.1)	4 (0.9)	67	519	400 未満

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分								計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	その他	不明	
平成5年度 第1期	4 (57.1)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	378	385
平成6年度 第1期	128 (39.4)	28 (8.6)	128 (39.4)	41 (12.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	138	463
平成7年度 第1期	128 (34.0)	39 (10.4)	147 (39.1)	62 (16.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	114	490
平成8年度 第1期	133 (32.0)	33 (8.0)	155 (37.3)	93 (22.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	138	553
平成9年度 第1期	132 (23.7)	20 (3.6)	58 (10.4)	220 (39.5)	92 (16.5)	0 (0.0)	35 (6.3)	64	621
平成10年度 第1期	128 (21.1)	31 (5.1)	24 (3.9)	168 (27.6)	229 (37.7)	2 (0.3)	26 (4.3)	50	658
平成11年度 第1期	126 (20.2)	30 (4.8)	17 (2.7)	125 (20.1)	299 (48.0)	6 (1.0)	20 (3.2)	43	666
平成12年度 第1期	119 (19.2)	41 (6.6)	12 (1.9)	96 (15.5)	279 (44.9)	34 (5.5)	40 (6.4)	56	677
平成13年度 第1期	98 (16.3)	33 (5.5)	12 (2.0)	83 (13.8)	275 (45.6)	63 (10.4)	39 (6.5)	63	666
平成14年度 第1期	113 (17.9)	51 (8.1)	6 (1.0)	77 (12.2)	251 (39.8)	90 (14.3)	42 (6.7)	36	666
平成15年度 第1期	100 (16.6)	63 (10.4)	4 (0.7)	66 (10.9)	223 (36.9)	97 (16.1)	51 (8.4)	58	662
平成16年度 第1期	107 (17.0)	67 (10.6)	4 (0.6)	58 (9.2)	239 (37.9)	111 (17.6)	45 (7.1)	14	645
平成17年度 第1期	98 (16.0)	65 (10.6)	3 (0.5)	54 (8.8)	229 (37.4)	111 (18.1)	53 (8.6)	20	633
平成18年度 第1期	91 (15.2)	60 (10.1)	5 (0.8)	39 (6.5)	241 (40.4)	114 (19.1)	47 (7.9)	20	617
平成19年度 第1期	76 (13.1)	45 (7.7)	3 (0.5)	31 (5.3)	267 (45.9)	113 (19.4)	47 (8.1)	19	601
平成20年度 第1期	70 (12.2)	33 (5.7)	2 (0.3)	29 (5.0)	275 (47.7)	112 (19.4)	55 (9.5)	11	587
平成21年度 第1期	63 (11.2)	28 (5.0)	1 (0.2)	22 (3.9)	243 (43.3)	111 (19.8)	93 (16.6)	6	567
平成22年度 第1期	54 (9.8)	26 (4.7)	1 (0.2)	17 (3.1)	212 (38.4)	108 (19.6)	134 (24.3)	7	559
平成23年度 第1期	47 (8.6)	26 (4.8)	1 (0.2)	14 (2.6)	188 (34.4)	99 (18.1)	171 (31.3)	2	548
平成24年度 第1期	39 (7.4)	16 (3.0)	0 (0.0)	13 (2.5)	164 (31.0)	87 (16.4)	210 (39.7)	12	541
第2期	38 (7.2)	14 (2.6)	0 (0.0)	11 (2.1)	154 (29.1)	88 (16.6)	224 (42.3)	9	538
第3期	37 (7.0)	12 (2.3)	0 (0.0)	12 (2.3)	144 (27.3)	88 (16.7)	235 (44.5)	8	536
第4期	33 (6.3)	12 (2.3)	0 (0.0)	11 (2.1)	140 (26.6)	92 (17.5)	238 (45.2)	9	535
平成25年度 第1期	30 (5.7)	12 (2.3)	0 (0.0)	9 (1.7)	129 (24.6)	90 (17.1)	255 (48.6)	7	532
第2期	27 (5.2)	10 (1.9)	0 (0.0)	8 (1.5)	124 (23.7)	90 (17.2)	265 (50.6)	8	532
第3期	26 (5.0)	9 (1.7)	0 (0.0)	8 (1.5)	117 (22.5)	89 (17.1)	271 (52.1)	9	529
第4期	25 (4.8)	12 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.3)	114 (22.0)	85 (16.4)	276 (53.2)	10	529
平成26年度 第1期	24 (4.6)	10 (1.9)	0 (0.0)	8 (1.5)	118 (22.7)	82 (15.8)	277 (53.4)	6	525
第2期	24 (4.6)	9 (1.7)	0 (0.0)	9 (1.7)	97 (18.7)	74 (14.3)	305 (58.9)	5	523
第3期	24 (4.6)	9 (1.7)	0 (0.0)	9 (1.7)	89 (17.1)	70 (13.5)	318 (61.3)	3	522
第4期	24 (4.7)	9 (1.8)	0 (0.0)	10 (1.9)	80 (15.6)	69 (13.4)	322 (62.6)	5	519

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

	服 用 状 況						投与 なし	投与 不明	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明			
平成9年度 第1期	301 (78.6)	45 (11.7)	25 (6.5)	8 (2.1)	4 (1.0)	22	152	64	621
平成10年度 第1期	346 (79.9)	57 (13.2)	21 (4.8)	6 (1.4)	3 (0.7)	16	159	50	658
平成11年度 第1期	377 (84.0)	54 (12.0)	12 (2.7)	6 (1.3)	0 (0.0)	18	156	43	666
平成12年度 第1期	376 (86.0)	39 (8.9)	14 (3.2)	8 (1.8)	0 (0.0)	24	160	56	677
平成13年度 第1期	378 (85.3)	43 (9.7)	14 (3.2)	7 (1.6)	1 (0.2)	29	131	63	666
平成14年度 第1期	388 (87.8)	34 (7.7)	14 (3.2)	6 (1.4)	0 (0.0)	24	164	36	666
平成15年度 第1期	380 (89.6)	32 (7.5)	9 (2.1)	3 (0.7)	0 (0.0)	17	163	58	662
平成16年度 第1期	403 (88.4)	34 (7.5)	9 (2.0)	5 (1.1)	5 (1.1)	1	174	14	645
平成17年度 第1期	407 (90.8)	20 (4.5)	10 (2.2)	6 (1.3)	5 (1.1)	2	163	20	633
平成18年度 第1期	406 (91.0)	21 (4.7)	12 (2.7)	6 (1.3)	1 (0.2)	0	151	20	617
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	121	19	601
平成20年度 第1期	439 (93.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.6)	4	103	11	587
平成21年度 第1期	438 (93.8)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	91	6	567
平成22年度 第1期	438 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	80	7	559
平成23年度 第1期	453 (96.4)	9 (1.9)	5 (1.1)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	73	2	548
平成24年度 第1期	458 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	55	12	541
第2期	461 (96.6)	11 (2.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	52	9	538
第3期	465 (97.1)	9 (1.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	49	8	536
第4期	467 (97.1)	9 (1.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	0	45	9	535
平成25年度 第1期	470 (97.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	42	7	532
第2期	471 (96.7)	6 (1.2)	4 (0.8)	1 (0.2)	5 (1.0)	0	37	8	532
第3期	471 (97.1)	5 (1.0)	3 (0.6)	3 (0.6)	3 (0.6)	0	35	9	529
第4期	468 (97.1)	7 (1.5)	1 (0.2)	2 (0.4)	4 (0.8)	0	37	10	529
平成26年度 第1期	466 (96.3)	17 (3.5)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	34	6	525
第2期	467 (96.5)	14 (2.9)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	33	5	523
第3期	466 (96.1)	14 (2.9)	4 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	33	3	522
第4期	460 (96.4)	15 (3.1)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	33	5	519

(): 各行の計より投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度第1期	93 (23.0)	—	—	405	42 (10.4)	16 (4.0)	9 (2.2)	12 (3.0)
平成10年度第1期	127 (28.3)	—	—	449	45 (10.0)	49 (10.9)	7 (1.6)	6 (1.3)
平成11年度第1期	139 (29.8)	—	—	467	37 (7.9)	82 (17.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
平成12年度第1期	141 (30.6)	—	—	461	30 (6.5)	88 (19.1)	9 (2.0)	8 (1.7)
平成13年度第1期	143 (30.3)	—	—	472	30 (6.4)	80 (16.9)	5 (1.1)	5 (1.1)
平成14年度第1期	145 (31.1)	—	—	466	27 (5.8)	75 (16.1)	3 (0.6)	8 (1.7)
平成15年度第1期	143 (32.4)	—	—	441	26 (5.9)	59 (13.4)	3 (0.7)	5 (1.1)
平成16年度第1期	175 (38.3)	274 (60.0)	8 (1.8)	457	28 (6.1)	67 (14.7)	5 (1.1)	12 (2.6)
平成17年度第1期	166 (36.9)	271 (60.2)	13 (2.9)	450	25 (5.6)	60 (13.3)	4 (0.9)	13 (2.9)
平成18年度第1期	156 (35.0)	261 (58.5)	29 (6.5)	446	22 (4.9)	59 (13.2)	7 (1.6)	12 (2.7)
平成19年度第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
平成20年度第1期	149 (31.5)	306 (64.7)	18 (3.8)	473	20 (4.2)	32 (6.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成21年度第1期	130 (27.7)	323 (68.7)	17 (3.6)	470	12 (2.6)	27 (5.7)	3 (0.6)	9 (1.9)
平成22年度第1期	130 (27.5)	332 (70.3)	10 (2.1)	472	15 (3.2)	25 (5.3)	1 (0.2)	7 (1.5)
平成23年度第1期	126 (26.6)	330 (69.8)	17 (3.6)	473	15 (3.2)	18 (3.8)	2 (0.4)	4 (0.8)
平成24年度第1期	111 (23.4)	352 (74.3)	11 (2.3)	474	13 (2.7)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
第2期	112 (23.5)	353 (74.0)	12 (2.5)	477	12 (2.5)	17 (3.6)	5 (1.0)	10 (2.1)
第3期	107 (22.3)	357 (74.5)	15 (3.1)	479	15 (3.1)	17 (3.5)	4 (0.8)	9 (1.9)
第4期	105 (21.8)	362 (75.3)	14 (2.9)	481	14 (2.9)	18 (3.7)	5 (1.0)	10 (2.1)
平成25年度第1期	103 (21.3)	371 (76.8)	9 (1.9)	483	8 (1.7)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)
第2期	103 (21.1)	373 (76.6)	11 (2.3)	487	10 (2.1)	16 (3.3)	2 (0.4)	8 (1.6)
第3期	104 (21.4)	371 (76.5)	10 (2.1)	485	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.2)
第4期	104 (21.6)	368 (76.3)	10 (2.1)	482	7 (1.5)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)
平成26年度第1期	75 (15.5)	395 (81.4)	15 (3.1)	485	7 (1.4)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
第2期	74 (15.3)	398 (82.1)	13 (2.7)	485	7 (1.4)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
第3期	72 (14.8)	400 (82.3)	14 (2.9)	486	8 (1.6)	15 (3.1)	4 (0.8)	1 (0.2)
第4期	71 (14.8)	394 (81.9)	16 (3.3)	481	7 (1.5)	14 (2.9)	4 (0.8)	1 (0.2)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-3-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (各時点の事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	9 (2.2)	9 (2.2)	9 (2.2)	5 (1.2)	—	—	—	20 (4.9)
平成10年度 第1期	11 (2.4)	10 (2.2)	13 (2.9)	12 (2.7)	—	—	—	31 (6.9)
平成11年度 第1期	4 (0.9)	15 (3.2)	7 (1.5)	6 (1.3)	—	—	—	23 (4.9)
平成12年度 第1期	2 (0.4)	10 (2.2)	7 (1.5)	9 (2.0)	—	—	—	24 (5.2)
平成13年度 第1期	3 (0.6)	11 (2.3)	7 (1.5)	7 (1.5)	—	—	—	34 (7.2)
平成14年度 第1期	4 (0.9)	14 (3.0)	7 (1.5)	2 (0.4)	19 (4.1)	18 (3.9)	—	19 (4.1)
平成15年度 第1期	4 (0.9)	15 (3.4)	4 (0.9)	6 (1.4)	25 (5.7)	47 (10.7)	—	17 (3.9)
平成16年度 第1期	3 (0.7)	18 (3.9)	12 (2.6)	11 (2.4)	20 (4.4)	51 (11.2)	—	33 (7.2)
平成17年度 第1期	2 (0.4)	16 (3.6)	7 (1.6)	11 (2.4)	29 (6.4)	41 (9.1)	—	37 (8.2)
平成18年度 第1期	4 (0.9)	12 (2.7)	12 (2.7)	8 (1.8)	18 (4.0)	42 (9.4)	21 (4.7)	26 (5.8)
平成19年度 第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
平成20年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	21 (4.4)	44 (9.3)	29 (6.1)	30 (6.3)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.5)	27 (5.7)	26 (5.5)
平成22年度 第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.4)	28 (5.9)	20 (4.2)
平成23年度 第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.5)	24 (5.1)	19 (4.0)
平成24年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.2)	15 (3.2)	20 (4.2)
第2期	4 (0.8)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.2)	13 (2.7)	21 (4.4)
第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.1)	11 (2.3)	19 (4.0)
第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.2)	5 (1.0)	11 (2.3)	40 (8.3)	11 (2.3)	17 (3.5)
平成25年度 第1期	2 (0.4)	6 (1.2)	6 (1.2)	5 (1.0)	12 (2.5)	43 (8.9)	17 (3.5)	17 (3.5)
第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.2)	6 (1.2)	13 (2.7)	43 (8.8)	17 (3.5)	18 (3.7)
第3期	3 (0.6)	7 (1.4)	5 (1.0)	7 (1.4)	11 (2.3)	42 (8.7)	16 (3.3)	22 (4.5)
第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.0)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.7)	14 (2.9)	18 (3.7)
平成26年度 第1期	4 (0.8)	6 (1.2)	3 (0.6)	4 (0.8)	13 (2.7)	32 (6.6)	8 (1.6)	14 (2.9)
第2期	4 (0.8)	6 (1.2)	4 (0.8)	5 (1.0)	13 (2.7)	32 (6.6)	7 (1.4)	13 (2.7)
第3期	4 (0.8)	6 (1.2)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.3)	32 (6.6)	6 (1.2)	13 (2.7)
第4期	4 (0.8)	6 (1.2)	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	31 (6.4)	5 (1.0)	14 (2.9)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	C D 4 値						計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡	
								含　む	含まず
平成5年度　第4期	8　(2.0)	125　(31.3)	118　(29.5)	96　(24.0)	53　(13.3)	17	417	287	289
平成6年度　第1期	15　(5.0)	92　(30.6)	90　(29.9)	61　(20.3)	43　(14.3)	116	417	276	288
平成7年度　第1期	64　(18.7)	93　(27.2)	78　(22.8)	65　(19.0)	42　(12.3)	75	417	233	293
平成8年度　第1期	99　(28.1)	76　(21.6)	79　(22.4)	62　(17.6)	36　(10.2)	65	417	203	302
平成9年度　第1期	114　(29.8)	77　(20.1)	79　(20.6)	70　(18.3)	43　(11.2)	34	417	206	307
平成10年度　第1期	121　(31.5)	60　(15.6)	81　(21.1)	69　(18.0)	53　(13.8)	33	417	220	340
平成11年度　第1期	129　(33.0)	39　(10.0)	86　(22.0)	79　(20.2)	58　(14.8)	26	417	251	364
平成12年度　第1期	135　(33.8)	33　(8.3)	88　(22.1)	72　(18.0)	71　(17.8)	18	417	271	368
平成13年度　第1期	141　(36.2)	32　(8.2)	68　(17.5)	79　(20.3)	69　(17.7)	28	417	243	390
平成14年度　第1期	148　(38.0)	26　(6.7)	75　(19.3)	61　(15.7)	79　(20.3)	28	417	247	392
平成15年度　第1期	157　(40.4)	33　(8.5)	66　(17.0)	63　(16.2)	70　(18.0)	28	417	221	399
平成16年度　第1期	163　(40.8)	30　(7.5)	67　(16.8)	72　(18.0)	68　(17.0)	17	417	222	400
平成17年度　第1期	173　(44.0)	24　(6.1)	59　(15.0)	61　(15.5)	76　(19.3)	24	417	196	407
平成18年度　第1期	180　(45.2)	33　(8.3)	64　(16.1)	45　(11.3)	76　(19.1)	19	417	166	377
平成19年度　第1期	187　(46.9)	24　(6.0)	67　(16.8)	54　(13.5)	67　(16.8)	18	417	151	380
平成20年度　第1期	198　(49.0)	30　(7.4)	53　(13.1)	69　(17.1)	54　(13.4)	13	417	67	397
平成21年度　第1期	205　(50.9)	14　(3.5)	55　(13.6)	51　(12.7)	78　(19.4)	14	417	*	419
平成22年度　第1期	208　(51.5)	22　(5.4)	49　(12.1)	57　(14.1)	68　(16.8)	13	417	*	412
平成23年度　第1期	218　(54.0)	17　(4.2)	49　(12.1)	56　(13.9)	64　(15.8)	13	417	*	442
平成24年度　第1期 第2期 第3期 第4期	220　(54.9)	10　(2.5)	48　(12.0)	54　(13.5)	69　(17.2)	16	417	*	457
	220　(54.3)	13　(3.2)	48　(11.9)	53　(13.1)	71　(17.5)	12	417	*	440
	220　(54.5)	9　(2.2)	50　(12.4)	43　(10.6)	82　(20.3)	13	417	*	465
	222　(58.0)	14　(3.7)	43　(11.2)	39　(10.2)	65　(17.0)	34	417	*	447
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	222　(55.1)	15　(3.7)	44　(10.9)	43　(10.7)	79　(19.6)	14	417	*	463
	223　(54.9)	13　(3.2)	36　(8.9)	59　(14.5)	75　(18.5)	11	417	*	445
	223　(55.2)	18　(4.5)	37　(9.2)	47　(11.6)	79　(19.6)	13	417	*	467
	225　(57.0)	14　(3.5)	37　(9.4)	46　(11.6)	73　(18.5)	22	417	*	448
平成26年度　第1期 第2期 第3期 第4期	225　(55.4)	14　(3.4)	35　(8.6)	48　(11.8)	84　(20.7)	11	417	*	452
	226　(55.9)	15　(3.7)	33　(8.2)	45　(11.1)	85　(21.0)	13	417	*	483
	228　(55.9)	12　(2.9)	29　(7.1)	44　(10.8)	95　(23.3)	9	417	*	517
	228　(56.9)	11　(2.7)	27　(6.7)	50　(12.5)	85　(21.2)	16	417	*	490

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	CD4/CD8比							計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明		AIDS発病・死亡	
									含む	含まず
平成5年度 第4期	8 (2.0)	39 (9.9)	227 (57.9)	106 (27.0)	11 (2.8)	1 (0.3)	25	417	0.33	0.33
平成6年度 第1期	15 (5.1)	41 (13.9)	153 (51.7)	80 (27.0)	4 (1.4)	3 (1.0)	121	417	0.30	0.31
平成7年度 第1期	64 (18.7)	30 (8.8)	153 (44.7)	88 (25.7)	7 (2.0)	0 (0.0)	75	417	0.26	0.35
平成8年度 第1期	99 (28.1)	33 (9.4)	146 (41.5)	70 (19.9)	4 (1.1)	0 (0.0)	65	417	0.20	0.34
平成9年度 第1期	114 (30.2)	16 (4.2)	150 (39.7)	91 (24.1)	7 (1.9)	0 (0.0)	39	417	0.26	0.40
平成10年度 第1期	121 (31.7)	12 (3.1)	131 (34.3)	104 (27.2)	12 (3.1)	2 (0.5)	35	417	0.28	0.45
平成11年度 第1期	129 (33.9)	12 (3.1)	123 (32.3)	96 (25.2)	19 (5.0)	2 (0.5)	36	417	0.29	0.48
平成12年度 第1期	135 (34.5)	6 (1.5)	120 (30.7)	102 (26.1)	21 (5.4)	7 (1.8)	26	417	0.34	0.50
平成13年度 第1期	141 (37.3)	4 (1.1)	103 (27.2)	102 (27.0)	26 (6.9)	2 (0.5)	39	417	0.30	0.53
平成14年度 第1期	148 (39.2)	1 (0.3)	98 (25.9)	98 (25.9)	27 (7.1)	6 (1.6)	39	417	0.31	0.53
平成15年度 第1期	157 (42.1)	2 (0.5)	90 (24.1)	87 (23.3)	30 (8.0)	7 (1.9)	44	417	0.28	0.56
平成16年度 第1期	163 (43.5)	3 (0.8)	84 (22.4)	90 (24.0)	27 (7.2)	8 (2.1)	42	417	0.25	0.55
平成17年度 第1期	173 (45.8)	4 (1.1)	72 (19.0)	95 (25.1)	24 (6.3)	10 (2.6)	39	417	0.21	0.58
平成18年度 第1期	180 (46.5)	5 (1.3)	63 (16.3)	106 (27.4)	20 (5.2)	13 (3.4)	30	417	0.17	0.64
平成19年度 第1期	187 (48.7)	1 (0.3)	62 (16.1)	87 (22.7)	32 (8.3)	15 (3.9)	33	417	0.16	0.64
平成20年度 第1期	198 (50.5)	4 (1.0)	56 (14.3)	86 (21.9)	36 (9.2)	12 (3.1)	25	417	*	0.68
平成21年度 第1期	205 (53.5)	2 (0.5)	47 (12.3)	73 (19.1)	45 (11.7)	11 (2.9)	34	417	*	0.71
平成22年度 第1期	208 (52.8)	2 (0.5)	51 (12.9)	83 (21.1)	39 (9.9)	11 (2.8)	23	417	*	0.74
平成23年度 第1期	218 (55.6)	2 (0.5)	38 (9.7)	79 (20.2)	34 (8.7)	21 (5.4)	25	417	*	0.77
平成24年度 第1期	220 (56.1)	0 (0.0)	35 (8.9)	68 (17.3)	47 (12.0)	22 (5.6)	25	417	*	0.85
第2期	220 (55.4)	0 (0.0)	34 (8.6)	73 (18.4)	52 (13.1)	18 (4.5)	20	417	*	0.81
第3期	220 (56.1)	0 (0.0)	35 (8.9)	72 (18.4)	39 (9.9)	26 (6.6)	25	417	*	0.85
第4期	222 (59.5)	0 (0.0)	24 (6.4)	66 (17.7)	38 (10.2)	23 (6.2)	44	417	*	0.83
平成25年度 第1期	222 (55.9)	1 (0.3)	32 (8.1)	78 (19.6)	41 (10.3)	23 (5.8)	20	417	*	0.80
第2期	223 (56.2)	1 (0.3)	30 (7.6)	83 (20.9)	39 (9.8)	21 (5.3)	20	417	*	0.79
第3期	223 (56.3)	1 (0.3)	25 (6.3)	82 (20.7)	42 (10.6)	23 (5.8)	21	417	*	0.81
第4期	225 (58.3)	2 (0.5)	29 (7.5)	67 (17.4)	37 (9.6)	26 (6.7)	31	417	*	0.88
平成26年度 第1期	225 (56.5)	2 (0.5)	27 (6.8)	80 (20.1)	45 (11.3)	19 (4.8)	19	417	*	0.82
第2期	226 (56.6)	1 (0.3)	32 (8.0)	76 (19.0)	43 (10.8)	21 (5.3)	18	417	*	0.81
第3期	228 (56.7)	1 (0.2)	30 (7.5)	70 (17.4)	44 (10.9)	29 (7.2)	15	417	*	0.84
第4期	228 (58.0)	1 (0.3)	29 (7.4)	67 (17.0)	50 (12.7)	18 (4.6)	24	417	*	0.86

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）			
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	AIDS 発病・ 死亡	不明		人数	AIDS 発病・死亡		
									含 む	含まず	
平成5年度 第4期	234 (56.8)	106 (25.7)	55 (13.3)	9 (2.2)	8 (1.9)	5	417	340	(82.5)	(84.2)	
平成6年度 第1期	220 (53.9)	118 (28.9)	45 (11.0)	10 (2.5)	15 (3.7)	9	417	338	(82.8)	(86.0)	
平成7年度 第1期	197 (47.5)	97 (23.4)	49 (11.8)	8 (1.9)	64 (15.4)	2	417	294	(70.8)	(83.8)	
平成8年度 第1期	163 (39.3)	97 (23.4)	47 (11.3)	9 (2.2)	99 (23.9)	2	417	260	(62.7)	(82.3)	
平成9年度 第1期	110 (27.4)	112 (27.9)	61 (15.2)	4 (1.0)	114 (28.4)	16	417	222	(55.4)	(77.4)	
平成10年度 第1期	91 (23.1)	113 (28.7)	63 (16.0)	6 (1.5)	121 (30.7)	23	417	204	(51.8)	(74.7)	
平成11年度 第1期	91 (22.4)	103 (25.4)	74 (18.2)	9 (2.2)	129 (31.8)	11	417	194	(47.8)	(70.0)	
平成12年度 第1期	81 (20.0)	110 (27.2)	72 (17.8)	6 (1.5)	135 (33.4)	13	417	191	(47.3)	(71.0)	
平成13年度 第1期	80 (19.8)	98 (24.2)	77 (19.0)	9 (2.2)	141 (34.8)	12	417	178	(44.0)	(67.4)	
平成14年度 第1期	71 (17.4)	110 (27.0)	69 (16.9)	10 (2.5)	148 (36.3)	9	417	181	(44.4)	(69.6)	
平成15年度 第1期	62 (15.3)	95 (23.4)	80 (19.7)	12 (3.0)	157 (38.7)	11	417	157	(38.7)	(63.1)	
平成16年度 第1期	62 (15.2)	98 (24.1)	70 (17.2)	14 (3.4)	163 (40.0)	10	417	160	(39.3)	(65.6)	
平成17年度 第1期	68 (16.6)	89 (21.8)	70 (17.1)	9 (2.2)	173 (42.3)	8	417	157	(38.4)	(66.5)	
平成18年度 第1期	62 (15.3)	85 (20.9)	68 (16.7)	11 (2.7)	180 (44.3)	11	417	147	(36.2)	(65.0)	
平成19年度 第1期	57 (14.0)	91 (22.4)	60 (14.7)	12 (2.9)	187 (45.9)	10	417	148	(36.4)	(67.3)	
平成20年度 第1期	52 (12.6)	90 (21.8)	64 (15.5)	9 (2.2)	198 (47.9)	4	417	142	(34.4)	(66.0)	
平成21年度 第1期	53 (13.0)	79 (19.3)	64 (15.6)	8 (2.0)	205 (50.1)	8	417	132	(32.3)	(64.7)	
平成22年度 第1期	55 (13.4)	75 (18.3)	63 (15.4)	9 (2.2)	208 (50.7)	7	417	130	(31.7)	(64.4)	
平成23年度 第1期	49 (11.9)	73 (17.8)	61 (14.8)	10 (2.4)	218 (53.0)	6	417	122	(29.7)	(63.2)	
平成24年度	第1期	51 (12.4)	73 (17.8)	60 (14.6)	7 (1.7)	220 (53.5)	6	417	124	(30.2)	(64.9)
	第2期	56 (13.7)	67 (16.3)	59 (14.4)	8 (2.0)	220 (53.7)	7	417	123	(30.0)	(64.7)
	第3期	57 (13.8)	59 (14.3)	68 (16.5)	9 (2.2)	220 (53.3)	4	417	116	(28.1)	(60.1)
	第4期	55 (13.4)	61 (14.8)	65 (15.8)	8 (1.9)	222 (54.0)	6	417	116	(28.2)	(61.4)
平成25年度	第1期	48 (11.8)	73 (17.9)	58 (14.2)	7 (1.7)	222 (54.4)	9	417	121	(29.7)	(65.1)
	第2期	51 (12.4)	65 (15.9)	64 (15.6)	7 (1.7)	223 (54.4)	7	417	116	(28.3)	(62.0)
	第3期	49 (12.1)	61 (15.0)	66 (16.3)	7 (1.7)	223 (54.9)	11	417	110	(27.1)	(60.1)
	第4期	48 (11.7)	66 (16.0)	66 (16.0)	7 (1.7)	225 (54.6)	5	417	114	(27.7)	(61.0)
平成26年度	第1期	49 (11.8)	67 (16.2)	68 (16.4)	5 (1.2)	225 (54.3)	3	417	116	(28.0)	(61.4)
	第2期	51 (12.3)	66 (16.0)	64 (15.5)	6 (1.5)	226 (54.7)	4	417	117	(28.3)	(62.6)
	第3期	50 (12.0)	64 (15.4)	68 (16.4)	5 (1.2)	228 (54.9)	2	417	114	(27.5)	(61.0)
	第4期	51 (12.3)	65 (15.7)	63 (15.3)	6 (1.5)	228 (55.2)	4	417	116	(28.1)	(62.7)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	日常生活動作						計	1 および 2 (再掲)		
	1	2	3	4(4～8)	AIDS発病・死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含 む	含まず
平成5年度 第4期	239 (67.1)	85 (23.9)	14 (3.9)	10 (2.8)	8 (2.2)	61	417	324	(91.0)	(93.1)
平成6年度 第1期	247 (66.0)	77 (20.6)	20 (5.3)	15 (4.0)	15 (4.0)	43	417	324	(86.6)	(90.3)
平成7年度 第1期	216 (57.4)	71 (18.9)	12 (3.2)	13 (3.5)	64 (17.0)	41	417	287	(76.3)	(92.0)
平成8年度 第1期	196 (51.4)	58 (15.2)	17 (4.5)	11 (2.9)	99 (26.0)	36	417	254	(66.7)	(90.1)
平成9年度 第1期	110 (28.6)	77 (20.0)	43 (11.2)	41 (10.6)	114 (29.6)	32	417	187	(48.6)	(69.0)
平成10年度 第1期	95 (24.9)	81 (21.3)	48 (12.6)	36 (9.4)	121 (31.8)	36	417	176	(46.2)	(67.7)
平成11年度 第1期	89 (22.9)	89 (22.9)	43 (11.1)	39 (10.0)	129 (33.2)	28	417	178	(45.8)	(68.5)
平成12年度 第1期	83 (21.4)	88 (22.7)	36 (9.3)	46 (11.9)	135 (34.8)	29	417	171	(44.1)	(67.6)
平成13年度 第1期	75 (19.2)	88 (22.5)	45 (11.5)	42 (10.7)	141 (36.1)	26	417	163	(41.7)	(65.2)
平成14年度 第1期	64 (16.3)	91 (23.2)	48 (12.2)	41 (10.5)	148 (37.8)	25	417	155	(39.5)	(63.5)
平成15年度 第1期	62 (15.8)	80 (20.4)	51 (13.0)	42 (10.7)	157 (40.1)	25	417	142	(36.2)	(60.4)
平成16年度 第1期	59 (14.6)	73 (18.0)	64 (15.8)	46 (11.4)	163 (40.2)	12	417	132	(32.6)	(54.5)
平成17年度 第1期	64 (15.8)	68 (16.7)	47 (11.6)	54 (13.3)	173 (42.6)	11	417	132	(32.5)	(56.7)
平成18年度 第1期	51 (12.6)	74 (18.3)	50 (12.3)	50 (12.3)	180 (44.4)	12	417	125	(30.9)	(55.6)
平成19年度 第1期	54 (13.3)	66 (16.3)	55 (13.6)	43 (10.6)	187 (46.2)	12	417	120	(29.6)	(55.0)
平成20年度 第1期	52 (12.6)	59 (14.3)	60 (14.6)	43 (10.4)	198 (48.1)	5	417	111	(26.9)	(51.9)
平成21年度 第1期	48 (11.7)	62 (15.1)	52 (12.7)	43 (10.5)	205 (50.0)	7	417	110	(26.8)	(53.7)
平成22年度 第1期	48 (11.7)	58 (14.1)	54 (13.1)	44 (10.7)	208 (50.5)	5	417	106	(25.7)	(52.0)
平成23年度 第1期	47 (11.5)	59 (14.4)	42 (10.3)	43 (10.5)	218 (53.3)	8	417	106	(25.9)	(55.5)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	47 (11.4)	57 (13.9)	43 (10.5)	44 (10.7)	220 (53.5)	6	417	104	(25.3)	(54.5)
	46 (11.2)	53 (13.0)	45 (11.0)	45 (11.0)	220 (53.8)	8	417	99	(24.2)	(52.4)
	48 (11.8)	49 (12.0)	44 (10.8)	47 (11.5)	220 (53.9)	9	417	97	(23.8)	(51.6)
	47 (11.5)	51 (12.4)	41 (10.0)	49 (12.0)	222 (54.1)	7	417	98	(23.9)	(52.1)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	43 (10.5)	51 (12.5)	42 (10.3)	51 (12.5)	222 (54.3)	8	417	94	(23.0)	(50.3)
	44 (10.8)	47 (11.5)	43 (10.5)	52 (12.7)	223 (54.5)	8	417	91	(22.2)	(48.9)
	45 (11.1)	49 (12.0)	43 (10.6)	47 (11.5)	223 (54.8)	10	417	94	(23.1)	(51.1)
	44 (10.7)	52 (12.6)	39 (9.5)	52 (12.6)	225 (54.6)	5	417	96	(23.3)	(51.3)
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	43 (10.4)	52 (12.6)	40 (9.7)	53 (12.8)	225 (54.5)	4	417	95	(23.0)	(50.5)
	43 (10.4)	45 (10.9)	45 (10.9)	53 (12.9)	226 (54.9)	5	417	88	(21.4)	(47.3)
	45 (11.0)	43 (10.5)	40 (9.8)	54 (13.2)	228 (55.6)	7	417	88	(21.5)	(48.4)
	43 (10.4)	48 (11.6)	41 (9.9)	53 (12.8)	228 (55.2)	4	417	91	(22.0)	(49.2)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	HIV-RNA量							中央値	
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成9年度 第1期	52 (17.6)	18 (6.1)	56 (19.0)	55 (18.6)	114 (38.6)	122	417	32000	2800
平成10年度 第1期	89 (24.5)	36 (9.9)	70 (19.3)	47 (12.9)	121 (33.3)	54	417	6700	900
平成11年度 第1期	132 (34.4)	20 (5.2)	62 (16.1)	41 (10.7)	129 (33.6)	33	417	4250	400未満
平成12年度 第1期	148 (37.6)	17 (4.3)	58 (14.7)	36 (9.1)	135 (34.3)	23	417	3300	400未満
平成13年度 第1期	146 (37.5)	22 (5.7)	50 (12.9)	30 (7.7)	141 (36.2)	28	417	2700	400未満
平成14年度 第1期	147 (37.9)	25 (6.4)	42 (10.8)	26 (6.7)	148 (38.1)	29	417	3000	400未満
平成15年度 第1期	143 (36.9)	15 (3.9)	38 (9.8)	35 (9.0)	157 (40.5)	29	417	7800	400未満
平成16年度 第1期	154 (38.6)	14 (3.5)	32 (8.0)	36 (9.0)	163 (40.9)	18	417	8800	400未満
平成17年度 第1期	152 (39.3)	8 (2.1)	23 (5.9)	31 (8.0)	173 (44.7)	30	417	24000	400未満
平成18年度 第1期	163 (41.1)	15 (3.8)	26 (6.5)	13 (3.3)	180 (45.3)	20	417	7200	400未満
平成19年度 第1期	164 (41.1)	11 (2.8)	19 (4.8)	18 (4.5)	187 (46.9)	18	417	17000	400未満
平成20年度 第1期	169 (42.0)	10 (2.5)	12 (3.0)	13 (3.2)	198 (49.3)	15	417	100000	400未満
平成21年度 第1期	173 (43.1)	4 (1.0)	8 (2.0)	11 (2.7)	205 (51.1)	16	417	*	400未満
平成22年度 第1期	179 (44.3)	1 (0.2)	12 (3.0)	4 (1.0)	208 (51.5)	13	417	*	400未満
平成23年度 第1期	173 (42.6)	5 (1.2)	5 (1.2)	5 (1.2)	218 (53.7)	11	417	*	400未満
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	176 (43.8)	1 (0.2)	2 (0.5)	3 (0.7)	220 (54.7)	15	417	*	400未満
	180 (44.1)	2 (0.5)	2 (0.5)	4 (1.0)	220 (53.9)	9	417	*	400未満
	181 (44.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (1.0)	220 (54.1)	10	417	*	400未満
	158 (41.0)	2 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.5)	222 (57.7)	32	417	*	400未満
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	177 (43.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.5)	222 (55.1)	14	417	*	400未満
	181 (44.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	223 (55.1)	12	417	*	400未満
	177 (43.8)	0 (0.0)	3 (0.7)	1 (0.2)	223 (55.2)	13	417	*	400未満
	167 (42.2)	1 (0.3)	2 (0.5)	1 (0.3)	225 (56.8)	21	417	*	400未満
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	177 (43.8)	0 (0.0)	2 (0.5)	0 (0.0)	225 (55.7)	13	417	*	400未満
	177 (43.8)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	226 (55.9)	13	417	*	400未満
	178 (43.4)	3 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.2)	228 (55.6)	7	417	*	400未満
	166 (41.7)	3 (0.8)	1 (0.3)	0 (0.0)	228 (57.3)	19	417	*	400未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1 剤	NRTI 2 剤	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成5年度 第4期	184 (45.4)	20 (4.9)	163 (40.2)	38 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8	4	417
平成6年度 第1期	117 (39.5)	26 (8.8)	115 (38.9)	38 (12.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15	106	417
平成7年度 第1期	93 (32.7)	23 (8.1)	115 (40.5)	53 (18.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	64	69	417
平成8年度 第1期	71 (27.6)	24 (9.3)	103 (40.1)	59 (23.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	99	61	417
平成9年度 第1期	54 (19.5)	14 (5.1)	32 (11.6)	106 (38.3)	52 (18.8)	0 (0.0)	19 (6.9)	114	26	417
平成10年度 第1期	44 (16.1)	19 (6.9)	11 (4.0)	72 (26.3)	116 (42.3)	1 (0.4)	11 (4.0)	121	22	417
平成11年度 第1期	43 (15.9)	17 (6.3)	7 (2.6)	55 (20.3)	137 (50.6)	1 (0.4)	11 (4.1)	129	17	417
平成12年度 第1期	42 (15.7)	17 (6.3)	5 (1.9)	46 (17.2)	124 (46.3)	16 (6.0)	18 (6.7)	135	14	417
平成13年度 第1期	33 (12.9)	14 (5.5)	3 (1.2)	39 (15.2)	123 (48.0)	26 (10.2)	18 (7.0)	141	20	417
平成14年度 第1期	32 (12.6)	22 (8.7)	0 (0.0)	33 (13.0)	108 (42.7)	36 (14.2)	22 (8.7)	148	16	417
平成15年度 第1期	32 (12.9)	27 (10.9)	0 (0.0)	27 (10.9)	96 (38.7)	42 (16.9)	24 (9.7)	157	12	417
平成16年度 第1期	30 (12.0)	32 (12.8)	0 (0.0)	24 (9.6)	97 (38.8)	45 (18.0)	22 (8.8)	163	4	417
平成17年度 第1期	27 (11.4)	28 (11.9)	0 (0.0)	22 (9.3)	91 (38.6)	48 (20.3)	20 (8.5)	173	8	417
平成18年度 第1期	25 (10.9)	21 (9.2)	0 (0.0)	15 (6.6)	104 (45.4)	46 (20.1)	18 (7.9)	180	8	417
平成19年度 第1期	20 (8.9)	18 (8.0)	0 (0.0)	11 (4.9)	111 (49.6)	46 (20.5)	18 (8.0)	187	6	417
平成20年度 第1期	18 (8.3)	12 (5.6)	0 (0.0)	10 (4.6)	113 (52.3)	39 (18.1)	24 (11.1)	198	3	417
平成21年度 第1期	18 (8.6)	8 (3.8)	0 (0.0)	8 (3.8)	99 (47.1)	36 (17.1)	41 (19.5)	205	2	417
平成22年度 第1期	14 (6.8)	8 (3.9)	0 (0.0)	6 (2.9)	85 (41.5)	35 (17.1)	57 (27.8)	208	4	417
平成23年度 第1期	8 (4.0)	9 (4.5)	0 (0.0)	4 (2.0)	71 (35.9)	34 (17.2)	72 (36.4)	218	1	417
平成24年度 第1期	6 (3.1)	5 (2.6)	0 (0.0)	4 (2.1)	63 (32.5)	30 (15.5)	86 (44.3)	220	3	417
第2期	6 (3.1)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	62 (32.0)	31 (16.0)	87 (44.8)	220	3	417
第3期	6 (3.1)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	56 (28.9)	31 (16.0)	93 (47.9)	220	3	417
第4期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	4 (2.1)	55 (28.5)	33 (17.1)	92 (47.7)	222	2	417
平成25年度 第1期	5 (2.6)	5 (2.6)	0 (0.0)	3 (1.6)	49 (25.5)	32 (16.7)	98 (51.0)	222	3	417
第2期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.6)	32 (16.8)	100 (52.4)	223	3	417
第3期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.7)	32 (16.8)	99 (52.1)	223	4	417
第4期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	46 (24.1)	32 (16.8)	101 (52.9)	225	1	417
平成26年度 第1期	5 (2.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	2 (1.0)	48 (25.1)	31 (16.2)	102 (53.4)	225	1	417
第2期	5 (2.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	3 (1.6)	39 (20.5)	29 (15.3)	111 (58.4)	226	1	417
第3期	5 (2.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	34 (18.1)	26 (13.8)	118 (62.8)	228	1	417
第4期	5 (2.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	4 (2.2)	29 (15.7)	25 (13.5)	120 (64.9)	228	4	417

() : 各行の計より不明と AIDS 発病・死亡を除いた数を分母とする%

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計	
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明					
平成9年度 第1期	163 (80.7)	24 (11.9)	7 (3.5)	5 (2.5)	3 (1.5)	7	68	26	114	417	
平成10年度 第1期	173 (83.6)	22 (10.6)	8 (3.9)	2 (1.0)	2 (1.0)	4	63	22	121	417	
平成11年度 第1期	171 (84.7)	25 (12.4)	5 (2.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	9	60	17	129	417	
平成12年度 第1期	174 (87.0)	18 (9.0)	5 (2.5)	3 (1.5)	0 (0.0)	9	59	14	135	417	
平成13年度 第1期	169 (85.4)	22 (11.1)	5 (2.5)	2 (1.0)	0 (0.0)	11	47	20	141	417	
平成14年度 第1期	170 (87.6)	17 (8.8)	6 (3.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	5	54	16	148	417	
平成15年度 第1期	163 (87.6)	17 (9.1)	6 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	59	12	157	417	
平成16年度 第1期	162 (86.6)	14 (7.5)	6 (3.2)	3 (1.6)	2 (1.1)	1	62	4	163	417	
平成17年度 第1期	161 (89.4)	10 (5.6)	6 (3.3)	1 (0.6)	2 (1.1)	1	55	8	173	417	
平成18年度 第1期	165 (90.2)	11 (6.0)	5 (2.7)	1 (0.5)	1 (0.5)	0	46	8	180	417	
平成19年度 第1期	170 (92.4)	11 (6.0)	3 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	38	6	187	417	
平成20年度 第1期	170 (92.4)	9 (4.9)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.5)	2	30	3	198	417	
平成21年度 第1期	171 (93.4)	6 (3.3)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	1	26	2	205	417	
平成22年度 第1期	171 (96.6)	4 (2.3)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	6	22	4	208	417	
平成23年度 第1期	171 (96.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	3	17	1	218	417	
平成24年度	第1期	178 (97.3)	3 (1.6)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11	3	220	417
	第2期	179 (97.3)	3 (1.6)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	3	220	417
	第3期	179 (97.3)	4 (2.2)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	3	220	417
	第4期	180 (97.8)	3 (1.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	2	222	417
平成25年度	第1期	180 (98.9)	0 (0.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	3	222	417
	第2期	179 (98.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	3	223	417
	第3期	178 (98.3)	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	0	9	4	223	417
	第4期	179 (98.4)	2 (1.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	1	225	417
平成26年度	第1期	179 (97.8)	4 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8	1	225	417
	第2期	178 (97.8)	3 (1.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8	1	226	417
	第3期	177 (97.8)	2 (1.1)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7	1	228	417
	第4期	172 (97.2)	4 (2.3)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	7	4	228	417

(): 各行の計より AIDS 発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	47 (22.5)	—	—	209	19 (9.1)	9 (4.3)	5 (2.4)	5 (2.4)
平成10年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	18 (8.5)	28 (13.3)	4 (1.9)	3 (1.4)
平成11年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	12 (5.7)	40 (19.0)	3 (1.4)	4 (1.9)
平成12年度 第1期	66 (31.6)	—	—	209	8 (3.8)	41 (19.6)	2 (1.0)	2 (1.0)
平成13年度 第1期	69 (33.0)	—	—	209	10 (4.8)	43 (20.6)	3 (1.4)	2 (1.0)
平成14年度 第1期	61 (30.7)	—	—	199	8 (4.0)	33 (16.6)	1 (0.5)	3 (1.5)
平成15年度 第1期	74 (39.2)	—	—	189	8 (4.2)	32 (16.9)	2 (1.1)	2 (1.1)
平成16年度 第1期	81 (43.1)	104 (55.3)	3 (1.6)	188	11 (5.9)	30 (16.0)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成17年度 第1期	72 (39.8)	106 (58.6)	3 (1.7)	181	7 (3.9)	20 (11.0)	0 (0.0)	6 (3.3)
平成18年度 第1期	70 (38.3)	104 (56.8)	9 (4.9)	183	6 (3.3)	26 (14.2)	1 (0.5)	3 (1.6)
平成19年度 第1期	61 (32.8)	103 (55.4)	22 (11.8)	186	9 (4.8)	14 (7.5)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成20年度 第1期	59 (31.7)	121 (65.1)	6 (3.2)	186	7 (3.8)	11 (5.9)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成21年度 第1期	48 (26.1)	129 (70.1)	7 (3.8)	184	3 (1.6)	8 (4.3)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成22年度 第1期	55 (30.1)	126 (68.9)	2 (1.1)	183	5 (2.7)	7 (3.8)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成23年度 第1期	53 (29.3)	125 (69.1)	3 (1.7)	181	6 (3.3)	7 (3.9)	1 (0.6)	2 (1.1)
平成24年度 第1期	46 (25.1)	133 (72.7)	4 (2.2)	183	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	3 (1.6)
第2期	47 (25.5)	134 (72.8)	3 (1.6)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	3 (1.6)
第3期	44 (23.9)	134 (72.8)	6 (3.3)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	2 (1.1)
第4期	44 (23.9)	137 (74.5)	3 (1.6)	184	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	2 (1.1)
平成25年度 第1期	43 (23.6)	135 (74.2)	4 (2.2)	182	3 (1.6)	6 (3.3)	0 (0.0)	1 (0.5)
第2期	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	4 (2.2)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)
第3期	42 (23.2)	134 (74.0)	5 (2.8)	181	4 (2.2)	5 (2.8)	0 (0.0)	1 (0.6)
第4期	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	3 (1.6)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)
平成26年度 第1期	31 (16.9)	144 (78.7)	8 (4.4)	183	4 (2.2)	4 (2.2)	0 (0.0)	1 (0.5)
第2期	30 (16.5)	145 (79.7)	7 (3.8)	182	4 (2.2)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)
第3期	31 (17.1)	144 (79.6)	6 (3.3)	181	4 (2.2)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)
第4期	30 (16.9)	141 (79.2)	7 (3.9)	178	4 (2.2)	3 (1.7)	1 (0.6)	1 (0.6)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-4-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リポストロフィー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	6 (2.9)	5 (2.4)	5 (2.4)	3 (1.4)	—	—	—	9 (4.3)
平成10年度 第1期	6 (2.8)	8 (3.8)	8 (3.8)	6 (2.8)	—	—	—	18 (8.5)
平成11年度 第1期	1 (0.5)	9 (4.3)	6 (2.8)	3 (1.4)	—	—	—	11 (5.2)
平成12年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	4 (1.9)	5 (2.4)	—	—	—	15 (7.2)
平成13年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	6 (2.9)	4 (1.9)	—	—	—	16 (7.7)
平成14年度 第1期	0 (0.0)	6 (3.0)	4 (2.0)	0 (0.0)	9 (4.5)	11 (5.5)	—	7 (3.5)
平成15年度 第1期	1 (0.5)	8 (4.2)	1 (0.5)	2 (1.1)	12 (6.3)	29 (15.3)	—	15 (7.9)
平成16年度 第1期	0 (0.0)	9 (4.8)	5 (2.7)	2 (1.1)	9 (4.8)	26 (13.8)	—	16 (8.5)
平成17年度 第1期	2 (1.1)	8 (4.4)	2 (1.1)	3 (1.7)	13 (7.2)	23 (12.7)	—	20 (11.0)
平成18年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	6 (3.3)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	11 (6.0)	17 (9.3)
平成19年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	2 (1.1)	3 (1.6)	8 (4.3)	20 (10.8)	10 (5.4)	10 (5.4)
平成20年度 第1期	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	7 (3.8)	23 (12.4)	10 (5.4)	12 (6.5)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.1)	19 (10.3)	11 (6.0)	11 (6.0)
平成22年度 第1期	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.1)	3 (1.6)	6 (3.3)	25 (13.7)	12 (6.6)	9 (4.9)
平成23年度 第1期	1 (0.6)	5 (2.8)	1 (0.6)	3 (1.7)	7 (3.9)	23 (12.7)	8 (4.4)	8 (4.4)
平成24年度 第1期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	7 (3.8)	6 (3.3)
第2期	1 (0.5)	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	6 (3.3)	8 (4.3)
第3期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.7)	22 (12.0)	4 (2.2)	8 (4.3)
第4期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.7)	23 (12.5)	5 (2.7)	7 (3.8)
平成25年度 第1期	1 (0.5)	3 (1.6)	3 (1.6)	2 (1.1)	5 (2.7)	24 (13.2)	6 (3.3)	7 (3.8)
第2期	2 (1.1)	3 (1.6)	3 (1.6)	3 (1.6)	5 (2.7)	23 (12.6)	6 (3.3)	7 (3.8)
第3期	2 (1.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	4 (2.2)	5 (2.8)	23 (12.7)	6 (3.3)	7 (3.9)
第4期	1 (0.5)	4 (2.2)	2 (1.1)	5 (2.7)	5 (2.7)	23 (12.6)	5 (2.7)	6 (3.3)
平成26年度 第1期	3 (1.6)	4 (2.2)	1 (0.5)	2 (1.1)	7 (3.8)	16 (8.7)	4 (2.2)	5 (2.7)
第2期	3 (1.6)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	7 (3.8)	16 (8.8)	4 (2.2)	4 (2.2)
第3期	3 (1.7)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	16 (8.8)	4 (2.2)	4 (2.2)
第4期	3 (1.7)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	15 (8.4)	3 (1.7)	5 (2.8)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	CD4 値							中央値	
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	133 (25.1)	144 (27.2)	134 (25.3)	114 (21.6)	76	605	328	330
平成10年度 第1期	21 (3.9)	99 (18.3)	156 (28.8)	140 (25.9)	125 (23.1)	64	605	344	354
平成11年度 第1期	33 (6.0)	73 (13.2)	152 (27.5)	156 (28.2)	139 (25.1)	52	605	370	383
平成12年度 第1期	45 (8.1)	67 (12.1)	147 (26.4)	150 (27.0)	147 (26.4)	49	605	368	394
平成13年度 第1期	59 (10.9)	60 (11.1)	130 (24.0)	148 (27.3)	145 (26.8)	63	605	369	395
平成14年度 第1期	66 (12.0)	55 (10.0)	143 (26.0)	130 (23.6)	157 (28.5)	54	605	360	396
平成15年度 第1期	81 (15.1)	58 (10.8)	125 (23.2)	137 (25.5)	137 (25.5)	67	605	356	404
平成16年度 第1期	93 (16.5)	63 (11.2)	120 (21.3)	137 (24.3)	150 (26.6)	42	605	356	403
平成17年度 第1期	111 (20.1)	46 (8.3)	123 (22.3)	121 (21.9)	151 (27.4)	53	605	345	406
平成18年度 第1期	125 (22.1)	66 (11.7)	117 (20.7)	108 (19.1)	150 (26.5)	39	605	318	388
平成19年度 第1期	137 (24.1)	56 (9.9)	135 (23.8)	107 (18.8)	133 (23.4)	37	605	305	375
平成20年度 第1期	156 (27.5)	53 (9.3)	120 (21.1)	121 (21.3)	118 (20.8)	37	605	310	388
平成21年度 第1期	166 (29.0)	37 (6.5)	105 (18.4)	100 (17.5)	164 (28.7)	33	605	324	431
平成22年度 第1期	175 (30.4)	39 (6.8)	105 (18.3)	115 (20.0)	141 (24.5)	30	605	314	423
平成23年度 第1期	187 (32.6)	32 (5.6)	93 (16.2)	120 (20.9)	142 (24.7)	31	605	319	437
平成24年度 第1期	193 (33.6)	28 (4.9)	86 (15.0)	113 (19.7)	155 (27.0)	30	605	318	449
第2期	194 (33.6)	29 (5.0)	93 (16.1)	110 (19.1)	151 (26.2)	28	605	317	441
第3期	195 (34.0)	24 (4.2)	93 (16.2)	104 (18.1)	158 (27.5)	31	605	306	461
第4期	198 (37.1)	25 (4.7)	79 (14.8)	94 (17.6)	137 (25.7)	72	605	296	460
平成25年度 第1期	198 (34.3)	26 (4.5)	91 (15.7)	95 (16.4)	168 (29.1)	27	605	317	464
第2期	199 (34.2)	33 (5.7)	75 (12.9)	116 (19.9)	159 (27.3)	23	605	327	458
第3期	200 (34.3)	34 (5.8)	68 (11.7)	115 (19.7)	166 (28.5)	22	605	324	462
第4期	202 (36.7)	23 (4.2)	74 (13.4)	100 (18.1)	152 (27.6)	54	605	319	462
平成26年度 第1期	204 (35.6)	27 (4.7)	71 (12.4)	106 (18.5)	165 (28.8)	32	605	322	468
第2期	205 (35.3)	31 (5.3)	67 (11.5)	103 (17.7)	175 (30.1)	24	605	324	484
第3期	208 (35.7)	28 (4.8)	53 (9.1)	108 (18.6)	185 (31.8)	23	605	352	497
第4期	209 (37.3)	26 (4.6)	56 (10.0)	97 (17.3)	172 (30.7)	45	605	324	489

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	CD4/CD8比								中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡 含む	AIDS発病・死亡 含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	30 (5.8)	274 (53.3)	180 (35.0)	25 (4.9)	1 (0.2)	91	605	0.40	0.40
平成10年度 第1期	21 (3.9)	18 (3.4)	247 (46.0)	216 (40.2)	33 (6.1)	2 (0.4)	68	605	0.47	0.49
平成11年度 第1期	33 (6.2)	18 (3.4)	244 (45.7)	194 (36.3)	40 (7.5)	5 (0.9)	71	605	0.44	0.48
平成12年度 第1期	45 (8.3)	11 (2.0)	232 (42.9)	202 (37.3)	42 (7.8)	9 (1.7)	64	605	0.47	0.50
平成13年度 第1期	59 (11.3)	11 (2.1)	201 (38.4)	196 (37.5)	47 (9.0)	9 (1.7)	82	605	0.48	0.51
平成14年度 第1期	66 (12.5)	8 (1.5)	198 (37.5)	195 (36.9)	49 (9.3)	12 (2.3)	77	605	0.49	0.52
平成15年度 第1期	81 (15.8)	8 (1.6)	177 (34.6)	179 (35.0)	53 (10.4)	14 (2.7)	93	605	0.47	0.56
平成16年度 第1期	93 (17.6)	8 (1.5)	172 (32.6)	186 (35.3)	51 (9.7)	17 (3.2)	78	605	0.47	0.57
平成17年度 第1期	111 (21.1)	10 (1.9)	145 (27.6)	192 (36.6)	46 (8.8)	21 (4.0)	80	605	0.48	0.58
平成18年度 第1期	125 (23.1)	11 (2.0)	131 (24.3)	193 (35.7)	51 (9.4)	29 (5.4)	65	605	0.50	0.61
平成19年度 第1期	137 (25.3)	3 (0.6)	142 (26.2)	171 (31.5)	65 (12.0)	24 (4.4)	63	605	0.46	0.61
平成20年度 第1期	156 (28.4)	6 (1.1)	120 (21.8)	178 (32.4)	70 (12.7)	20 (3.6)	55	605	0.47	0.62
平成21年度 第1期	166 (30.9)	5 (0.9)	105 (19.5)	155 (28.8)	81 (15.1)	26 (4.8)	67	605	0.47	0.69
平成22年度 第1期	175 (31.8)	4 (0.7)	96 (17.4)	174 (31.6)	73 (13.2)	29 (5.3)	54	605	0.50	0.70
平成23年度 第1期	187 (34.1)	2 (0.4)	94 (17.1)	157 (28.6)	72 (13.1)	37 (6.7)	56	605	0.48	0.72
平成24年度 第1期	193 (35.0)	1 (0.2)	76 (13.8)	162 (29.4)	82 (14.9)	37 (6.7)	54	605	0.50	0.77
第2期	194 (35.1)	0 (0.0)	77 (13.9)	155 (28.0)	91 (16.5)	36 (6.5)	52	605	0.50	0.80
第3期	195 (35.6)	0 (0.0)	76 (13.9)	152 (27.7)	83 (15.1)	42 (7.7)	57	605	0.50	0.80
第4期	198 (38.7)	1 (0.2)	59 (11.5)	135 (26.4)	80 (15.7)	38 (7.4)	94	605	0.47	0.80
平成25年度 第1期	198 (35.3)	1 (0.2)	78 (13.9)	163 (29.1)	78 (13.9)	43 (7.7)	44	605	0.50	0.77
第2期	199 (35.5)	1 (0.2)	69 (12.3)	172 (30.7)	76 (13.5)	44 (7.8)	44	605	0.52	0.80
第3期	200 (35.6)	2 (0.4)	61 (10.9)	175 (31.1)	82 (14.6)	42 (7.5)	43	605	0.54	0.80
第4期	202 (38.1)	2 (0.4)	62 (11.7)	146 (27.5)	72 (13.6)	46 (8.7)	75	605	0.49	0.83
平成26年度 第1期	204 (37.0)	2 (0.4)	57 (10.3)	171 (31.0)	79 (14.3)	39 (7.1)	53	605	0.50	0.80
第2期	205 (36.7)	2 (0.4)	64 (11.4)	165 (29.5)	82 (14.7)	41 (7.3)	46	605	0.51	0.80
第3期	208 (37.1)	1 (0.2)	55 (9.8)	161 (28.7)	87 (15.5)	49 (8.7)	44	605	0.52	0.84
第4期	209 (38.5)	2 (0.4)	59 (10.9)	145 (26.7)	89 (16.4)	39 (7.2)	62	605	0.50	0.86

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）			
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡		
									含　む	含まず	
平成9年度　第1期	226 (39.5)	227 (39.7)	108 (18.9)	7　(1.2)	4　(0.7)	33	605	453	(79.2)	(79.8)	
平成10年度　第1期	193 (34.0)	234 (41.3)	112 (19.8)	7　(1.2)	21　(3.7)	38	605	427	(75.3)	(78.2)	
平成11年度　第1期	188 (32.6)	199 (34.5)	144 (25.0)	12　(2.1)	33　(5.7)	29	605	387	(67.2)	(71.3)	
平成12年度　第1期	162 (28.2)	221 (38.5)	136 (23.7)	10　(1.7)	45　(7.8)	31	605	383	(66.7)	(72.4)	
平成13年度　第1期	152 (26.3)	212 (36.7)	145 (25.1)	10　(1.7)	59 (10.2)	27	605	364	(63.0)	(70.1)	
平成14年度　第1期	149 (25.5)	222 (37.9)	134 (22.9)	14　(2.4)	66 (11.3)	20	605	371	(63.4)	(71.5)	
平成15年度　第1期	142 (24.3)	192 (32.8)	153 (26.2)	17　(2.9)	81 (13.8)	20	605	334	(57.1)	(66.3)	
平成16年度　第1期	131 (22.7)	203 (35.2)	132 (22.9)	18　(3.1)	93 (16.1)	28	605	334	(57.9)	(69.0)	
平成17年度　第1期	132 (22.7)	189 (32.5)	138 (23.7)	12　(2.1)	111 (19.1)	23	605	321	(55.2)	(68.2)	
平成18年度　第1期	126 (21.3)	178 (30.1)	143 (24.2)	19　(3.2)	125 (21.2)	14	605	304	(51.4)	(65.2)	
平成19年度　第1期	117 (19.9)	189 (32.1)	127 (21.6)	18　(3.1)	137 (23.3)	17	605	306	(52.0)	(67.8)	
平成20年度　第1期	111 (18.8)	183 (30.9)	125 (21.1)	17　(2.9)	156 (26.4)	13	605	294	(49.7)	(67.4)	
平成21年度　第1期	111 (18.9)	167 (28.4)	132 (22.4)	12　(2.0)	166 (28.2)	17	605	278	(47.3)	(65.9)	
平成22年度　第1期	112 (19.0)	157 (26.6)	131 (22.2)	16　(2.7)	175 (29.6)	14	605	269	(45.5)	(64.7)	
平成23年度　第1期	102 (17.3)	165 (28.0)	118 (20.0)	18　(3.1)	187 (31.7)	15	605	267	(45.3)	(66.3)	
平成24年度	第1期	109 (18.4)	156 (26.3)	123 (20.7)	12　(2.0)	193 (32.5)	12	605	265	(44.7)	(66.3)
	第2期	112 (19.0)	144 (24.4)	124 (21.1)	15　(2.5)	194 (32.9)	16	605	256	(43.5)	(64.8)
	第3期	116 (19.5)	137 (23.1)	131 (22.1)	15　(2.5)	195 (32.8)	11	605	253	(42.6)	(63.4)
	第4期	114 (19.2)	141 (23.8)	127 (21.4)	13　(2.2)	198 (33.4)	12	605	255	(43.0)	(64.6)
平成25年度	第1期	98 (16.7)	158 (26.9)	122 (20.8)	11　(1.9)	198 (33.7)	18	605	256	(43.6)	(65.8)
	第2期	104 (17.6)	143 (24.2)	132 (22.3)	13　(2.2)	199 (33.7)	14	605	247	(41.8)	(63.0)
	第3期	103 (17.5)	139 (23.7)	130 (22.1)	15　(2.6)	200 (34.1)	18	605	242	(41.2)	(62.5)
	第4期	103 (17.3)	144 (24.1)	132 (22.1)	16　(2.7)	202 (33.8)	8	605	247	(41.4)	(62.5)
平成26年度	第1期	106 (17.7)	148 (24.7)	131 (21.9)	9　(1.5)	204 (34.1)	7	605	254	(42.5)	(64.5)
	第2期	105 (17.7)	140 (23.6)	133 (22.4)	11　(1.9)	205 (34.5)	11	605	245	(41.2)	(63.0)
	第3期	107 (17.8)	135 (22.5)	138 (23.0)	13　(2.2)	208 (34.6)	4	605	242	(40.3)	(61.6)
	第4期	106 (17.8)	134 (22.5)	131 (22.0)	15　(2.5)	209 (35.1)	10	605	240	(40.3)	(62.2)

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作						計	1および2 (再掲)		
	1	2	3	4 (4～8)	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成9年度 第1期	230 (43.0)	156 (29.2)	74 (13.8)	71 (13.3)	4 (0.7)	70	605	386	(72.1)	(72.7)
平成10年度 第1期	197 (37.4)	162 (30.7)	80 (15.2)	67 (12.7)	21 (4.0)	78	605	359	(68.1)	(70.9)
平成11年度 第1期	184 (34.1)	169 (31.3)	75 (13.9)	79 (14.6)	33 (6.1)	65	605	353	(65.4)	(69.6)
平成12年度 第1期	165 (30.9)	171 (32.0)	70 (13.1)	83 (15.5)	45 (8.4)	71	605	336	(62.9)	(68.7)
平成13年度 第1期	161 (29.7)	160 (29.5)	84 (15.5)	78 (14.4)	59 (10.9)	63	605	321	(59.2)	(66.5)
平成14年度 第1期	155 (28.1)	164 (29.7)	91 (16.5)	76 (13.8)	66 (12.0)	53	605	319	(57.8)	(65.6)
平成15年度 第1期	139 (25.6)	149 (27.4)	99 (18.2)	76 (14.0)	81 (14.9)	61	605	288	(52.9)	(62.2)
平成16年度 第1期	130 (22.5)	150 (26.0)	112 (19.4)	92 (15.9)	93 (16.1)	28	605	280	(48.5)	(57.9)
平成17年度 第1期	133 (23.1)	144 (25.0)	94 (16.3)	95 (16.5)	111 (19.2)	28	605	277	(48.0)	(59.4)
平成18年度 第1期	115 (19.8)	146 (25.2)	100 (17.2)	94 (16.2)	125 (21.6)	25	605	261	(45.0)	(57.4)
平成19年度 第1期	118 (20.4)	139 (24.0)	102 (17.6)	82 (14.2)	137 (23.7)	27	605	257	(44.5)	(58.3)
平成20年度 第1期	113 (19.2)	130 (22.0)	107 (18.1)	84 (14.2)	156 (26.4)	15	605	243	(41.2)	(56.0)
平成21年度 第1期	103 (17.7)	127 (21.8)	107 (18.4)	80 (13.7)	166 (28.5)	22	605	230	(39.5)	(55.2)
平成22年度 第1期	104 (17.5)	132 (22.2)	94 (15.8)	90 (15.1)	175 (29.4)	10	605	236	(39.7)	(56.2)
平成23年度 第1期	99 (16.9)	126 (21.5)	93 (15.8)	82 (14.0)	187 (31.9)	18	605	225	(38.3)	(56.3)
平成24年度 第1期	103 (17.5)	115 (19.5)	92 (15.6)	86 (14.6)	193 (32.8)	16	605	218	(37.0)	(55.1)
第2期	102 (17.4)	107 (18.3)	98 (16.8)	84 (14.4)	194 (33.2)	20	605	209	(35.7)	(53.5)
第3期	99 (17.0)	109 (18.7)	94 (16.1)	87 (14.9)	195 (33.4)	21	605	208	(35.6)	(53.5)
第4期	96 (16.3)	111 (18.8)	93 (15.8)	91 (15.4)	198 (33.6)	16	605	207	(35.1)	(52.9)
平成25年度 第1期	93 (15.8)	111 (18.9)	93 (15.8)	92 (15.7)	198 (33.7)	18	605	204	(34.8)	(52.4)
第2期	93 (15.8)	104 (17.7)	99 (16.8)	93 (15.8)	199 (33.8)	17	605	197	(33.5)	(50.6)
第3期	92 (15.6)	106 (18.0)	100 (17.0)	90 (15.3)	200 (34.0)	17	605	198	(33.7)	(51.0)
第4期	95 (16.0)	104 (17.6)	95 (16.0)	96 (16.2)	202 (34.1)	13	605	199	(33.6)	(51.0)
平成26年度 第1期	94 (15.8)	105 (17.7)	92 (15.5)	99 (16.7)	204 (34.3)	11	605	199	(33.5)	(51.0)
第2期	93 (15.7)	100 (16.8)	96 (16.2)	100 (16.8)	205 (34.5)	11	605	193	(32.5)	(49.6)
第3期	93 (15.7)	99 (16.7)	89 (15.0)	103 (17.4)	208 (35.1)	13	605	192	(32.4)	(50.0)
第4期	94 (15.8)	102 (17.1)	91 (15.3)	100 (16.8)	209 (35.1)	9	605	196	(32.9)	(50.6)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央値	
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡	
								含　む	含まず
平成9年度　第1期	108 (29.9)	30　(8.3)	109 (30.2)	110 (30.5)	4　(1.1)	244	605	2600	2400
平成10年度　第1期	184 (36.5)	63 (12.5)	140 (27.8)	96 (19.0)	21　(4.2)	101	605	1200	940
平成11年度　第1期	247 (46.1)	42　(7.8)	136 (25.4)	78 (14.6)	33　(6.2)	69	605	585	430
平成12年度　第1期	276 (50.6)	37　(6.8)	115 (21.1)	72 (13.2)	45　(8.3)	60	605	400 未満	400 未満
平成13年度　第1期	282 (52.6)	35　(6.5)	95 (17.7)	65 (12.1)	59 (11.0)	69	605	400 未満	400 未満
平成14年度　第1期	286 (52.8)	39　(7.2)	88 (16.2)	63 (11.6)	66 (12.2)	63	605	400 未満	400 未満
平成15年度　第1期	288 (53.9)	28　(5.2)	70 (13.1)	67 (12.5)	81 (15.2)	71	605	400 未満	400 未満
平成16年度　第1期	305 (54.5)	30　(5.4)	67 (12.0)	65 (11.6)	93 (16.6)	45	605	400 未満	400 未満
平成17年度　第1期	307 (56.2)	20　(3.7)	51　(9.3)	57 (10.4)	111 (20.3)	59	605	400 未満	400 未満
平成18年度　第1期	328 (58.5)	23　(4.1)	50　(8.9)	35　(6.2)	125 (22.3)	44	605	400 未満	400 未満
平成19年度　第1期	332 (58.8)	21　(3.7)	38　(6.7)	37　(6.5)	137 (24.2)	40	605	400 未満	400 未満
平成20年度　第1期	327 (57.9)	25　(4.4)	34　(6.0)	23　(4.1)	156 (27.6)	40	605	400 未満	400 未満
平成21年度　第1期	343 (60.5)	10　(1.8)	24　(4.2)	24　(4.2)	166 (29.3)	38	605	400 未満	400 未満
平成22年度　第1期	363 (63.7)	5　(0.9)	20　(3.5)	7　(1.2)	175 (30.7)	35	605	400 未満	400 未満
平成23年度　第1期	356 (61.9)	8　(1.4)	15　(2.6)	9　(1.6)	187 (32.5)	30	605	400 未満	400 未満
平成24年度　第1期 第2期 第3期 第4期	359 (62.1)	8　(1.4)	10　(1.7)	8　(1.4)	193 (33.4)	27	605	400 未満	400 未満
	362 (62.3)	8　(1.4)	8　(1.4)	9　(1.5)	194 (33.4)	24	605	400 未満	400 未満
	364 (62.9)	7　(1.2)	5　(0.9)	8　(1.4)	195 (33.7)	26	605	400 未満	400 未満
	317 (59.3)	6　(1.1)	4　(0.7)	10　(1.9)	198 (37.0)	70	605	400 未満	400 未満
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	360 (62.4)	8　(1.4)	7　(1.2)	4　(0.7)	198 (34.3)	28	605	400 未満	400 未満
	366 (62.9)	5　(0.9)	8　(1.4)	4　(0.7)	199 (34.2)	23	605	400 未満	400 未満
	369 (63.4)	5　(0.9)	5　(0.9)	3　(0.5)	200 (34.4)	23	605	400 未満	400 未満
	340 (61.5)	3　(0.5)	4　(0.7)	4　(0.7)	202 (36.5)	52	605	400 未満	400 未満
平成26年度　第1期 第2期 第3期 第4期	356 (62.2)	3　(0.5)	8　(1.4)	1　(0.2)	204 (35.7)	33	605	400 未満	400 未満
	362 (62.3)	4　(0.7)	7　(1.2)	3　(0.5)	205 (35.3)	24	605	400 未満	400 未満
	361 (61.6)	6　(1.0)	8　(1.4)	3　(0.5)	208 (35.5)	19	605	400 未満	400 未満
	333 (59.8)	4　(0.7)	8　(1.4)	3　(0.5)	209 (37.5)	48	605	400 未満	400 未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分										計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成9年度 第1期	124 (22.9)	20 (3.7)	58 (10.7)	214 (39.5)	91 (16.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (6.5)	4	59	605
平成10年度 第1期	105 (19.4)	31 (5.7)	21 (3.9)	153 (28.3)	204 (37.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	25 (4.6)	21	43	605
平成11年度 第1期	96 (18.0)	30 (5.6)	15 (2.8)	110 (20.6)	260 (48.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	18 (3.4)	33	39	605
平成12年度 第1期	92 (17.6)	36 (6.9)	11 (2.1)	86 (16.4)	235 (44.8)	28 (5.3)	0 (0.0)	36 (6.9)	45	36	605
平成13年度 第1期	74 (14.8)	28 (5.6)	9 (1.8)	73 (14.6)	230 (46.1)	50 (10.0)	0 (0.0)	35 (7.0)	59	47	605
平成14年度 第1期	80 (15.7)	45 (8.8)	5 (1.0)	66 (12.9)	204 (40.0)	71 (13.9)	0 (0.0)	39 (7.6)	66	29	605
平成15年度 第1期	66 (13.7)	52 (10.8)	3 (0.6)	58 (12.0)	180 (37.3)	78 (16.2)	0 (0.0)	45 (9.3)	81	42	605
平成16年度 第1期	70 (13.9)	58 (11.6)	4 (0.8)	49 (9.8)	195 (38.8)	89 (17.7)	0 (0.0)	37 (7.4)	93	10	605
平成17年度 第1期	61 (12.7)	54 (11.3)	3 (0.6)	45 (9.4)	182 (37.9)	92 (19.2)	0 (0.0)	43 (9.0)	111	14	605
平成18年度 第1期	56 (12.0)	52 (11.2)	5 (1.1)	33 (7.1)	192 (41.2)	91 (19.5)	0 (0.0)	37 (7.9)	125	14	605
平成19年度 第1期	46 (10.1)	41 (9.0)	3 (0.7)	27 (5.9)	213 (46.7)	92 (20.2)	0 (0.0)	34 (7.5)	137	12	605
平成20年度 第1期	41 (9.3)	30 (6.8)	2 (0.5)	25 (5.7)	211 (47.7)	88 (19.9)	5 (1.1)	40 (9.0)	156	7	605
平成21年度 第1期	41 (9.4)	24 (5.5)	1 (0.2)	20 (4.6)	185 (42.6)	85 (19.6)	41 (9.4)	37 (8.5)	166	5	605
平成22年度 第1期	35 (8.2)	22 (5.2)	1 (0.2)	15 (3.5)	162 (38.0)	83 (19.5)	78 (18.3)	30 (7.0)	175	4	605
平成23年度 第1期	28 (6.7)	19 (4.6)	1 (0.2)	12 (2.9)	142 (34.1)	74 (17.8)	116 (27.9)	24 (5.8)	187	2	605
平成24年度 第1期	22 (5.4)	12 (3.0)	0 (0.0)	11 (2.7)	121 (29.9)	68 (16.8)	143 (35.3)	28 (6.9)	193	7	605
第2期	22 (5.4)	11 (2.7)	0 (0.0)	10 (2.5)	114 (28.2)	70 (17.3)	149 (36.9)	28 (6.9)	194	7	605
第3期	21 (5.2)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	106 (26.2)	69 (17.1)	161 (39.9)	27 (6.7)	195	6	605
第4期	19 (4.7)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	104 (25.9)	71 (17.7)	162 (40.4)	25 (6.2)	198	6	605
平成25年度 第1期	17 (4.2)	11 (2.7)	0 (0.0)	8 (2.0)	97 (24.2)	68 (17.0)	170 (42.4)	30 (7.5)	198	6	605
第2期	16 (4.0)	10 (2.5)	0 (0.0)	7 (1.8)	93 (23.3)	67 (16.8)	176 (44.1)	30 (7.5)	199	7	605
第3期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	90 (22.6)	67 (16.8)	180 (45.2)	30 (7.5)	200	7	605
第4期	15 (3.8)	11 (2.8)	0 (0.0)	6 (1.5)	89 (22.4)	64 (16.1)	184 (46.2)	29 (7.3)	202	5	605
平成26年度 第1期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	91 (23.0)	61 (15.4)	191 (48.2)	22 (5.6)	204	5	605
第2期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	75 (18.9)	55 (13.9)	214 (54.0)	21 (5.3)	205	4	605
第3期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	67 (17.0)	51 (12.9)	225 (57.0)	21 (5.3)	208	2	605
第4期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	9 (2.3)	59 (15.1)	50 (12.8)	228 (58.3)	22 (5.6)	209	5	605

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計	
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明					
平成9年度 第1期	296 (78.5)	44 (11.7)	25 (6.6)	8 (2.1)	4 (1.1)	21	144	59	4	605	
平成10年度 第1期	310 (79.7)	53 (13.6)	17 (4.4)	6 (1.5)	3 (0.8)	16	136	43	21	605	
平成11年度 第1期	330 (84.2)	46 (11.7)	11 (2.8)	5 (1.3)	0 (0.0)	15	126	39	33	605	
平成12年度 第1期	319 (85.1)	35 (9.3)	13 (3.5)	8 (2.1)	0 (0.0)	21	128	36	45	605	
平成13年度 第1期	314 (84.4)	40 (10.8)	11 (3.0)	6 (1.6)	1 (0.3)	25	102	47	59	605	
平成14年度 第1期	321 (87.7)	29 (7.9)	11 (3.0)	5 (1.4)	0 (0.0)	19	125	29	66	605	
平成15年度 第1期	315 (89.5)	27 (7.7)	8 (2.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	12	118	42	81	605	
平成16年度 第1期	330 (88.5)	27 (7.2)	8 (2.1)	5 (1.3)	3 (0.8)	1	128	10	93	605	
平成17年度 第1期	325 (89.5)	18 (5.0)	10 (2.8)	5 (1.4)	5 (1.4)	2	115	14	111	605	
平成18年度 第1期	326 (91.1)	18 (5.0)	9 (2.5)	4 (1.1)	1 (0.3)	0	108	14	125	605	
平成19年度 第1期	337 (92.6)	15 (4.1)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	5	87	12	137	605	
平成20年度 第1期	346 (93.8)	13 (3.5)	4 (1.1)	4 (1.1)	2 (0.5)	2	71	7	156	605	
平成21年度 第1期	342 (93.4)	14 (3.8)	6 (1.6)	3 (0.8)	1 (0.3)	3	65	5	166	605	
平成22年度 第1期	341 (95.0)	12 (3.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	2 (0.6)	10	57	4	175	605	
平成23年度 第1期	352 (96.2)	9 (2.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	3	47	2	187	605	
平成24年度	第1期	358 (96.5)	9 (2.4)	2 (0.5)	2 (0.5)	0 (0.0)	0	34	7	193	605
	第2期	359 (96.8)	9 (2.4)	2 (0.5)	1 (0.3)	0 (0.0)	0	33	7	194	605
	第3期	362 (97.1)	7 (1.9)	3 (0.8)	1 (0.3)	0 (0.0)	0	31	6	195	605
	第4期	361 (97.0)	7 (1.9)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	0	29	6	198	605
平成25年度	第1期	366 (98.1)	2 (0.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	0	28	6	198	605
	第2期	363 (97.3)	4 (1.1)	4 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.5)	0	26	7	199	605
	第3期	365 (97.6)	3 (0.8)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	0	24	7	200	605
	第4期	363 (97.6)	5 (1.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.5)	0	26	5	202	605
平成26年度	第1期	359 (96.8)	11 (3.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	24	5	204	605
	第2期	361 (97.0)	8 (2.2)	2 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.3)	1	23	4	205	605
	第3期	360 (97.0)	7 (1.9)	3 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.3)	1	23	2	208	605
	第4期	353 (96.7)	10 (2.7)	2 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	23	5	209	605

() : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	92 (23.1)	—	—	398	41 (10.3)	16 (4.0)	9 (2.3)	12 (3.0)
平成10年度 第1期	115 (28.4)	—	—	405	41 (10.1)	45 (11.1)	6 (1.5)	5 (1.2)
平成11年度 第1期	125 (30.7)	—	—	407	31 (7.6)	75 (18.4)	5 (1.2)	9 (2.2)
平成12年度 第1期	116 (29.3)	—	—	396	22 (5.6)	72 (18.2)	9 (2.3)	5 (1.3)
平成13年度 第1期	119 (30.0)	—	—	397	21 (5.3)	68 (17.1)	5 (1.3)	3 (0.8)
平成14年度 第1期	122 (31.7)	—	—	385	22 (5.7)	62 (16.1)	3 (0.8)	6 (1.6)
平成15年度 第1期	125 (34.3)	—	—	364	20 (5.5)	50 (13.7)	3 (0.8)	4 (1.1)
平成16年度 第1期	150 (40.1)	216 (57.8)	8 (2.1)	374	24 (6.4)	56 (15.0)	5 (1.3)	11 (2.9)
平成17年度 第1期	140 (38.4)	213 (58.4)	12 (3.3)	365	21 (5.8)	46 (12.6)	4 (1.1)	10 (2.7)
平成18年度 第1期	136 (38.0)	202 (56.4)	20 (5.6)	358	16 (4.5)	49 (13.7)	7 (2.0)	10 (2.8)
平成19年度 第1期	108 (29.3)	222 (60.2)	39 (10.6)	369	16 (4.3)	26 (7.0)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成20年度 第1期	120 (32.3)	236 (63.6)	15 (4.0)	371	16 (4.3)	23 (6.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成21年度 第1期	105 (28.5)	248 (67.2)	16 (4.3)	369	8 (2.2)	18 (4.9)	3 (0.8)	8 (2.2)
平成22年度 第1期	104 (28.2)	255 (69.1)	10 (2.7)	369	8 (2.2)	16 (4.3)	1 (0.3)	5 (1.4)
平成23年度 第1期	104 (28.2)	250 (67.8)	15 (4.1)	369	12 (3.3)	13 (3.5)	2 (0.5)	4 (1.1)
平成24年度	第1期 91 (24.5)	272 (73.3)	8 (2.2)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第2期 93 (25.1)	271 (73.0)	7 (1.9)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
	第3期 89 (23.9)	274 (73.5)	10 (2.7)	373	11 (2.9)	13 (3.5)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第4期 86 (23.1)	277 (74.5)	9 (2.4)	372	10 (2.7)	13 (3.5)	5 (1.3)	7 (1.9)
平成25年度	第1期 84 (22.5)	281 (75.3)	8 (2.1)	373	6 (1.6)	14 (3.8)	1 (0.3)	5 (1.3)
	第2期 84 (22.5)	280 (75.1)	9 (2.4)	373	7 (1.9)	13 (3.5)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第3期 86 (23.0)	280 (74.9)	8 (2.1)	374	7 (1.9)	12 (3.2)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第4期 86 (23.1)	278 (74.7)	8 (2.2)	372	6 (1.6)	13 (3.5)	1 (0.3)	5 (1.3)
平成26年度	第1期 61 (16.4)	298 (80.1)	13 (3.5)	373	5 (1.3)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)
	第2期 61 (16.4)	301 (80.7)	11 (2.9)	373	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期 58 (15.6)	303 (81.5)	11 (3.0)	374	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)
	第4期 58 (15.8)	297 (80.7)	13 (3.5)	372	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-5-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

		副作用（項目別）							
		血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度	第1期	9 (2.3)	9 (2.3)	9 (2.3)	5 (1.3)	－	－	－	20 (5.0)
平成10年度	第1期	10 (2.5)	10 (2.5)	13 (3.2)	11 (2.7)	－	－	－	26 (6.4)
平成11年度	第1期	2 (0.5)	13 (3.2)	7 (1.7)	6 (1.5)	－	－	－	21 (5.2)
平成12年度	第1期	2 (0.5)	9 (2.3)	6 (1.5)	8 (2.0)	－	－	－	22 (5.6)
平成13年度	第1期	2 (0.5)	10 (2.5)	7 (1.8)	7 (1.8)	－	－	－	28 (7.1)
平成14年度	第1期	2 (0.5)	13 (3.4)	7 (1.8)	2 (0.5)	16 (4.2)	17 (4.4)	－	18 (4.7)
平成15年度	第1期	2 (0.5)	14 (3.8)	4 (1.1)	6 (1.6)	21 (5.8)	45 (12.4)	－	17 (4.7)
平成16年度	第1期	2 (0.5)	15 (4.0)	8 (2.1)	7 (1.9)	19 (5.1)	47 (12.6)	－	29 (7.8)
平成17年度	第1期	2 (0.5)	16 (4.4)	4 (1.1)	9 (2.5)	27 (7.4)	36 (9.9)	－	31 (8.5)
平成18年度	第1期	1 (0.3)	11 (3.1)	10 (2.8)	7 (2.0)	16 (4.5)	39 (10.9)	19 (5.3)	24 (6.7)
平成19年度	第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	8 (2.2)	4 (1.1)	15 (4.1)	31 (8.4)	19 (5.1)	17 (4.6)
平成20年度	第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	4 (1.1)	7 (1.9)	13 (3.5)	39 (10.5)	20 (5.4)	24 (6.5)
平成21年度	第1期	.	5 (1.4)	7 (1.9)	8 (2.2)	8 (2.2)	36 (9.8)	19 (5.1)	22 (6.0)
平成22年度	第1期	1 (0.3)	4 (1.1)	5 (1.4)	6 (1.6)	9 (2.4)	44 (11.9)	23 (6.2)	18 (4.9)
平成23年度	第1期	2 (0.5)	9 (2.4)	7 (1.9)	7 (1.9)	13 (3.5)	42 (11.4)	18 (4.9)	15 (4.1)
平成24年度	第1期	2 (0.5)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	12 (3.2)	35 (9.4)	13 (3.5)	15 (4.0)
	第2期	4 (1.1)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	13 (3.5)	35 (9.4)	11 (3.0)	17 (4.6)
	第3期	2 (0.5)	8 (2.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	10 (2.7)	35 (9.4)	9 (2.4)	15 (4.0)
	第4期	3 (0.8)	8 (2.2)	5 (1.3)	4 (1.1)	8 (2.2)	36 (9.7)	9 (2.4)	13 (3.5)
平成25年度	第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	5 (1.3)	4 (1.1)	7 (1.9)	38 (10.2)	12 (3.2)	14 (3.8)
	第2期	3 (0.8)	4 (1.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	8 (2.1)	37 (9.9)	12 (3.2)	14 (3.8)
	第3期	3 (0.8)	7 (1.9)	4 (1.1)	6 (1.6)	7 (1.9)	37 (9.9)	12 (3.2)	18 (4.8)
	第4期	2 (0.5)	7 (1.9)	4 (1.1)	7 (1.9)	9 (2.4)	37 (9.9)	10 (2.7)	15 (4.0)
平成26年度	第1期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	13 (3.5)
	第2期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	12 (3.2)
	第3期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	8 (2.2)	26 (7.0)	6 (1.6)	10 (2.7)
	第4期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	9 (2.4)	25 (6.8)	5 (1.4)	11 (3.0)

() : 抗 HIV 薬投与ありにしめる%

6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4 値							中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成19年度 第1期	3 (0.5)	67 (12.2)	171 (31.2)	136 (24.8)	171 (31.2)	53	601	381	381
第2期	9 (1.6)	74 (13.4)	142 (25.7)	147 (26.6)	180 (32.6)	49	601	395	397
第3期	17 (3.1)	66 (11.9)	145 (26.2)	154 (27.8)	172 (31.0)	47	601	380	384
第4期	18 (3.6)	71 (14.1)	142 (28.2)	130 (25.8)	142 (28.2)	98	601	373	385
平成20年度 第1期	26 (4.7)	66 (12.0)	150 (27.2)	153 (27.7)	157 (28.4)	49	601	386	396
第2期	29 (5.2)	63 (11.4)	142 (25.6)	149 (26.9)	171 (30.9)	47	601	392	406
第3期	33 (5.9)	59 (10.6)	154 (27.6)	141 (25.3)	170 (30.5)	44	601	382	398
第4期	38 (7.6)	49 (9.7)	139 (27.6)	122 (24.3)	155 (30.8)	98	601	376	400
平成21年度 第1期	39 (6.9)	50 (8.9)	140 (24.9)	125 (22.2)	208 (37.0)	39	601	404	431
第2期	41 (7.4)	50 (9.0)	125 (22.4)	150 (26.9)	191 (34.3)	44	601	409	429
第3期	44 (7.8)	59 (10.4)	124 (21.9)	143 (25.3)	196 (34.6)	35	601	407	425
第4期	46 (8.9)	54 (10.4)	122 (23.6)	115 (22.2)	181 (34.9)	83	601	401	420
平成22年度 第1期	49 (8.6)	53 (9.3)	131 (23.0)	153 (26.9)	183 (32.2)	32	601	400	435
第2期	53 (9.4)	50 (8.8)	127 (22.5)	141 (25.0)	194 (34.3)	36	601	409	430
第3期	55 (9.6)	50 (8.8)	127 (22.3)	133 (23.3)	205 (36.0)	31	601	411	444
第4期	61 (11.8)	50 (9.7)	107 (20.7)	125 (24.2)	173 (33.5)	85	601	397	439
平成23年度 第1期	62 (11.0)	47 (8.3)	115 (20.4)	149 (26.5)	190 (33.7)	38	601	414	442
第2期	63 (11.1)	45 (7.9)	124 (21.8)	135 (23.7)	203 (35.6)	31	601	409	441
第3期	66 (11.7)	45 (8.0)	113 (20.1)	137 (24.3)	202 (35.9)	38	601	406	448
第4期	68 (12.5)	45 (8.3)	102 (18.7)	131 (24.0)	199 (36.5)	56	601	407	440
平成24年度 第1期	71 (12.6)	37 (6.6)	105 (18.6)	147 (26.1)	204 (36.2)	37	601	421	458
第2期	73 (12.9)	37 (6.6)	115 (20.4)	137 (24.3)	202 (35.8)	37	601	416	450
第3期	74 (13.1)	35 (6.2)	115 (20.4)	129 (22.8)	212 (37.5)	36	601	436	469
第4期	77 (14.9)	31 (6.0)	100 (19.3)	118 (22.8)	192 (37.1)	83	601	411	467
平成25年度 第1期	78 (13.7)	34 (6.0)	114 (20.1)	119 (21.0)	223 (39.3)	33	601	417	469
第2期	81 (14.2)	39 (6.8)	93 (16.3)	146 (25.6)	212 (37.1)	30	601	431	466
第3期	82 (14.2)	41 (7.1)	89 (15.4)	137 (23.7)	228 (39.5)	24	601	427	473
第4期	86 (16.3)	29 (5.5)	90 (17.0)	122 (23.1)	202 (38.2)	72	601	419	482
平成26年度 第1期	88 (15.5)	35 (6.2)	88 (15.5)	129 (22.8)	227 (40.0)	34	601	429	484
第2期	89 (15.5)	41 (7.1)	77 (13.4)	134 (23.3)	233 (40.6)	27	601	441	490
第3期	92 (16.1)	36 (6.3)	65 (11.4)	131 (22.9)	248 (43.4)	29	601	449	507
第4期	93 (17.2)	34 (6.3)	71 (13.1)	114 (21.1)	228 (42.2)	61	601	436	506

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4/CD8比								中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
									含む	含まず
平成19年度 第1期	3 (0.6)	4 (0.8)	188 (36.4)	212 (41.1)	81 (15.7)	28 (5.4)	85	601	0.59	0.60
第2期	9 (1.7)	5 (1.0)	181 (34.7)	220 (42.1)	77 (14.8)	30 (5.7)	79	601	0.60	0.60
第3期	17 (3.2)	5 (1.0)	161 (30.7)	222 (42.4)	91 (17.4)	28 (5.3)	77	601	0.62	0.65
第4期	18 (3.8)	6 (1.3)	155 (32.9)	197 (41.8)	73 (15.5)	22 (4.7)	130	601	0.59	0.60
平成20年度 第1期	26 (4.9)	6 (1.1)	161 (30.4)	227 (42.9)	85 (16.1)	24 (4.5)	72	601	0.60	0.62
第2期	29 (5.5)	7 (1.3)	159 (30.0)	206 (38.9)	99 (18.7)	30 (5.7)	71	601	0.60	0.65
第3期	33 (6.2)	6 (1.1)	146 (27.5)	214 (40.3)	104 (19.6)	28 (5.3)	70	601	0.62	0.67
第4期	38 (7.9)	5 (1.0)	126 (26.2)	195 (40.5)	89 (18.5)	28 (5.8)	120	601	0.63	0.69
平成21年度 第1期	39 (7.5)	6 (1.1)	145 (27.7)	206 (39.4)	97 (18.5)	30 (5.7)	78	601	0.62	0.68
第2期	41 (7.9)	2 (0.4)	134 (26.0)	215 (41.7)	92 (17.8)	32 (6.2)	85	601	0.62	0.69
第3期	44 (8.2)	6 (1.1)	137 (25.6)	217 (40.6)	98 (18.3)	33 (6.2)	66	601	0.62	0.68
第4期	46 (9.5)	6 (1.2)	117 (24.1)	202 (41.6)	90 (18.6)	24 (4.9)	116	601	0.62	0.70
平成22年度 第1期	49 (9.1)	5 (0.9)	130 (24.2)	229 (42.6)	90 (16.7)	35 (6.5)	63	601	0.64	0.70
第2期	53 (10.0)	2 (0.4)	118 (22.2)	223 (42.0)	93 (17.5)	42 (7.9)	70	601	0.64	0.70
第3期	55 (10.3)	3 (0.6)	127 (23.7)	213 (39.7)	93 (17.4)	45 (8.4)	65	601	0.68	0.71
第4期	61 (12.5)	3 (0.6)	108 (22.1)	190 (38.9)	88 (18.0)	38 (7.8)	113	601	0.66	0.71
平成23年度 第1期	62 (11.7)	2 (0.4)	120 (22.6)	217 (40.9)	83 (15.6)	47 (8.9)	70	601	0.66	0.72
第2期	63 (11.7)	1 (0.2)	114 (21.1)	221 (40.9)	99 (18.3)	42 (7.8)	61	601	0.64	0.70
第3期	66 (12.3)	1 (0.2)	107 (20.0)	219 (40.9)	104 (19.4)	39 (7.3)	65	601	0.68	0.72
第4期	68 (13.2)	3 (0.6)	99 (19.1)	216 (41.8)	82 (15.9)	49 (9.5)	84	601	0.69	0.75
平成24年度 第1期	71 (13.3)	1 (0.2)	102 (19.1)	218 (40.7)	98 (18.3)	45 (8.4)	66	601	0.70	0.76
第2期	73 (13.6)	0 (0.0)	100 (18.7)	208 (38.8)	110 (20.5)	45 (8.4)	65	601	0.70	0.79
第3期	74 (13.8)	1 (0.2)	103 (19.3)	200 (37.4)	105 (19.6)	52 (9.7)	66	601	0.70	0.80
第4期	77 (15.7)	1 (0.2)	84 (17.1)	181 (36.8)	102 (20.7)	47 (9.6)	109	601	0.70	0.80
平成25年度 第1期	78 (14.3)	1 (0.2)	101 (18.5)	215 (39.4)	96 (17.6)	55 (10.1)	55	601	0.70	0.75
第2期	81 (14.9)	1 (0.2)	90 (16.5)	225 (41.3)	94 (17.2)	54 (9.9)	56	601	0.70	0.78
第3期	82 (14.9)	2 (0.4)	81 (14.7)	228 (41.4)	108 (19.6)	50 (9.1)	50	601	0.70	0.80
第4期	86 (17.0)	2 (0.4)	78 (15.4)	193 (38.2)	92 (18.2)	54 (10.7)	96	601	0.70	0.80
平成26年度 第1期	88 (16.3)	2 (0.4)	81 (15.0)	221 (41.0)	95 (17.6)	52 (9.6)	62	601	0.68	0.76
第2期	89 (16.3)	2 (0.4)	82 (15.0)	219 (40.2)	101 (18.5)	52 (9.5)	56	601	0.72	0.80
第3期	92 (16.8)	1 (0.2)	68 (12.5)	219 (40.1)	102 (18.7)	64 (11.7)	55	601	0.72	0.82
第4期	93 (17.9)	2 (0.4)	70 (13.5)	192 (36.9)	109 (21.0)	54 (10.4)	81	601	0.72	0.85

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）		
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含む	含まず
平成19年度 第1期	154 (26.6)	240 (41.4)	163 (28.1)	20 (3.4)	3 (0.5)	21	601	394	(67.9)	(68.3)
第2期	162 (27.8)	219 (37.6)	169 (29.0)	23 (4.0)	9 (1.5)	19	601	381	(65.5)	(66.5)
第3期	157 (26.8)	214 (36.6)	178 (30.4)	19 (3.2)	17 (2.9)	16	601	371	(63.4)	(65.3)
第4期	157 (27.0)	207 (35.6)	184 (31.7)	15 (2.6)	18 (3.1)	20	601	364	(62.7)	(64.7)
平成20年度 第1期	148 (25.3)	231 (39.4)	161 (27.5)	20 (3.4)	26 (4.4)	15	601	379	(64.7)	(67.7)
第2期	148 (25.5)	208 (35.8)	172 (29.6)	24 (4.1)	29 (5.0)	20	601	356	(61.3)	(64.5)
第3期	146 (25.3)	213 (36.9)	164 (28.4)	22 (3.8)	33 (5.7)	23	601	359	(62.1)	(65.9)
第4期	156 (26.6)	196 (33.4)	175 (29.8)	22 (3.7)	38 (6.5)	14	601	352	(60.0)	(64.1)
平成21年度 第1期	136 (23.4)	228 (39.2)	166 (28.5)	13 (2.2)	39 (6.7)	19	601	364	(62.5)	(67.0)
第2期	145 (24.7)	216 (36.8)	167 (28.4)	18 (3.1)	41 (7.0)	14	601	361	(61.5)	(66.1)
第3期	137 (23.5)	217 (37.3)	167 (28.7)	17 (2.9)	44 (7.6)	19	601	354	(60.8)	(65.8)
第4期	139 (23.8)	211 (36.1)	174 (29.7)	15 (2.6)	46 (7.9)	16	601	350	(59.8)	(64.9)
平成22年度 第1期	142 (24.3)	213 (36.4)	162 (27.7)	19 (3.2)	49 (8.4)	16	601	355	(60.7)	(66.2)
第2期	146 (25.0)	207 (35.4)	160 (27.4)	19 (3.2)	53 (9.1)	16	601	353	(60.3)	(66.4)
第3期	142 (24.0)	199 (33.7)	175 (29.6)	20 (3.4)	55 (9.3)	10	601	341	(57.7)	(63.6)
第4期	141 (24.1)	205 (35.1)	154 (26.4)	23 (3.9)	61 (10.4)	17	601	346	(59.2)	(66.2)
平成23年度 第1期	134 (22.9)	216 (36.9)	150 (25.6)	23 (3.9)	62 (10.6)	16	601	350	(59.8)	(66.9)
第2期	138 (23.6)	204 (34.9)	153 (26.2)	27 (4.6)	63 (10.8)	16	601	342	(58.5)	(65.5)
第3期	138 (23.4)	204 (34.6)	161 (27.3)	21 (3.6)	66 (11.2)	11	601	342	(58.0)	(65.3)
第4期	143 (24.2)	199 (33.7)	157 (26.6)	23 (3.9)	68 (11.5)	11	601	342	(58.0)	(65.5)
平成24年度 第1期	142 (24.1)	202 (34.4)	158 (26.9)	15 (2.6)	71 (12.1)	13	601	344	(58.5)	(66.5)
第2期	146 (25.0)	191 (32.7)	154 (26.4)	20 (3.4)	73 (12.5)	17	601	337	(57.7)	(65.9)
第3期	149 (25.3)	182 (30.8)	166 (28.1)	19 (3.2)	74 (12.5)	11	601	331	(56.1)	(64.1)
第4期	147 (25.0)	183 (31.2)	164 (27.9)	16 (2.7)	77 (13.1)	14	601	330	(56.2)	(64.7)
平成25年度 第1期	129 (22.2)	205 (35.3)	153 (26.4)	15 (2.6)	78 (13.4)	21	601	334	(57.6)	(66.5)
第2期	136 (23.4)	184 (31.7)	163 (28.1)	17 (2.9)	81 (13.9)	20	601	320	(55.1)	(64.0)
第3期	134 (23.1)	186 (32.1)	159 (27.4)	19 (3.3)	82 (14.1)	21	601	320	(55.2)	(64.3)
第4期	134 (22.6)	186 (31.4)	165 (27.9)	21 (3.5)	86 (14.5)	9	601	320	(54.1)	(63.2)
平成26年度 第1期	137 (23.1)	195 (32.9)	160 (27.0)	12 (2.0)	88 (14.9)	9	601	332	(56.1)	(65.9)
第2期	134 (22.8)	185 (31.5)	165 (28.1)	15 (2.6)	89 (15.1)	13	601	319	(54.3)	(63.9)
第3期	141 (23.7)	175 (29.4)	171 (28.7)	17 (2.9)	92 (15.4)	5	601	316	(53.0)	(62.7)
第4期	137 (23.2)	179 (30.3)	162 (27.4)	20 (3.4)	93 (15.7)	10	601	316	(53.5)	(63.5)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作						計	1および2（再掲）		
	1	2	3	4（4～8）	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　　む	含まず
平成19年度 第1期	153 (26.9)	182 (32.0)	124 (21.8)	106 (18.7)	3　(0.5)	33	601	335	(59.0)	(59.3)
第2期	153 (27.0)	171 (30.2)	124 (21.9)	110 (19.4)	9　(1.6)	34	601	324	(57.1)	(58.1)
第3期	151 (26.4)	178 (31.2)	119 (20.8)	106 (18.6)	17　(3.0)	30	601	329	(57.6)	(59.4)
第4期	152 (26.5)	175 (30.5)	121 (21.1)	107 (18.7)	18　(3.1)	28	601	327	(57.1)	(58.9)
平成20年度 第1期	144 (24.6)	173 (29.6)	136 (23.2)	106 (18.1)	26　(4.4)	16	601	317	(54.2)	(56.7)
第2期	143 (24.6)	164 (28.2)	131 (22.5)	114 (19.6)	29　(5.0)	20	601	307	(52.8)	(55.6)
第3期	139 (23.9)	162 (27.8)	134 (23.0)	114 (19.6)	33　(5.7)	19	601	301	(51.7)	(54.8)
第4期	143 (24.4)	168 (28.6)	130 (22.1)	108 (18.4)	38　(6.5)	14	601	311	(53.0)	(56.6)
平成21年度 第1期	142 (24.7)	164 (28.5)	133 (23.1)	97　(16.9)	39　(6.8)	26	601	306	(53.2)	(57.1)
第2期	143 (24.7)	171 (29.5)	126 (21.8)	98　(16.9)	41　(7.1)	22	601	314	(54.2)	(58.4)
第3期	138 (23.8)	158 (27.2)	133 (22.9)	107 (18.4)	44　(7.6)	21	601	296	(51.0)	(55.2)
第4期	140 (24.0)	163 (28.0)	131 (22.5)	103 (17.7)	46　(7.9)	18	601	303	(52.0)	(56.4)
平成22年度 第1期	139 (23.6)	165 (28.1)	120 (20.4)	115 (19.6)	49　(8.3)	13	601	304	(51.7)	(56.4)
第2期	136 (23.1)	162 (27.6)	125 (21.3)	112 (19.0)	53　(9.0)	13	601	298	(50.7)	(55.7)
第3期	135 (23.2)	149 (25.6)	128 (22.0)	116 (19.9)	55　(9.4)	18	601	284	(48.7)	(53.8)
第4期	137 (23.3)	149 (25.4)	131 (22.3)	109 (18.6)	61 (10.4)	14	601	286	(48.7)	(54.4)
平成23年度 第1期	135 (23.2)	157 (27.0)	121 (20.8)	107 (18.4)	62 (10.7)	19	601	292	(50.2)	(56.2)
第2期	139 (23.9)	149 (25.6)	123 (21.2)	107 (18.4)	63 (10.8)	20	601	288	(49.6)	(55.6)
第3期	137 (23.5)	151 (25.9)	119 (20.4)	111 (19.0)	66 (11.3)	17	601	288	(49.3)	(55.6)
第4期	137 (23.5)	147 (25.3)	122 (21.0)	108 (18.6)	68 (11.7)	19	601	284	(48.8)	(55.3)
平成24年度 第1期	136 (23.3)	148 (25.3)	120 (20.5)	109 (18.7)	71 (12.2)	17	601	284	(48.6)	(55.4)
第2期	135 (23.3)	139 (24.0)	125 (21.6)	108 (18.6)	73 (12.6)	21	601	274	(47.2)	(54.0)
第3期	130 (22.5)	144 (24.9)	116 (20.1)	114 (19.7)	74 (12.8)	23	601	274	(47.4)	(54.4)
第4期	128 (21.9)	144 (24.7)	119 (20.4)	116 (19.9)	77 (13.2)	17	601	272	(46.6)	(53.6)
平成25年度 第1期	127 (21.9)	139 (24.0)	122 (21.1)	113 (19.5)	78 (13.5)	22	601	266	(45.9)	(53.1)
第2期	128 (22.1)	131 (22.6)	128 (22.1)	112 (19.3)	81 (14.0)	21	601	259	(44.7)	(51.9)
第3期	125 (21.6)	133 (22.9)	129 (22.2)	111 (19.1)	82 (14.1)	21	601	258	(44.5)	(51.8)
第4期	129 (22.0)	132 (22.5)	123 (21.0)	116 (19.8)	86 (14.7)	15	601	261	(44.5)	(52.2)
平成26年度 第1期	125 (21.3)	135 (23.0)	120 (20.4)	120 (20.4)	88 (15.0)	13	601	260	(44.2)	(52.0)
第2期	121 (20.6)	129 (22.0)	125 (21.3)	122 (20.8)	89 (15.2)	15	601	250	(42.7)	(50.3)
第3期	125 (21.4)	126 (21.6)	113 (19.3)	128 (21.9)	92 (15.8)	17	601	251	(43.0)	(51.0)
第4期	127 (21.6)	129 (22.0)	117 (19.9)	121 (20.6)	93 (15.8)	14	601	256	(43.6)	(51.8)

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央値		
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡		
								含　む	含まず	
平成19年度	第1期	414 (76.1)	27 (5.0)	50 (9.2)	50 (9.2)	3 (0.6)	57	601	50	50
	第2期	414 (75.4)	24 (4.4)	56 (10.2)	46 (8.4)	9 (1.6)	52	601	50	50
	第3期	426 (76.3)	24 (4.3)	47 (8.4)	44 (7.9)	17 (3.0)	43	601	50	50
	第4期	362 (73.3)	24 (4.9)	47 (9.5)	43 (8.7)	18 (3.6)	107	601	56	50
平成20年度	第1期	409 (74.6)	35 (6.4)	44 (8.0)	34 (6.2)	26 (4.7)	53	601	50	50
	第2期	417 (75.4)	23 (4.2)	47 (8.5)	37 (6.7)	29 (5.2)	48	601	50	47
	第3期	429 (77.3)	15 (2.7)	44 (7.9)	34 (6.1)	33 (5.9)	46	601	50	41
	第4期	379 (75.6)	21 (4.2)	37 (7.4)	26 (5.2)	38 (7.6)	100	601	50	50
平成21年度	第1期	439 (79.0)	16 (2.9)	31 (5.6)	31 (5.6)	39 (7.0)	45	601	40	40
	第2期	437 (79.6)	15 (2.7)	34 (6.2)	22 (4.0)	41 (7.5)	52	601	40	40
	第3期	452 (79.7)	16 (2.8)	27 (4.8)	28 (4.9)	44 (7.8)	34	601	40	40
	第4期	403 (80.3)	10 (2.0)	23 (4.6)	20 (4.0)	46 (9.2)	99	601	40	検出せず
平成22年度	第1期	464 (82.6)	7 (1.2)	31 (5.5)	11 (2.0)	49 (8.7)	39	601	検出せず	検出せず
	第2期	460 (82.1)	12 (2.1)	23 (4.1)	12 (2.1)	53 (9.5)	41	601	検出せず	検出せず
	第3期	463 (82.4)	9 (1.6)	14 (2.5)	21 (3.7)	55 (9.8)	39	601	40	検出せず
	第4期	409 (80.0)	10 (2.0)	13 (2.5)	18 (3.5)	61 (11.9)	90	601	40	検出せず
平成23年度	第1期	454 (80.5)	13 (2.3)	22 (3.9)	13 (2.3)	62 (11.0)	37	601	検出せず	検出せず
	第2期	462 (81.3)	10 (1.8)	20 (3.5)	13 (2.3)	63 (11.1)	33	601	検出せず	検出せず
	第3期	456 (81.0)	11 (2.0)	20 (3.6)	10 (1.8)	66 (11.7)	38	601	検出せず	検出せず
	第4期	432 (79.0)	8 (1.5)	24 (4.4)	15 (2.7)	68 (12.4)	54	601	検出せず	検出せず
平成24年度	第1期	455 (80.2)	10 (1.8)	18 (3.2)	13 (2.3)	71 (12.5)	34	601	40	検出せず
	第2期	463 (81.1)	10 (1.8)	11 (1.9)	14 (2.5)	73 (12.8)	30	601	40	検出せず
	第3期	468 (81.7)	9 (1.6)	11 (1.9)	11 (1.9)	74 (12.9)	28	601	40	検出せず
	第4期	413 (79.7)	8 (1.5)	8 (1.5)	12 (2.3)	77 (14.9)	83	601	40	検出せず
平成25年度	第1期	464 (81.7)	8 (1.4)	11 (1.9)	7 (1.2)	78 (13.7)	33	601	40	40 未満
	第2期	462 (81.5)	6 (1.1)	11 (1.9)	7 (1.2)	81 (14.3)	34	601	40	検出せず
	第3期	476 (82.5)	6 (1.0)	9 (1.6)	4 (0.7)	82 (14.2)	24	601	40	検出せず
	第4期	432 (81.1)	4 (0.8)	7 (1.3)	4 (0.8)	86 (16.1)	68	601	40	検出せず
平成26年度	第1期	459 (81.2)	4 (0.7)	12 (2.1)	2 (0.4)	88 (15.6)	36	601	40 未満	検出せず
	第2期	463 (80.8)	7 (1.2)	8 (1.4)	6 (1.0)	89 (15.5)	28	601	40 未満	検出せず
	第3期	461 (79.9)	7 (1.2)	12 (2.1)	5 (0.9)	92 (15.9)	24	601	40	検出せず
	第4期	420 (78.7)	4 (0.7)	13 (2.4)	4 (0.7)	93 (17.4)	67	601	40	検出せず

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成19年度 第1期	74 (12.8)	45 (7.8)	31 (5.3)	267 (46.0)	113 (19.5)	0 (0.0)	50 (8.6)	3	18	601
第2期	75 (13.1)	45 (7.8)	29 (5.1)	259 (45.1)	115 (20.0)	0 (0.0)	51 (8.9)	9	18	601
第3期	71 (12.4)	43 (7.5)	27 (4.7)	262 (45.8)	116 (20.3)	0 (0.0)	53 (9.3)	17	12	601
第4期	69 (12.1)	39 (6.8)	28 (4.9)	267 (46.8)	114 (20.0)	4 (0.7)	49 (8.6)	18	13	601
平成20年度 第1期	67 (11.9)	33 (5.9)	29 (5.1)	269 (47.7)	109 (19.3)	5 (0.9)	52 (9.2)	26	11	601
第2期	66 (11.8)	35 (6.2)	28 (5.0)	264 (47.1)	106 (18.9)	12 (2.1)	50 (8.9)	29	11	601
第3期	61 (10.9)	36 (6.4)	27 (4.8)	257 (45.9)	105 (18.8)	29 (5.2)	45 (8.0)	33	8	601
第4期	60 (10.9)	31 (5.6)	24 (4.4)	247 (45.0)	102 (18.6)	41 (7.5)	44 (8.0)	38	14	601
平成21年度 第1期	62 (11.2)	28 (5.0)	22 (4.0)	241 (43.3)	110 (19.8)	45 (8.1)	48 (8.6)	39	6	601
第2期	61 (11.0)	29 (5.2)	19 (3.4)	231 (41.6)	110 (19.8)	55 (9.9)	50 (9.0)	41	5	601
第3期	60 (10.8)	26 (4.7)	19 (3.4)	220 (39.8)	106 (19.2)	73 (13.2)	49 (8.9)	44	4	601
第4期	56 (10.2)	24 (4.4)	18 (3.3)	218 (39.9)	104 (19.0)	79 (14.4)	48 (8.8)	46	8	601
平成22年度 第1期	53 (9.7)	26 (4.8)	17 (3.1)	211 (38.6)	107 (19.6)	91 (16.7)	41 (7.5)	49	6	601
第2期	52 (9.6)	26 (4.8)	17 (3.1)	204 (37.7)	105 (19.4)	98 (18.1)	39 (7.2)	53	7	601
第3期	49 (9.1)	28 (5.2)	15 (2.8)	196 (36.2)	103 (19.0)	109 (20.1)	41 (7.6)	55	5	601
第4期	49 (9.2)	26 (4.9)	16 (3.0)	183 (34.5)	99 (18.7)	119 (22.5)	38 (7.2)	61	10	601
平成23年度 第1期	45 (8.4)	26 (4.8)	14 (2.6)	185 (34.5)	97 (18.1)	137 (25.5)	33 (6.1)	62	2	601
第2期	43 (8.0)	23 (4.3)	15 (2.8)	183 (34.1)	97 (18.1)	139 (25.9)	36 (6.7)	63	2	601
第3期	42 (7.9)	22 (4.1)	14 (2.6)	175 (32.8)	96 (18.0)	149 (28.0)	35 (6.6)	66	2	601
第4期	40 (7.6)	19 (3.6)	14 (2.7)	174 (33.0)	90 (17.0)	160 (30.3)	31 (5.9)	68	5	601
平成24年度 第1期	37 (7.1)	16 (3.1)	13 (2.5)	162 (31.1)	86 (16.5)	173 (33.2)	34 (6.5)	71	9	601
第2期	36 (6.9)	14 (2.7)	11 (2.1)	152 (29.2)	87 (16.7)	186 (35.8)	34 (6.5)	73	8	601
第3期	35 (6.7)	12 (2.3)	12 (2.3)	142 (27.3)	87 (16.7)	197 (37.9)	35 (6.7)	74	7	601
第4期	32 (6.2)	12 (2.3)	11 (2.1)	137 (26.5)	91 (17.6)	201 (38.9)	33 (6.4)	77	7	601
平成25年度 第1期	29 (5.6)	12 (2.3)	9 (1.7)	127 (24.6)	89 (17.2)	210 (40.6)	41 (7.9)	78	6	601
第2期	26 (5.1)	10 (1.9)	8 (1.6)	121 (23.6)	89 (17.3)	218 (42.5)	41 (8.0)	81	7	601
第3期	25 (4.9)	9 (1.8)	8 (1.6)	115 (22.5)	89 (17.4)	225 (43.9)	41 (8.0)	82	7	601
第4期	24 (4.7)	12 (2.4)	7 (1.4)	112 (22.0)	84 (16.5)	230 (45.2)	40 (7.9)	86	6	601
平成26年度 第1期	23 (4.5)	10 (2.0)	8 (1.6)	116 (22.8)	81 (15.9)	241 (47.4)	29 (5.7)	88	5	601
第2期	23 (4.5)	9 (1.8)	9 (1.8)	95 (18.7)	73 (14.4)	271 (53.3)	28 (5.5)	89	4	601
第3期	23 (4.5)	9 (1.8)	9 (1.8)	87 (17.2)	68 (13.4)	283 (55.8)	28 (5.5)	92	2	601
第4期	23 (4.6)	9 (1.8)	10 (2.0)	77 (15.3)	68 (13.5)	288 (57.3)	28 (5.6)	93	5	601

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	119	18	3	601
第2期	420 (93.3)	12 (2.7)	10 (2.2)	3 (0.7)	5 (1.1)	4	120	18	9	601
第3期	422 (93.0)	17 (3.7)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	4	114	12	17	601
第4期	421 (92.7)	17 (3.7)	7 (1.5)	3 (0.7)	6 (1.3)	8	108	13	18	601
平成20年度 第1期	431 (93.7)	16 (3.5)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.7)	4	100	11	26	601
第2期	428 (93.9)	16 (3.5)	5 (1.1)	3 (0.7)	4 (0.9)	4	101	11	29	601
第3期	431 (93.7)	15 (3.3)	7 (1.5)	4 (0.9)	3 (0.7)	3	97	8	33	601
第4期	425 (93.6)	15 (3.3)	5 (1.1)	5 (1.1)	4 (0.9)	4	91	14	38	601
平成21年度 第1期	434 (93.7)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	90	6	39	601
第2期	435 (94.2)	13 (2.8)	8 (1.7)	3 (0.6)	3 (0.6)	3	90	5	41	601
第3期	439 (94.6)	12 (2.6)	5 (1.1)	3 (0.6)	5 (1.1)	3	86	4	44	601
第4期	440 (94.8)	13 (2.8)	6 (1.3)	2 (0.4)	3 (0.6)	3	80	8	46	601
平成22年度 第1期	433 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	79	6	49	601
第2期	430 (95.1)	16 (3.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	78	7	53	601
第3期	432 (94.9)	14 (3.1)	3 (0.7)	2 (0.4)	4 (0.9)	9	77	5	55	601
第4期	429 (96.4)	10 (2.2)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	10	75	10	61	601
平成23年度 第1期	447 (96.5)	9 (1.9)	4 (0.9)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	71	2	62	601
第2期	448 (95.9)	10 (2.1)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.1)	3	66	2	63	601
第3期	449 (96.4)	8 (1.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	6 (1.3)	3	64	2	66	601
第4期	446 (96.3)	8 (1.7)	4 (0.9)	0 (0.0)	5 (1.1)	6	59	5	68	601
平成24年度 第1期	452 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	53	9	71	601
第2期	454 (96.6)	11 (2.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	50	8	73	601
第3期	459 (97.0)	9 (1.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	47	7	74	601
第4期	459 (97.0)	9 (1.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	0	44	7	77	601
平成25年度 第1期	464 (97.5)	4 (0.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	4 (0.8)	0	41	6	78	601
第2期	462 (96.9)	6 (1.3)	4 (0.8)	0 (0.0)	5 (1.0)	0	36	7	81	601
第3期	465 (97.3)	5 (1.0)	3 (0.6)	2 (0.4)	3 (0.6)	0	34	7	82	601
第4期	460 (97.3)	7 (1.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	36	6	86	601
平成26年度 第1期	457 (96.4)	16 (3.4)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	33	5	88	601
第2期	459 (96.6)	13 (2.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	32	4	89	601
第3期	457 (96.4)	13 (2.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	32	2	92	601
第4期	451 (96.6)	14 (3.0)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	32	5	93	601

(): 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

		副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
		あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成19年度	第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
	第2期	139 (30.6)	266 (58.6)	49 (10.8)	454	18 (4.0)	36 (7.9)	6 (1.3)	10 (2.2)
	第3期	137 (29.9)	276 (60.3)	45 (9.8)	458	15 (3.3)	39 (8.5)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第4期	131 (28.4)	281 (60.8)	50 (10.8)	462	14 (3.0)	37 (8.0)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成20年度	第1期	145 (31.3)	301 (64.9)	18 (3.9)	464	20 (4.3)	31 (6.7)	5 (1.1)	9 (1.9)
	第2期	148 (32.2)	296 (64.3)	16 (3.5)	460	20 (4.3)	31 (6.7)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第3期	145 (31.3)	304 (65.7)	14 (3.0)	463	20 (4.3)	25 (5.4)	6 (1.3)	7 (1.5)
	第4期	134 (29.3)	306 (66.8)	18 (3.9)	458	22 (4.8)	26 (5.7)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成21年度	第1期	128 (27.5)	321 (68.9)	17 (3.6)	466	11 (2.4)	27 (5.8)	3 (0.6)	9 (1.9)
	第2期	123 (26.5)	324 (69.7)	18 (3.9)	465	7 (1.5)	31 (6.7)	5 (1.1)	10 (2.2)
	第3期	125 (26.8)	328 (70.2)	14 (3.0)	467	8 (1.7)	29 (6.2)	4 (0.9)	8 (1.7)
	第4期	115 (24.6)	336 (71.9)	16 (3.4)	467	8 (1.7)	27 (5.8)	5 (1.1)	7 (1.5)
平成22年度	第1期	129 (27.6)	328 (70.2)	10 (2.1)	467	14 (3.0)	25 (5.4)	1 (0.2)	7 (1.5)
	第2期	127 (27.4)	326 (70.4)	10 (2.2)	463	14 (3.0)	26 (5.6)	1 (0.2)	8 (1.7)
	第3期	123 (26.5)	331 (71.3)	10 (2.2)	464	12 (2.6)	23 (5.0)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第4期	116 (25.5)	328 (72.1)	11 (2.4)	455	12 (2.6)	21 (4.6)	2 (0.4)	7 (1.5)
平成23年度	第1期	124 (26.6)	325 (69.7)	17 (3.6)	466	14 (3.0)	18 (3.9)	2 (0.4)	4 (0.9)
	第2期	125 (26.6)	329 (70.0)	16 (3.4)	470	14 (3.0)	18 (3.8)	4 (0.9)	3 (0.6)
	第3期	124 (26.4)	328 (69.9)	17 (3.6)	469	17 (3.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	4 (0.9)
	第4期	124 (26.4)	329 (70.1)	16 (3.4)	469	16 (3.4)	18 (3.8)	4 (0.9)	6 (1.3)
平成24年度	第1期	110 (23.5)	347 (74.1)	11 (2.4)	468	12 (2.6)	17 (3.6)	4 (0.9)	9 (1.9)
	第2期	111 (23.6)	347 (73.8)	12 (2.6)	470	11 (2.3)	17 (3.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
	第3期	106 (22.4)	352 (74.4)	15 (3.2)	473	14 (3.0)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
	第4期	103 (21.8)	356 (75.3)	14 (3.0)	473	13 (2.7)	18 (3.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成25年度	第1期	103 (21.6)	364 (76.5)	9 (1.9)	476	8 (1.7)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
	第2期	101 (21.2)	365 (76.5)	11 (2.3)	477	10 (2.1)	16 (3.4)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第3期	104 (21.8)	364 (76.2)	10 (2.1)	478	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.3)
	第4期	104 (22.0)	359 (75.9)	10 (2.1)	473	7 (1.5)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
平成26年度	第1期	75 (15.8)	385 (81.1)	15 (3.2)	475	7 (1.5)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
	第2期	73 (15.3)	390 (81.9)	13 (2.7)	476	7 (1.5)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
	第3期	71 (14.9)	391 (82.3)	13 (2.7)	475	7 (1.5)	15 (3.2)	4 (0.8)	1 (0.2)
	第4期	71 (15.1)	384 (81.5)	16 (3.4)	471	7 (1.5)	14 (3.0)	4 (0.8)	1 (0.2)

()：抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-6-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

		副作用 (項目別)							
		血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成19年度	第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
	第2期	3 (0.7)	6 (1.3)	14 (3.1)	9 (2.0)	18 (4.0)	36 (7.9)	27 (5.9)	20 (4.4)
	第3期	1 (0.2)	6 (1.3)	11 (2.4)	8 (1.7)	17 (3.7)	37 (8.1)	26 (5.7)	17 (3.7)
	第4期	1 (0.2)	5 (1.1)	11 (2.4)	6 (1.3)	15 (3.2)	37 (8.0)	27 (5.8)	17 (3.7)
平成20年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	8 (1.7)	20 (4.3)	43 (9.3)	28 (6.0)	30 (6.5)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	19 (4.1)	42 (9.1)	27 (5.9)	32 (7.0)
	第3期	3 (0.6)	6 (1.3)	7 (1.5)	10 (2.2)	19 (4.1)	43 (9.3)	29 (6.3)	28 (6.0)
	第4期	3 (0.7)	7 (1.5)	5 (1.1)	11 (2.4)	18 (3.9)	42 (9.2)	25 (5.5)	26 (5.7)
平成21年度	第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.6)	27 (5.8)	25 (5.4)
	第2期	1 (0.2)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	12 (2.6)	39 (8.4)	26 (5.6)	22 (4.7)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	9 (1.9)	11 (2.4)	10 (2.1)	39 (8.4)	27 (5.8)	26 (5.6)
	第4期	1 (0.2)	7 (1.5)	8 (1.7)	13 (2.8)	11 (2.4)	38 (8.1)	24 (5.1)	22 (4.7)
平成22年度	第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.5)	28 (6.0)	20 (4.3)
	第2期	1 (0.2)	4 (0.9)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	49 (10.6)	28 (6.0)	16 (3.5)
	第3期	1 (0.2)	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	13 (2.8)	48 (10.3)	27 (5.8)	17 (3.7)
	第4期	2 (0.4)	5 (1.1)	6 (1.3)	9 (2.0)	11 (2.4)	47 (10.3)	26 (5.7)	13 (2.9)
平成23年度	第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.7)	24 (5.2)	18 (3.9)
	第2期	2 (0.4)	10 (2.1)	7 (1.5)	11 (2.3)	19 (4.0)	45 (9.6)	24 (5.1)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	10 (2.1)	8 (1.7)	9 (1.9)	23 (4.9)	46 (9.8)	24 (5.1)	22 (4.7)
	第4期	3 (0.6)	10 (2.1)	11 (2.3)	9 (1.9)	21 (4.5)	45 (9.6)	24 (5.1)	18 (3.8)
平成24年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.3)	15 (3.2)	20 (4.3)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.3)	13 (2.8)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.2)	11 (2.3)	19 (4.0)
	第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.3)	5 (1.1)	11 (2.3)	40 (8.5)	11 (2.3)	17 (3.6)
平成25年度	第1期	2 (0.4)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	43 (9.0)	17 (3.6)	17 (3.6)
	第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	42 (8.8)	16 (3.4)	17 (3.6)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	5 (1.0)	7 (1.5)	11 (2.3)	42 (8.8)	16 (3.3)	22 (4.6)
	第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.1)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.9)	14 (3.0)	18 (3.8)
平成26年度	第1期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	4 (0.8)	13 (2.7)	32 (6.7)	8 (1.7)	14 (2.9)
	第2期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	5 (1.1)	13 (2.7)	32 (6.7)	7 (1.5)	13 (2.7)
	第3期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.3)	32 (6.7)	6 (1.3)	13 (2.7)
	第4期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	31 (6.6)	5 (1.1)	14 (3.0)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本節では、以下の表を示した。

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更（延べ数、平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更 → その時点 → 前の時点	平成9年度				平成10年度				平成11年度				平成12年度				平成13年度				平成14年度				平成15年度				平成16年度				平成17年度				
	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期					
投与なし(投与歴なし) →投与なし(投与歴なし) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤 + PI 1・2剤 →NRTI 2剤 + NNRTI	-	105	110	107	102	94	94	83	81	87	84	80	81	87	86	82	67	59	60	59	62	70	69	64	59	55	62	61	61	66	64	62	58	59	60	59	
	-	3	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	2	3	2	5	3	1	0	1	2	1	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
投与なし(投与歴あり) →投与なし(投与歴あり) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤 + PI 1・2剤 →NRTI 2剤 + NNRTI	-	11	11	13	18	23	25	26	22	24	24	24	22	30	30	26	16	23	29	28	28	37	37	43	40	42	46	41	41	47	48	44	42	42	45	39	
	-	3	2	6	2	1	0	1	5	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
	-	1	0	0	3	3	3	6	8	1	1	4	3	0	4	1	8	1	0	2	5	3	1	5	3	1	3	2	6	6	2	3	1	3	3		
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	2	1	4	1	3	1	3	2	3	1	2	0	1	0	0	2	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRTI 1剤 →NRTI 1剤 →NRTI 2剤 →投与なし(投与歴あり)	-	30	26	22	17	15	12	11	11	12	11	10	6	9	8	7	7	7	6	3	3	4	4	4	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	
	-	15	6	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	-	176	167	154	137	130	116	106	93	98	96	87	79	81	76	71	64	66	61	60	58	60	58	54	54	55	51	48	47	45	45	42	42	39	37		
	-	28	26	17	20	13	13	9	7	2	2	2	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	2	3	2	0	0	0	1	0	1	
NRTI 2剤 →NRTI 2剤 + PI 1・2剤 →NRTI 2剤 + NNRTI →投与なし(投与歴あり)	-	0	3	1	0	0	0	1	3	1	2	3	3	1	0	2	1	4	3	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	
	-	1	7	4	7	1	3	2	1	2	1	4	3	1	2	2	2	2	1	0	1	0	2	4	0	1	2	1	2	0	0	1	0	1	0	0	
	-	85	121	149	158	192	208	216	223	239	232	228	211	210	207	198	192	201	193	172	164	184	181	167	157	163	167	165	160	180	187	182	162	167	171	172	
	-	67	95	136	123	169	192	198	204	226	223	213	196	198	197	191	175	196	182	164	145	175	171	163	148	160	163	153	132	161	174	175	136	160	166	162	
	-	9	14	7	19	12	9	9	14	5	7	12	10	9	8	6	14	4	5	7	14	6	6	2	4	1	3	6	17	9	8	6	13	5	4	8	
NRTI 2剤 + PI 1・2剤 →NRTI 2剤 + NNRTI →INSTI →投与なし(投与歴あり)	-	9	12	6	16	11	7	9	5	8	2	3	5	3	2	1	3	1	6	1	5	3	4	2	5	2	1	6	11	10	5	1	13	2	1	2	
	-	0	1	2	0	0	0	2	1	1	2	2	1	3	3	2	4	7	7	2	6	3	1	4	3	3	0	2	2	0	0	2	6	3	2	1	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	1	1	3	1	2	5	5	1	2	3	1	2	6	1	5	1	3	1	5	5	2	4	3	2	4	1	4	3	2	0	1	4	2	3	4	
	-	0	0	2	1	0	0	0	0	4	3	7	8	25	31	37	41	48	56	64	58	64	62	64	65	74	81	81	78	83	82	79	75	82	84	88	
NRTI 2剤 + NNRTI →NRTI 2剤 + NNRTI →NRTI 2剤 + PI 1・2剤 →INSTI →投与なし(投与歴あり)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	46	41	36	36	29	26	30	27	27	38	38	41	43	41	41	45	42	41	41	41	43	44	41	49	46	43	41	41	43	38	37	46	50	46	40	
その他 AIDS 発病・死亡 不明 計	-	9	11	16	19	20	25	29	31	32	34	36	43	47	53	53	56	60	61	62	63	66	70	76	78	81	85	90	90	95	102	106	109	114	117		
	-	64	43	32	45	52	46	53	64	47	44	50	58	32	33	51	68	55	55	76	74	36	35	44	62	49	32	34	34	10	12	19	28	14	9	11	
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581

表4-7-1 (続き). 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更 前の時点 → その時点	平成18年度				平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				計	
	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期						
投与なし(投与歴なし) →投与なし(投与歴なし) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	53	53	50	47	44	44	44	41	39	41	39	38	37	39	39	37	35	34	32	32	28	27	26	24	22	22	21	19	17	16	15	15	15	3729				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16				
	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44				
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0	1	0	23			
NRTI 1剤 →NRTI 1剤 →NRTI 2剤 →投与なし(投与歴あり)	1	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286			
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
	31	32	31	31	25	25	23	22	23	23	22	21	20	17	17	16	13	15	13	13	11	12	12	12	10	10	10	10	8	7	7	6	5	7	8	3271		
	1	1	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172			
NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI →投与なし(投与歴あり)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	41			
	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70			
	164	175	180	187	183	200	194	197	193	198	189	184	168	170	163	157	148	149	142	129	125	136	130	127	117	111	103	99	91	91	89	87	84	74	65	59	11422	
	148	166	163	178	157	186	186	185	168	193	184	181	151	164	162	155	138	148	142	128	117	131	129	127	111	108	101	99	86	91	89	87	79	74	64	58	10723	
	9	5	6	7	19	7	4	5	19	4	1	1	14	4	1	1	5	1	0	1	6	4	1	0	3	0	2	0	4	0	0	0	4	0	1	1	432	
投与なし(投与歴なし) →変更薬剤 1剤 →変更薬剤 2剤以上 →NRTI 2剤+NNRTI →INSTI →投与なし(投与歴あり)	7	4	11	2	7	7	4	7	6	1	4	2	3	2	0	1	5	0	0	0	2	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	267		
	0	1	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	106			
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	2	8	8	7	4	3	4	7	8	3	1	3	2	6	5	8	3	7	4	1	2	3	14	9	7	145	
	3	1	0	1	2	1	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	113		
	85	81	85	85	81	88	87	84	81	80	78	76	76	79	78	77	73	77	75	73	67	70	68	64	61	65	64	66	64	65	65	61	57	52	49	48	4112	
NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →INSTI →投与なし(投与歴あり)	1	2	1	2	2	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	67		
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	2	3	0	3	2	3	1	2	0	2	2	1	0	2	0	2	1	0	1	2	7	3	0	47	
	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他 →INSTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI →投与なし(投与歴あり)	48	43	46	43	45	35	37	38	42	40	38	31	38	38	38	36	42	32	32	31	35	27	28	28	34	30	29	28	38	33	31	31	33	23	21	23	2643	
	120	125	125	128	131	136	141	142	150	152	155	159	159	161	163	165	168	171	173	178	179	180	182	184	184	185	186	189	190	191	191	193	193	194	197	198	8119	
	24	18	16	14	20	12	10	11	11	6	7	11	14	4	3	5	7	4	3	6	7	1	1	1	4	9	5	4	4	5	4	5	4	8	5	3	5	1778
	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	41251	
	計																																					

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2674	453	446	440	0.000	1542	358	353	347	0.865
→NRTI 2 剤	14	371	422	462	0.026	8	371	340	484	0.039
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	37	272	334	393	0.000	23	193	214	278	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	20	191	194	243	0.068
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1324	352	345	342	0.000	1035	319	313	312	0.231
→NRTI 2 剤	31	313	318	334	0.242	22	307	312	326	0.189
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	120	227	286	294	0.000	99	205	235	271	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	38	212	201	193	0.273	32	181	156	182	0.127
→INSTI	16	281	308	322	0.065	15	265	288	307	0.107
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2759	391	392	391	0.349	1825	338	344	343	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	152	266	297	315	0.000	113	240	274	288	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	213	225	236	0.590	32	211	225	227	0.632
→投与なし(投与歴あり)	60	377	346	312	0.015	42	319	293	286	0.257
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9732	414	418	420	0.000	5998	318	327	331	0.000
内訳 変更薬剤なし	9109	419	424	425	0.000	5553	322	331	335	0.000
変更薬剤 1 剤	381	361	366	385	0.059	265	294	297	312	0.000
変更薬剤 2 剤以上	242	282	277	279	0.017	180	228	231	234	0.006
→NRTI 2 剤+NNRTI	91	394	406	398	0.989	60	338	323	344	0.270
→INSTI	126	451	431	446	0.923	70	324	315	311	0.064
→投与なし(投与歴あり)	84	419	328	313	0.000	49	288	231	233	0.006
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3457	410	413	416	0.011	2233	327	334	336	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	59	310	300	309	0.652	44	234	246	276	0.004
→INSTI	43	361	365	387	0.064	30	263	290	291	0.182
→投与なし(投与歴あり)	28	297	202	219	0.002	23	268	166	203	0.020
INSTI										
→INSTI	2378	396	401	405	0.000	1578	303	308	314	0.000

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1670	408	401	394	0.000	1322	470	460	454	0.000
→NRTI 2 剤	10	375	430	499	0.064	13	374	485	476	0.011
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	244	293	343	0.000	24	333	426	465	0.001
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	6	244	299	269	0.219
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	980	339	327	327	0.000	368	350	339	340	0.004
→NRTI 2 剤	15	286	318	317	0.330	25	313	318	317	0.538
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	205	235	275	0.000	43	292	331	345	0.016
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	199	166	187	0.187	6	142	220	194	0.438
→INSTI	15	265	288	307	0.107	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1119	355	352	351	0.285	1687	379	380	380	0.841
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	107	255	290	316	0.000	127	260	301	309	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	212	225	219	0.695	26	211	220	213	0.610
→投与なし(投与歴あり)	35	363	339	285	0.009	42	356	353	308	0.257
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1875	270	281	285	0.016	3318	358	368	376	0.000
内訳 変更薬剤なし	1643	279	288	291	0.278	3048	367	378	383	0.000
変更薬剤 1 剤	112	261	278	297	0.001	165	290	300	324	0.001
変更薬剤 2 剤以上	120	188	208	224	0.008	105	191	200	224	0.042
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	225	296	324	0.124	44	388	375	391	0.810
→INSTI	11	86	140	197	0.019	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	37	333	288	285	0.043	39	389	355	324	0.034
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	254	282	284	282	0.969	301	339	342	329	0.246
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	171	215	261	0.019	19	252	243	243	0.424
→INSTI	5	159	172	196	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	366	276	277	0.875	6	256	212	229	0.313
INSTI										
→INSTI	59	222	251	252	0.001	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-2(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	CD4値(中央値)			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値(中央値)			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	776	423	411	405	0.000	576	446	443	438	0.001
→NRTI 2 剤	1	217	101	163	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	193	202	259	0.152	4	263	414	416	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	8	199	233	272	0.078	6	169	126	234	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	594	327	315	310	0.000	362	395	390	383	0.254
→NRTI 2 剤	4	366	302	440	0.875	2	226	351	332	0.500
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	56	199	253	286	0.000	21	212	217	212	0.096
→NRTI 2 剤+NNRTI	27	209	164	187	0.179	5	361	338	418	0.625
→INSTI	0	—	—	—	—	16	281	308	322	0.065
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	741	405	401	399	0.126	331	437	440	440	0.357
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	16	259	234	384	0.117	9	303	306	413	0.910
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	289	259	240	0.846	1	505	589	609	1.000
→投与なし(投与歴あり)	14	513	422	377	0.007	4	364	307	277	0.625
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2936	431	431	430	0.327	3478	457	459	461	0.027
内訳 変更薬剤なし	2725	436	438	435	0.389	3336	458	460	464	0.031
変更薬剤 1 剤	123	414	410	415	0.680	93	413	421	418	0.936
変更薬剤 2 剤以上	88	316	327	308	0.227	49	471	458	459	0.429
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	483	516	463	0.819	13	289	278	310	0.376
→INSTI	0	—	—	—	—	126	451	431	446	0.923
→投与なし(投与歴あり)	37	488	325	326	0.000	8	241	234	210	0.023
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1339	392	396	400	0.131	1817	437	436	439	0.083
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	316	295	355	0.512	11	423	432	394	0.577
→INSTI	0	—	—	—	—	43	361	365	387	0.064
→投与なし(投与歴あり)	19	268	194	165	0.045	3	442	361	270	0.250
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	2378	396	401	405	0.000

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2495	1700	1800	1700	0.000	1500	3800	4000	3700	0.000
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	7	69000	28000	1500	0.016
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	35	8800	450	200	0.000	23	20000	590	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	22	41700	600	160	0.004
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1298	3150	3500	3100	0.000	1031	4600	5800	4400	0.001
→NRTI 2 剤	23	830	900	420	0.540	21	640	570	210	0.462
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	115	20000	430	200	0.000	99	27000	500	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	18000	390	79	0.000	32	17500	400	108	0.000
→INSTI	17	9200	44	0	0.000	16	12600	67	0	0.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2456	200	200	200	0.404	1760	316	400	325	0.411
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	119	3700	200	200	0.000	101	5300	450	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	2900	200	200	0.000	34	5750	200	200	0.001
→投与なし(投与歴あり)	55	1500	2500	2600	0.009	40	1650	3600	3281	0.009
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9255	58	50	40	0.007	5863	200	130	98	0.040
内訳 変更薬剤なし	8669	50	50	25	0.188	5427	140	100	80	0.188
変更薬剤 1 剤	367	200	200	200	0.274	265	200	200	200	0.274
変更薬剤 2 剤以上	219	690	200	200	0.000	171	1400	200	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	88	200	200	200	0.016	58	200	200	200	0.032
→INSTI	125	0	0	0	0.000	70	0	0	0	0.003
→投与なし(投与歴あり)	77	200	7000	3500	0.005	48	795	14500	9000	0.038
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3422	25	25	25	0.000	2208	25	25	25	0.001
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	57	180	160	100	0.129	43	200	300	200	0.041
→INSTI	41	0	0	0	0.478	29	0	0	0	0.508
→投与なし(投与歴あり)	24	25	13100	6500	0.000	20	43	13100	8840	0.000
INSTI										
→INSTI	2390	0	0	0	0.023	1583	0	0	0	0.009

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1611	5700	5900	5700	0.000	1193	2400	2500	2400	0.010
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	8	26300	4600	1050	0.008
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	13200	520	200	0.000	22	18500	415	200	0.010
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	7	14000	200	200	0.016
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	967	9100	10000	8300	0.006	338	2800	3150	2950	0.005
→NRTI 2 剤	14	3100	3550	1025	0.318	17	1200	920	440	0.492
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	31000	1600	200	0.000	39	18000	1800	200	0.002
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	24000	390	79	0.000	5	28000	210	200	0.313
→INSTI	15	16000	44	0	0.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1081	2200	2300	1900	0.156	1466	425	440	400	0.705
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	7000	530	200	0.000	95	5200	420	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	6950	200	200	0.000	29	7300	200	200	0.003
→投与なし(投与歴あり)	35	3000	6900	5700	0.042	37	1700	2700	3162	0.074
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1780	3141	2400	2160	0.000	2967	200	200	200	0.486
内訳 変更薬剤なし	1556	2800	2400	2100	0.009	2722	200	200	200	0.368
変更薬剤 1 剤	109	4800	2630	2400	0.047	155	200	200	200	0.414
変更薬剤 2 剤以上	115	10000	1100	1900	0.000	90	8700	1650	2050	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	10000	200	200	0.020	41	200	200	200	0.395
→INSTI	11	15553	49	50	0.001	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	36	13500	27500	25000	0.345	35	1580	13000	3100	0.435
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	251	1400	960	710	0.000	293	200	200	200	0.975
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	4600	1400	480	0.001	17	3200	1400	1400	0.140
→INSTI	5	3600	79	0	0.188	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	5600	14100	18000	0.250	4	200	1850	2200	0.500
INSTI										
→INSTI	59	4400	60	60	0.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-3(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	722	1950	2050	1800	0.002	580	445	470	465	0.001
→投与なし(投与歴なし)	1	170000	190000	520	1.000	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	9	6600	1900	25	0.004	4	6300	135	10	0.125
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	8	60500	735	47	0.008	7	43400	4500	284	0.938
投与なし(投与歴あり)	582	6950	8300	5750	0.047	378	895	935	715	0.060
→投与なし(投与歴あり)	4	155	68	425	0.375	2	129510	54	13	0.500
→NRTI 2 剤	55	19000	400	83	0.000	21	31000	200	25	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	26	18000	295	25	0.000	4	6013	44710	50	0.375
→NRTI 2 剤+NNRTI	0	—	—	—	—	17	9200	44	0	0.000
→INSTI										
NRTI 2 剤	668	200	132	110	0.890	322	25	25	25	0.064
→NRTI 2 剤	16	2150	535	63	0.003	8	117	23	23	0.063
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	1300	25	25	0.195	1	0	0	0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	14	636	1130	1960	0.129	4	367	198	301	0.625
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2852	25	25	25	0.342	3436	20	20	10	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2651	25	25	25	0.756	3296	20	20	10	0.000
内訳 変更薬剤なし	118	25	25	25	0.521	94	25	25	20	0.556
変更薬剤 1 剤	83	110	25	25	0.024	46	25	25	25	0.873
変更薬剤 2 剤以上	34	200	54	25	0.050	13	25	25	25	0.313
→NRTI 2 剤+NNRTI	0	—	—	—	—	125	0	0	0	0.000
→INSTI	33	75	6300	3500	0.004	9	25	6670	4000	0.148
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2 剤+NNRTI	1343	25	25	25	0.151	1786	0	0	0	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	25	25	25	0.519	11	25	25	25	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	0	—	—	—	—	41	0	0	0	0.478
→INSTI	17	25	20400	13000	0.000	3	25	25	240	0.250
→投与なし(投与歴あり)										
INSTI	0	—	—	—	—	2390	0	0	0	0.023
→INSTI										

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2剤	12	—	91.7	91.7	—	7	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	39	—	84.6	87.2	—	23	—	87.0	91.3	—
→NRTI 2剤+NNRTI	23	—	100.0	82.6	—	20	—	100.0	80.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2剤	29	—	79.3	79.3	—	17	—	88.2	88.2	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	120	—	85.8	83.3	—	92	—	83.7	80.4	—
→NRTI 2剤+NNRTI	38	—	89.5	92.1	—	29	—	86.2	89.7	—
→INSTI	21	—	76.2	85.7	—	16	—	68.8	81.3	—
NRTI 2剤	2876	84.7	84.7	85.1	0.430	1796	84.0	84.0	84.9	0.189
→NRTI 2剤	150	84.0	86.7	85.3	0.703	104	84.6	86.5	83.7	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	34	82.4	97.1	94.1	0.125	29	79.3	96.6	93.1	0.125
→NRTI 2剤+NNRTI	66	65.2	—	—	—	46	67.4	—	—	—
NRTI 2剤+PI 1・2剤	10479	90.2	90.2	89.9	0.205	6047	87.9	88.0	87.7	0.499
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9837	90.8	90.5	90.2	0.023	5620	88.5	88.4	88.0	0.123
内訳 変更薬剤なし	398	85.7	87.2	88.4	0.062	259	84.2	86.5	87.3	0.088
変更薬剤 1剤	244	75.8	80.3	79.9	0.086	168	72.6	78.0	77.4	0.133
変更薬剤 2剤以上	89	82.0	88.8	87.6	0.227	57	75.4	82.5	80.7	0.508
→NRTI 2剤+NNRTI	135	94.1	97.8	97.8	0.125	71	94.4	97.2	98.6	0.250
→INSTI	102	71.6	—	—	—	46	67.4	—	—	—
NRTI 2剤+NNRTI	3866	97.6	97.4	96.9	0.007	2317	97.2	96.9	96.4	0.038
→NRTI 2剤+NNRTI	56	89.3	87.5	91.1	1.000	40	87.5	90.0	95.0	0.375
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	47	93.6	89.4	89.4	0.500	30	90.0	86.7	86.7	1.000
→INSTI	34	79.4	—	—	—	25	76.0	—	—	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	2668	96.3	96.4	96.4	0.908	1696	95.2	95.4	95.3	0.788
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2剤	9	—	100.0	100.0	—	11	—	90.9	90.9	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	31	—	80.6	87.1	—	22	—	77.3	86.4	—
→NRTI 2剤+NNRTI	20	—	100.0	80.0	—	6	—	100.0	83.3	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2剤	12	—	83.3	91.7	—	22	—	77.3	77.3	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	89	—	83.1	79.8	—	38	—	78.9	76.3	—
→NRTI 2剤+NNRTI	28	—	85.7	89.3	—	6	—	83.3	83.3	—
→INSTI	15	—	66.7	80.0	—	0	—	—	—	—
NRTI 2剤	1110	81.8	81.2	81.8	1.000	1621	82.6	82.4	83.2	0.447
→NRTI 2剤	101	83.2	88.1	84.2	1.000	122	82.0	85.2	86.1	0.308
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	27	77.8	96.3	92.6	0.125	23	73.9	95.7	91.3	0.125
→NRTI 2剤+NNRTI	37	62.2	—	—	—	41	61.0	—	—	—
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1786	70.3	71.2	70.7	0.660	3094	86.2	86.3	86.4	0.813
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	1573	70.9	70.8	70.4	0.634	2843	87.2	86.8	86.8	0.525
内訳 変更薬剤なし	106	68.9	76.4	76.4	0.039	157	81.5	86.6	88.5	0.007
変更薬剤 1剤	107	63.6	72.0	69.2	0.228	94	66.0	70.2	69.1	0.544
変更薬剤 2剤以上	21	52.4	61.9	57.1	1.000	41	80.5	87.8	85.4	0.625
→NRTI 2剤+NNRTI	11	63.6	100.0	90.9	0.375	0	—	—	—	—
→INSTI	44	52.3	—	—	—	41	70.7	—	—	—
NRTI 2剤+NNRTI	251	86.9	87.3	85.7	0.559	261	94.3	93.1	92.7	0.454
→NRTI 2剤+NNRTI	19	84.2	78.9	89.5	1.000	14	85.7	78.6	85.7	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	5	80.0	80.0	80.0	1.000	0	—	—	—	—
→INSTI	7	42.9	—	—	—	6	100.0	—	—	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	61	75.4	80.3	83.6	0.180	0	—	—	—	—
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-4(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1	—	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	11	—	90.9	90.9	—	6	—	100.0	83.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	—	100.0	100.0	—	8	—	100.0	62.5	—
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	5	—	80.0	80.0	—	2	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	60	—	91.7	90.0	—	22	—	81.8	77.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	27	—	88.9	92.6	—	5	—	100.0	100.0	—
→INSTI	0	—	—	—	—	21	—	76.2	85.7	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	831	86.6	86.9	87.0	0.709	424	88.9	89.2	88.9	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	18	88.9	88.9	72.2	0.250	10	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	100.0	100.0	100.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	17	64.7	—	—	—	8	87.5	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3171	89.2	88.9	88.4	0.048	4214	93.9	94.0	93.7	0.419
内訳 変更薬剤なし	2951	89.3	88.9	88.4	0.035	4043	94.4	94.4	94.0	0.161
変更薬剤 1 剤	129	92.2	90.7	90.7	0.625	112	83.9	83.9	85.7	0.804
変更薬剤 2 剤以上	91	80.2	86.8	83.5	0.375	59	84.7	86.4	91.5	0.219
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	83.9	90.3	93.5	0.375	17	82.4	88.2	82.4	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	135	94.1	97.8	97.8	0.125
→投与なし(投与歴あり)	46	78.3	—	—	—	15	53.3	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1439	95.7	95.5	95.1	0.220	2166	99.3	99.3	98.7	0.009
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	30	86.7	86.7	90.0	1.000	12	100.0	100.0	100.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	47	93.6	89.4	89.4	0.500
→投与なし(投与歴あり)	23	78.3	—	—	—	5	60.0	—	—	—
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	2668	96.3	96.4	96.4	0.908

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	15	—	20.0	33.3	—	8	—	12.5	37.5	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	41	—	48.8	51.2	—	24	—	50.0	54.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	—	36.0	36.0	—	22	—	40.9	36.4	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	33	—	12.1	18.2	—	20	—	10.0	25.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	126	—	41.3	42.9	—	95	—	44.2	44.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	—	47.5	42.5	—	30	—	53.3	43.3	—
→INSTI	22	—	18.2	13.6	—	17	—	23.5	17.6	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	3148	9.7	9.8	11.9	0.000	1975	9.7	10.5	13.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	169	17.2	45.6	36.1	0.000	118	16.9	45.8	39.8	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	22.5	52.5	50.0	0.007	35	20.0	51.4	48.6	0.013
→投与なし(投与歴あり)	70	12.9	—	—	—	49	16.3	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	11117	34.4	34.1	34.3	0.743	6462	34.8	34.1	34.8	1.000
内訳 変更薬剤なし	10431	33.9	33.5	33.8	0.902	6000	34.1	33.3	34.2	0.850
変更薬剤 1 剤	424	43.2	43.6	42.9	0.924	278	45.7	45.7	45.0	0.818
変更薬剤 2 剤以上	262	42.4	42.7	39.3	0.356	184	40.8	41.8	38.6	0.577
→NRTI 2 剤+NNRTI	104	43.3	46.2	41.3	0.722	66	39.4	47.0	37.9	0.833
→INSTI	137	43.8	38.7	31.4	0.002	73	53.4	46.6	38.4	0.019
→投与なし(投与歴あり)	113	47.8	—	—	—	68	48.5	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	3994	33.2	32.9	33.1	0.859	2398	33.9	33.7	33.9	0.958
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	66	45.5	53.0	54.5	0.263	46	43.5	56.5	60.9	0.077
→INSTI	47	34.0	34.0	25.5	0.219	30	33.3	33.3	26.7	0.625
→投与なし(投与歴あり)	36	52.8	—	—	—	27	48.1	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	2689	25.3	23.9	23.1	0.000	1712	28.2	26.7	25.8	0.000

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	10	—	10.0	30.0	—	14	—	21.4	28.6	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	—	50.0	50.0	—	24	—	33.3	37.5	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	—	40.9	36.4	—	7	—	28.6	28.6	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	14	—	14.3	28.6	—	26	—	15.4	23.1	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	91	—	42.9	41.8	—	43	—	41.9	41.9	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	—	55.2	44.8	—	7	—	28.6	28.6	—
→INSTI	16	—	25.0	18.8	—	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1211	10.5	11.3	15.0	0.000	1836	10.5	10.2	12.3	0.020
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	112	16.1	42.9	37.5	0.000	140	15.7	42.9	33.6	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	25.0	53.1	53.1	0.022	29	27.6	58.6	51.7	0.065
→投与なし(投与歴あり)	39	15.4	—	—	—	45	8.9	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1976	34.7	34.7	35.6	0.328	3515	34.1	33.5	33.7	0.566
内訳 変更薬剤なし	1736	33.5	32.8	34.4	0.850	3232	33.5	32.8	33.1	0.572
変更薬剤 1 剤	118	51.7	54.2	50.8	0.818	176	43.8	46.0	44.9	0.762
変更薬剤 2 剤以上	122	35.2	42.6	37.7	0.577	107	34.6	35.5	31.8	0.574
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	42.9	42.9	39.3	1.000	48	35.4	35.4	31.3	0.804
→INSTI	11	45.5	45.5	36.4	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	50	50.0	—	—	—	49	49.0	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	279	37.3	35.1	34.8	0.341	313	36.7	35.5	36.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	43.5	56.5	65.2	0.180	21	47.6	47.6	57.1	0.688
→INSTI	5	20.0	60.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	7	28.6	—	—	—	7	28.6	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	61	19.7	21.3	16.4	0.727	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-5(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1	—	0.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	11	—	72.7	72.7	—	6	—	66.7	66.7	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	—	60.0	30.0	—	8	—	12.5	50.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	5	—	0.0	0.0	—	2	—	0.0	0.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	60	—	41.7	50.0	—	23	—	39.1	26.1	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	—	50.0	39.3	—	5	—	60.0	80.0	—
→INSTI	0	—	—	—	—	22	—	18.2	13.6	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	878	9.9	10.5	12.9	0.002	434	5.8	6.5	8.3	0.039
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	19	21.1	68.4	57.9	0.016	10	30.0	40.0	30.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	11.1	44.4	55.6	0.125	2	0.0	0.0	0.0	—
→投与なし(投与歴あり)	17	17.6	—	—	—	8	25.0	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3337	38.9	39.1	39.0	0.866	4265	31.2	30.6	31.1	0.901
内訳 変更薬剤なし	3105	37.8	38.1	38.0	0.754	4094	31.1	30.6	31.2	0.931
変更薬剤 1 剤	136	50.7	50.0	51.5	0.869	112	33.0	32.1	29.5	0.488
変更薬剤 2 剤以上	96	57.3	57.3	53.1	0.460	59	32.2	32.2	30.5	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	59.0	61.5	56.4	1.000	17	29.4	41.2	35.3	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	137	43.8	38.7	31.4	0.002
→投与なし(投与歴あり)	49	49.0	—	—	—	15	40.0	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	1496	39.8	39.7	40.0	0.852	2185	28.2	27.9	27.9	0.606
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	33	51.5	60.6	60.6	0.549	12	25.0	41.7	33.3	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	47	34.0	34.0	25.5	0.219
→投与なし(投与歴あり)	24	62.5	—	—	—	5	40.0	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	0	—	—	—	—	2689	25.3	23.9	23.1	0.000

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3463	80.7	80.3	79.6	0.030	1722	77.4	76.5	74.9	0.003
→NRTI 2 剤	12	58.3	58.3	58.3	1.000	6	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	42	73.8	66.7	69.0	0.688	23	69.6	56.5	56.5	0.250
→NRTI 2 剤+NNRTI	21	66.7	61.9	71.4	1.000	18	66.7	66.7	77.8	0.625
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1616	70.1	69.5	68.8	0.169	1128	67.6	67.3	66.3	0.295
→NRTI 2 剤	33	72.7	66.7	69.7	1.000	20	80.0	75.0	75.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	122	54.1	54.1	54.1	1.000	92	54.3	52.2	55.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	55.0	55.0	50.0	0.625	30	63.3	63.3	56.7	0.625
→INSTI	19	78.9	63.2	78.9	1.000	13	69.2	46.2	69.2	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	3062	69.3	68.0	66.5	0.000	1936	69.4	67.8	66.8	0.004
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	165	72.7	67.9	66.7	0.115	118	74.6	71.2	68.6	0.183
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	56.4	56.4	61.5	0.625	33	54.5	54.5	60.6	0.625
→投与なし(投与歴あり)	66	69.7	68.2	65.2	0.549	46	73.9	67.4	65.2	0.344
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10651	64.9	64.7	64.1	0.053	6199	63.8	63.8	63.1	0.177
内訳 変更薬剤なし	10003	64.9	64.7	64.2	0.089	5764	63.7	63.7	63.1	0.286
変更薬剤 1 剤	398	63.8	64.6	63.1	0.820	259	64.1	64.9	63.3	0.772
変更薬剤 2 剤以上	250	66.0	64.8	62.8	0.302	176	67.6	65.3	63.1	0.161
→NRTI 2 剤+NNRTI	93	69.9	74.2	76.3	0.180	58	74.1	82.8	77.6	0.688
→INSTI	130	64.6	65.4	65.4	1.000	69	60.9	63.8	60.9	1.000
→投与なし(投与歴あり)	102	50.0	49.0	52.0	0.804	64	51.6	46.9	48.4	0.727
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3829	67.4	67.4	67.3	0.928	2297	68.1	68.4	67.7	0.545
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	62	64.5	67.7	69.4	0.508	45	60.0	62.2	62.2	1.000
→INSTI	44	70.5	63.6	68.2	1.000	27	59.3	55.6	63.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	31	58.1	38.7	51.6	0.688	24	66.7	41.7	58.3	0.688
INSTI										
→INSTI	2563	66.5	66.4	66.0	0.480	1632	62.7	62.9	62.4	0.746

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1845	76.7	76.9	75.3	0.066	1502	81.8	81.3	80.5	0.103
→NRTI 2 剤	8	62.5	62.5	62.5	1.000	11	54.5	54.5	54.5	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	78.1	65.6	65.6	0.125	27	70.4	70.4	70.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	18	66.7	66.7	77.8	0.625	6	50.0	16.7	66.7	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1052	67.3	66.6	65.5	0.140	379	66.8	65.4	64.4	0.211
→NRTI 2 剤	14	78.6	78.6	71.4	1.000	26	73.1	65.4	69.2	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	88	54.5	53.4	55.7	1.000	42	50.0	47.6	50.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	58.6	58.6	51.7	0.625	7	57.1	42.9	42.9	1.000
→INSTI	12	66.7	41.7	66.7	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1214	72.2	69.9	68.2	0.001	1811	77.9	76.0	74.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	111	75.7	72.1	70.3	0.247	138	73.2	67.4	68.1	0.214
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	58.1	61.3	61.3	1.000	27	59.3	59.3	63.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	36	58.3	55.6	52.8	0.688	42	69.0	71.4	69.0	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1932	70.7	70.7	69.2	0.090	3427	70.6	70.3	69.8	0.242
内訳 変更薬剤なし	1704	71.4	71.4	69.8	0.077	3160	70.8	70.4	70.1	0.322
変更薬剤 1 剤	107	60.7	61.7	60.7	1.000	163	64.4	67.5	64.4	1.000
変更薬剤 2 剤以上	121	68.6	68.6	67.8	0.840	104	73.1	73.1	69.2	0.424
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	76.0	84.0	88.0	0.250	47	72.3	72.3	70.2	1.000
→INSTI	11	63.6	63.6	63.6	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	45	44.4	48.9	46.7	1.000	46	43.5	47.8	47.8	0.688
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	281	61.9	63.0	62.6	0.756	311	65.0	65.6	65.9	0.690
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	69.6	69.6	73.9	1.000	21	71.4	81.0	81.0	0.500
→INSTI	5	80.0	80.0	80.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	6	66.7	50.0	50.0	1.000	6	50.0	16.7	66.7	1.000
INSTI										
→INSTI	55	65.5	70.9	69.1	0.688	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-6(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1105	78.6	78.1	77.4	0.219	856	81.7	81.5	80.8	0.434
→NRTI 2 剤	1	100.0	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	11	81.8	63.6	63.6	0.500	4	75.0	50.0	75.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	60.0	80.0	80.0	0.500	5	100.0	80.0	60.0	0.500
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	746	67.6	66.6	66.4	0.408	491	76.6	77.0	76.0	0.713
→NRTI 2 剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	1	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	55	56.4	56.4	60.0	0.774	25	56.0	60.0	48.0	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	64.3	67.9	60.7	1.000	5	0.0	0.0	0.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	19	78.9	63.2	78.9	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	851	62.9	62.2	61.1	0.244	400	44.3	44.0	43.0	0.572
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	18	72.2	66.7	61.1	0.688	9	66.7	77.8	55.6	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	40.0	40.0	50.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	68.8	62.5	56.3	0.500	8	75.0	62.5	62.5	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3190	64.3	64.4	63.8	0.461	4034	60.4	60.1	59.5	0.160
内訳 変更薬剤なし	2973	64.7	64.8	64.1	0.464	3870	60.2	59.9	59.4	0.267
変更薬剤 1 剤	128	60.2	61.7	60.2	1.000	107	67.3	63.6	64.5	0.664
変更薬剤 2 剤以上	89	58.4	53.9	58.4	1.000	57	64.9	66.7	57.9	0.289
→NRTI 2 剤+NNRTI	33	63.6	75.8	81.8	0.070	13	76.9	76.9	84.6	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	130	64.6	65.4	65.4	1.000
→投与なし(投与歴あり)	42	54.8	52.4	57.1	1.000	14	57.1	42.9	50.0	1.000
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1431	66.7	66.6	66.6	0.941	2087	68.2	68.2	68.0	0.800
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	31	61.3	64.5	61.3	1.000	10	60.0	50.0	70.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	44	70.5	63.6	68.2	1.000
→投与なし(投与歴あり)	20	65.0	45.0	50.0	0.375	5	40.0	40.0	40.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	2563	66.5	66.4	66.0	0.480

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3354	74.8	74.0	73.1	0.000	1678	71.9	70.7	69.2	0.000
→NRTI 2剤	13	53.8	53.8	46.2	1.000	7	71.4	71.4	71.4	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	35	71.4	62.9	65.7	0.625	24	62.5	54.2	54.2	0.625
→NRTI 2剤+NNRTI	25	68.0	60.0	56.0	0.375	22	68.2	59.1	54.5	0.375
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1576	58.8	58.1	57.1	0.031	1103	54.9	54.7	52.9	0.060
→NRTI 2剤	29	65.5	65.5	65.5	1.000	20	70.0	70.0	65.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	119	46.2	43.7	44.5	0.824	91	44.0	40.7	41.8	0.791
→NRTI 2剤+NNRTI	35	54.3	57.1	42.9	0.289	27	44.4	51.9	40.7	1.000
→INSTI	21	47.6	52.4	52.4	1.000	16	37.5	43.8	43.8	1.000
NRTI 2剤										
→NRTI 2剤	2839	67.9	67.3	66.5	0.008	1790	68.6	68.2	67.7	0.153
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	147	68.0	64.6	66.0	0.607	104	72.1	69.2	71.2	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	37	56.8	54.1	51.4	0.625	33	57.6	54.5	51.5	0.625
→投与なし(投与歴あり)	60	65.0	63.3	56.7	0.063	43	62.8	60.5	53.5	0.125
NRTI 2剤+PI 1・2剤										
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	10295	59.5	58.9	58.2	0.000	5962	58.4	57.7	56.9	0.000
内訳 変更薬剤なし	9674	59.5	59.0	58.2	0.000	5540	58.2	57.7	56.9	0.001
変更薬剤 1剤	385	57.1	58.4	55.1	0.232	255	57.3	56.9	53.7	0.107
変更薬剤 2剤以上	236	64.0	59.3	59.7	0.048	167	65.3	59.3	60.5	0.115
→NRTI 2剤+NNRTI	92	57.6	53.3	57.6	1.000	59	57.6	55.9	59.3	1.000
→INSTI	131	49.6	48.1	49.6	1.000	69	46.4	46.4	47.8	1.000
→投与なし(投与歴あり)	95	44.2	43.2	45.3	1.000	58	43.1	41.4	43.1	1.000
NRTI 2剤+NNRTI										
→NRTI 2剤+NNRTI	3750	56.2	55.9	55.7	0.294	2262	58.2	58.1	58.1	0.803
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	59	66.1	66.1	59.3	0.289	43	62.8	67.4	65.1	1.000
→INSTI	46	52.2	47.8	47.8	0.688	29	51.7	48.3	41.4	0.250
→投与なし(投与歴あり)	32	34.4	31.3	31.3	1.000	25	36.0	32.0	36.0	1.000
INSTI										
→INSTI	2596	50.0	49.9	49.7	0.518	1656	45.5	45.2	44.8	0.311

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
前の時点 →その時点										
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1816	72.9	72.0	70.8	0.002	1417	78.1	77.3	76.4	0.011
→NRTI 2剤	9	66.7	66.7	55.6	1.000	12	58.3	58.3	50.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	29	69.0	62.1	62.1	0.625	20	75.0	65.0	70.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	22	68.2	59.1	54.5	0.375	7	57.1	57.1	57.1	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1029	55.4	54.9	53.4	0.052	332	63.6	63.0	62.3	0.513
→NRTI 2剤	12	58.3	58.3	50.0	1.000	21	61.9	61.9	61.9	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	88	44.3	39.8	40.9	0.581	38	57.9	55.3	52.6	0.727
→NRTI 2剤+NNRTI	26	53.8	53.8	38.5	0.219	6	83.3	83.3	50.0	0.500
→INSTI	15	33.3	40.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2剤										
→NRTI 2剤	1109	69.1	68.1	67.4	0.060	1666	72.3	71.4	70.5	0.005
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	101	70.3	68.3	70.3	1.000	120	69.2	65.8	68.3	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	30	63.3	60.0	53.3	0.250	26	61.5	57.7	50.0	0.250
→投与なし(投与歴あり)	33	54.5	51.5	45.5	0.250	36	66.7	66.7	63.9	1.000
NRTI 2剤+PI 1・2剤										
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	1772	65.2	63.9	63.1	0.004	3087	67.8	67.4	66.5	0.039
内訳 変更薬剤なし	1549	65.8	64.6	63.6	0.009	2835	68.0	67.7	66.8	0.071
変更薬剤 1剤	109	53.2	53.2	51.4	1.000	157	62.4	64.3	59.9	0.481
変更薬剤 2剤以上	114	68.4	65.8	67.5	0.219	95	70.5	63.2	68.4	0.727
→NRTI 2剤+NNRTI	24	66.7	62.5	62.5	1.000	42	61.9	54.8	61.9	1.000
→INSTI	10	40.0	40.0	40.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	39	38.5	41.0	38.5	1.000	38	44.7	44.7	52.6	0.453
NRTI 2剤+NNRTI										
→NRTI 2剤+NNRTI	258	61.6	61.2	61.6	1.000	276	55.8	56.5	57.6	0.327
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	21	61.9	66.7	66.7	1.000	18	66.7	77.8	72.2	1.000
→INSTI	5	100.0	80.0	40.0	0.250	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	20.0	20.0	20.0	1.000	6	50.0	33.3	33.3	1.000
INSTI										
→INSTI	56	48.2	48.2	48.2	1.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

表4-7-7(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成26年度				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1085	73.3	72.4	72.1	0.134	852	71.2	70.3	68.9	0.019
→NRTI 2 剤	1	0.0	0.0	0.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10	60.0	50.0	50.0	1.000	5	80.0	80.0	80.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	70.0	70.0	70.0	1.000	8	75.0	50.0	37.5	0.250
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	736	55.7	54.5	53.0	0.034	508	60.2	60.2	59.6	0.598
→NRTI 2 剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	56	42.9	41.1	46.4	0.727	25	36.0	32.0	28.0	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	24	50.0	54.2	45.8	1.000	5	40.0	40.0	20.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	21	47.6	52.4	52.4	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	777	65.0	65.0	64.5	0.641	396	55.1	54.3	53.8	0.378
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	18	61.1	55.6	50.0	0.625	9	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	44.4	44.4	55.6	1.000	2	50.0	50.0	50.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	56.3	56.3	43.8	0.500	8	75.0	62.5	50.0	0.500
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3140	59.7	58.9	57.9	0.001	4068	53.2	52.6	52.0	0.006
内訳 変更薬剤なし	2924	60.1	59.3	58.5	0.003	3915	53.0	52.4	51.9	0.009
変更薬剤 1 剤	127	52.0	51.2	48.0	0.302	101	55.4	58.4	56.4	1.000
変更薬剤 2 剤以上	89	58.4	55.1	53.9	0.388	52	61.5	59.6	53.8	0.219
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	54.3	54.3	57.1	1.000	15	53.3	46.7	46.7	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	131	49.6	48.1	49.6	1.000
→投与なし(投与歴あり)	45	46.7	44.4	42.2	0.688	12	33.3	33.3	33.3	1.000
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1397	57.1	57.1	56.8	0.707	2077	55.6	55.0	54.7	0.106
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	75.9	69.0	58.6	0.063	12	41.7	41.7	41.7	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	46	52.2	47.8	47.8	0.688
→投与なし(投与歴あり)	21	28.6	28.6	28.6	1.000	5	40.0	40.0	40.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	2596	50.0	49.9	49.7	0.518

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

第Ⅲ部 資料

1. 対象者用健康状態報告書
2. 日常報告書

様式2-2

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が担当医師に当該年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の報告書（様式3）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願い致します。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分（Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月）、Ⅲ期（10～12月）、Ⅳ期（1～3月））記入して下さい。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック（✓）を入れ、（ ）には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載して下さい。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称 住 所（〒 — ） 電話番号 （ — — ） 医師氏名 （診療科名 印 ）						
備 考						

{ 1/4 }

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・A F P値・クレアチニン値については、[単位にご注意のうえ](#)（ ）に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	I 期 (4~6月)	II 期 (7~9月)	III 期 (10~12月)	IV 期 (1~3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. ジドブジン・ラミブジン[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. テノホビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. アバカビル・ラミブジン[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. テノフォビル・エムトリシタビン[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. デラビルジン [DLV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. リルピビルン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. インジナビル [IDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. ロピナビル・リトナビル[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. エルビテグラビル・コピシスタット・エムトリシタビン・ テノホビル [EVG・COBI・FTC・TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
27. ドルテグラビル [DTG]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（✓）をし、記入例のように服薬状況を **5段階** から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、1~26以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の（ ）に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	✓	(1 . ② . 3 . 4 . 5)		

D. インターフェロン製剤等の投与状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
2. リバビリン	☐	☐	☐	☐
3. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
4. シメプレビル	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（√）をし、インターフェロン製剤等の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（√）をして下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

E. 副作用の発現状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐
その他3 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（√）して下さい。副作用の無かった場合は、「0.なし」にチェック（√）して下さい。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入下さい。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. アトパコン	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（√）して下さい。投与が無かった場合は、「0.実施していない」をチェック（√）して下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

G. 眼底検査実施の有無	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（√）して下さい。

様式3

日常報告書

(本人記入用)

					個人番号	-0
氏名		男・女	身長	cm	生年月日	年 月 日
I 期	4月～6月分	平成 26 年 6 月 末日現在			体 重	kg

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	全くない
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とても乾きやすい
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とても減りやすい
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とても息切れしやすい
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とても疲れやすい
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	とてもある
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1 2 3 4 5 どちらとも言えない	全く眠れない

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

{1/4}

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ○で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅱ期	7月～9月分	平成 26 年 9 月 末日現在	体 重	kg
----	--------	------------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1	どちらとも言えない 2	全くない 3	4	5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
3) □が乾きやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても乾きやすい 3	4	5
4) □内炎ができたり、□の中が痛いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1	どちらとも言えない 2	とても減りやすい 3	4	5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても息切れしやすい 3	4	5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても疲れやすい 3	4	5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものがでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1	どちらとも言えない 2	全く眠れない 3	4	5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

記入要領

- この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
- 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
- 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ〇で囲んで下さい。
- I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅲ期	10月～12月分	平成 26 年 12月 末日現在	体 重	kg
----	----------	------------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ〇で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても乾きやすい 1 2 3 4 5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない どちらとも言えない とても減りやすい 1 2 3 4 5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても息切れしやすい 1 2 3 4 5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても疲れやすい 1 2 3 4 5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる どちらとも言えない 全く眠れない 1 2 3 4 5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ〇で囲んで下さい。

- 全く健康。
- 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
- 努力して通常の生活を維持している。
- 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
- 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
- 介助が必要であり、医療も必要である。
- 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
- 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

[3/4]

Ⅳ期	1月～3月分	平成 27 年 月 日現在	体 重	kg
----	--------	---------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全くない
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても乾きやすい
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても減りやすい
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても息切れしやすい
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても疲れやすい
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全く眠れない

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。 2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。 3. 努力して通常の生活を維持している。 4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。 5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。 6. 介助が必要であり、医療も必要である。 7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。 8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。
--

備 考（日常生活で特に不自由な点、健康上留意しておられることなど有りましたらご記入下さい。）

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）：TEL — —

※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式5）を速やかに提出して下さいようお願い致します。

[4/4]

参考資料 エイズ発症者の調査の概要

第1章 調査の目的と方法、結果の概要

第2章 集計方法

第3章 結果表

1. 臨床・治療状況
2. 生活状況

第4章 資料

1. 健康状態報告書
2. 生活状況報告書

第1章 調査の目的と方法、結果の概要

HIV感染者における治療の長期化に伴う生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために、「エイズ発症者の調査」が実施された。平成27年度に発症者健康管理手当を受給されたエイズ発症者109人に対して、同年7月に調査への協力が依頼され、調査票が83人から回収された（回収率76%）。回収者は男性が76人と女性が7人で、30～39歳が19人、40～49歳が29人、50～59歳が25人、60歳以上が10人であった。調査票の主な内容は臨床・治療状況と生活状況であった。

臨床・治療状況の結果をみると、CD4値は500/μl以上が39%、350～500未満が28%、200～350未満が24%、200未満が9%であった。HIV-RNA量は50未満（検出限界50以下）が96%であり、一方、10,000以上が2.5%であった。抗HIV薬の併用区分は「INSTI」（インテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせ）が78%と多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が10%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が9%、それ以外の投与状況が4%であった。

生活状況の結果をみると、日常生活への影響ありが75%、こころの状態に重い問題の可能性ありが16%であった。就業状況は仕事ありが48%、失業・求職中が25%であった。所得金額は400万円以上が20%、生活意識は苦しいが62%であった。障害者手帳は取得ありが89%、障害福祉サービスは利用ありが15%であった。現在の困り事・将来の不安・支援の希望等の自由回答において、健康・医療・福祉に関する記載ありが64%、日常生活・仕事・収入に関する記載ありが61%、その他の記載ありが31%であった。参考として、「平成25年国民生活基礎調査」による一般集団（30～69歳の男性）と比べると、本調査結果では日常生活への影響ありとこころの状態に重い問題の可能性ありが著しく多く、一方、仕事ありと所得金額400万円以上が著しく少なかった。

上記の結果からみると、エイズ発症者では、適切な抗HIV治療を受け、CD4値とHIV-RNA量が良好に管理されている者が比較的多い傾向であった。一方、健康・医療・福祉、日常生活・仕事・収入などの多くの面で、問題を有する者が少なくない傾向であった。今後、本調査結果の詳細な分析を行うとともに、エイズ発症者の臨床・治療と生活の状況を継続的に把握することが重要と考えられる。

第2章 集計方法

集計の対象者としては、調査票の回収者全員とした。男性が76人と女性が7人で、29歳以下がなく、30～39歳が19人、40～49歳が29人、50～59歳が25人、60歳以上が10人であった。

集計の基礎資料としては、回収された調査票を用いた。調査票には「健康状態報告書」と「生活状況報告書」がある。健康状態報告書は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究 健康状態報告書」と同一の内容であり、四半期ごとの臨床・治療状況を医師が記載する。四半期としては、調査時期の関係から、2015年度のⅠ期（4～6月）とⅡ期（7～9月）を可能な範囲の記載が求められた。生活状況報告書は生活状況を調査対象者本人が記載する。両調査票を「第4章 資料」に添付した。

集計方法としては、各調査項目の回答状況を記述するため、単純集計を基本とした。健康状態報告書では、より新しい時期（第Ⅱ期、未記載の場合は第Ⅰ期）の記載内容を用いた。集計項目としては、臨床・治療状況ではCD4値、HIV-RNA、抗HIV治療などを、生活状況では日常生活への影響、こころの状態、就業状況、所得金額、生活意識、障害者手帳の取得、障害福祉サービスの利用などの全調査項目を用いた。集計表の形式としては、臨床・治療状況では「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究 平成26年度報告書」に準じたものとし、生活状況では年齢階級別の各集計項目の回答分布とした。年齢階級は30～39歳、40～49歳、50～59歳、60歳以上とした。こころの状態はうつ病・不安障害等のスクリーニング尺度のK 6 の得点により0～4点、5～9点、10～14点、15点以上（重い問題の可能性あり）に区分した。各集計表の割合（％）では、分母として未回答を除く回答者数を用いた。参考のため、日常生活への影響、こころの状態、就業状況、所得金額、生活意識などの集計項目では、「平成25年国民生活基礎調査」による一般集団（30～69歳の男性）の集計結果を掲載した。

第3章 結果表

1. 臨床・治療状況

本節では、以下の表を示した。

表1-1. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布	(エイズ発症者)
表1-2. CD4値別、HIV-RNA量	(エイズ発症者)
表1-3. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分	(エイズ発症者)
表1-4. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況	(エイズ発症者)
表1-5. 抗HIV薬の併用区分別、副作用	(エイズ発症者)
表1-6. 抗HIV薬の併用薬剤	(エイズ発症者)
表1-7. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬	(エイズ発症者)
表1-8. CD4値別、眼底検査	(エイズ発症者)
表1-9. 疾患の有無	(エイズ発症者)

表1-1. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（エイズ発症者）

		人数	(%)			人数	(%)
性別	男	76	(91.6)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	1	(1.3)
	女	7	(8.4)		0.10～0.50 未満	21	(27.3)
	計	83			0.50～1.00 未満	37	(48.1)
年齢	0～10 歳未満	0	(0.0)		1.00～1.50 未満	14	(18.2)
	10～20 歳未満	0	(0.0)	1.50 以上	4	(5.2)	
	20～30 歳未満	0	(0.0)	不明	6	—	
	30～40 歳未満	19	(22.9)	計	83		
	40～50 歳未満	29	(34.9)	平均値 1.119 (標準偏差 3.263)			
	50～60 歳未満	25	(30.1)	中央値 0.700			
	60 歳以上	10	(12.0)	HIV-RNA 量	検出せず	43	(53.8)
	計	83			50 未満*	34	(42.5)
	平均値 48.6 歳 (標準偏差 10.3 歳)				50～400 未満	23	(4.4)
中央値 49.0 歳			400～1000 未満		7	(1.3)	
CD4 値	～200 未満	7	(8.9)		1000～5000 未満	0	(0.0)
	200～350 未満	19	(24.1)		5000～10000 未満	0	(0.0)
	350～500 未満	22	(27.8)		10000～50000 未満	2	(2.5)
	500 以上	31	(39.2)		50000 以上	0	(0.0)
	不明	4	—		不明	3	—
	計	83			計	83	
	平均値 474.4 (標準偏差 242.6)			中央値 検出せず			
中央値 449.0							

() : 計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表1-2. CD4値別、HIV-RNA量（エイズ発症者）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満†	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	6 (85.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0	7
200～350未満	18 (94.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0	19
350～500未満	22 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	22
500以上	31 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	31
不明	1 —	0 —	0 —	0 —	0 —	3	4
計	78 (97.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.5)	3	83

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表1-3. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（エイズ発症者）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	4 (66.7)	0 (0.0)	0	6
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	5 (71.4)	0 (0.0)	0	7
200 ～350未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (22.2)	0 (0.0)	14 (77.8)	0 (0.0)	0	18
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (21.1)	0 (0.0)	14 (73.7)	1 (5.3)	0	19
350 ～500未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)	18 (81.8)	2 (9.1)	0	22
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)	18 (81.8)	2 (9.1)	0	22
500以上	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.9)	3 (9.7)	24 (77.4)	0 (0.0)	0	31
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.9)	3 (9.7)	24 (77.4)	0 (0.0)	0	31
不明	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	1	0	2	3
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	2	4
計	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (10.3)	7 (9.0)	61 (78.2)	2 (2.6)	0	78
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	2	3
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (9.9)	7 (8.6)	63 (77.8)	3 (3.7)	2	83

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（エイズ発症者）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
NRTI 2剤+NNRTI	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
INSTI	59 (93.7)	3 (4.8)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	63
その他	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
計	77 (95.1)	3 (3.7)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	81

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（エイズ発症者）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	3 (42.9)	4 (57.1)	1	8
NRTI 2剤+NNRTI	1 (20.0)	4 (80.0)	2	7
INSTI	12 (20.0)	48 (80.0)	3	63
その他	0 (0.0)	1 (100.0)	2	3
計	16 (21.9)	57 (78.1)	8	81

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	1 (1.7)	1 (1.7)	1 (1.7)	1 (1.7)	1 (1.7)	2 (3.3)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	2 (2.7)	3 (4.1)	2 (2.7)	1 (1.4)	1 (1.4)	2 (2.7)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)
NRTI 2剤+NNRTI	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	2 (3.3)	2 (3.3)	4 (6.7)	7 (11.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	3 (4.1)	3 (4.1)	5 (6.8)	9 (12.3)	0 (0.0)	1 (1.4)

(): 投与者数より不明を除いた数にしめる%

表1-6. 抗HIV薬の併用薬剤（エイズ発症者）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	INSTI（続き）	件数
3TC+ABC +RTV+LPV	2 (25.0)	3TC+ABC +ETR +RAL (エブジコム服用 2 例)	2 (3.8)
TDF+FTC +RTV+ATV (ツルバダ服用 2 例)	2 (25.0)	ABC +EFV +RAL	2 (3.8)
3TC+ABC +ATV	1 (12.5)	TDF+FTC +EVG+COBI	2 (3.8)
3TC+ABC +RTV+ATV (エブジコム服用 1 例)	1 (12.5)	TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	2 (3.8)
3TC+ABC +RTV+DRV (エブジコム服用 1 例)	1 (12.5)	3TC +RPV +DTG	1 (1.9)
TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 1 例)	1 (12.5)	3TC+ABC +DTC +MVC (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
計 (6 通り)	8 (100.0)	3TC+ABC +RPV +RAL (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
NRTI 2 剤+NNRTI	件数	3TC+ABC +RTV+DRV +DTG (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
3TC+ABC +EFV (エブジコム服用 1 例)	2 (28.6)	ABC +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +NVP	1 (14.3)	ABC +RTV+FPV +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +RPV (エブジコム服用 1 例)	1 (14.3)	ABC+TDF +DTG	1 (1.9)
AZT+3TC +EFV (コンビビル服用 1 例)	1 (14.3)	DRV +DTC	1 (1.9)
TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 1 例)	1 (14.3)	ETR +RAL	1 (1.9)
TDF+FTC +ETR (ツルバダ服用 1 例)	1 (14.3)	RTV+DRV +ETR +DTG	1 (1.9)
計 (6 通り)	7 (100.0)	RTV+DRV +ETR +RAL	1 (1.9)
INSTI	件数	RTV+DRV +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +DTG (エブジコム服用 10 例)	10 (18.9)	RTV+DRV +RAL +MVC	1 (1.9)
3TC+ABC +RAL (エブジコム服用 7 例)	10 (18.9)	RTV+DRV +RPV +RAL	1 (1.9)
TDF+FTC +RAL (ツルバダ服用 7 例)	8 (15.1)	RTV+LPV +RAL	1 (1.9)
TDF+FTC +DTG (ツルバダ服用 4 例)	4 (7.5)	TDF+FTC +ETR +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.9)
RPV +DTG	3 (5.7)	TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.9)
TDF+FTC +RTV+DRV +DTG (ツルバダ服用 3 例)	3 (5.7)	計 (27 通り)	53 (100.0)
		その他	件数
		RTV+DRV +MVC	1 (33.3)
		AZT+3TC+ABC +EFV (エブジコム服用 1 例)	1 (33.3)
		AZT+TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 1 例)	1 (33.3)
		計 (3 通り)	3 (100.0)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表1-7. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬（エイズ発症者）

CD4 値	ニューモシスチス肺炎予防薬						計
	あり	ニューモシスチス肺炎予防薬の種類			なし	不明	
		ST 合剤	ペンタミジン吸入	ペンタミジン点滴			
～200未満	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	1 (14.3)	4 (57.1)	0	7
200～350未満	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (94.4)	1	19
350～500未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (100.0)	0	22
500以上	1 (3.2)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (96.8)	0	31
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	2	4
計	5 (6.3)	4 (5.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	75 (93.8)	3	83

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表1-8. CD4値別、眼底検査（エイズ発症者）

CD4 値	眼底検査			計
	あり	なし	不明	
～200未満	2 (28.6)	5 (71.4)	0	7
200～350未満	0 (0.0)	18 (100.0)	1	19
350～500未満	0 (0.0)	22 (100.0)	0	22
500以上	1 (3.2)	30 (96.8)	0	31
不明	0 (0.0)	2 (100.0)	2	4
計	3 (3.8)	77 (96.3)	3	83

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表1-9. 疾患の有無（エイズ発症者）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	7 (8.6)	74 (91.4)	2	83
(内訳) 脳出血	6 (7.4)			
脳梗塞	0 (0.0)			
その他の脳血管疾患	1 (1.2)			
虚血性心疾患	1 (1.2)	80 (98.8)	2	83
(内訳) 心筋梗塞	0 (0.0)			
その他の虚血性心疾患	1 (1.2)			
肝以外の悪性新生物	7 (1.4)	505 (98.6)	6	518
高血圧・糖尿病	29 (35.8)	52 (64.2)	2	83
(内訳) 高血圧	25 (30.9)			
糖尿病	8 (9.9)			

2. 生活状況

本節では、以下の表を示した。

表2-1. 住居の種類	(エイズ発症者)
表2-2. 世帯人員数	(エイズ発症者)
表2-3. 就業状況	(エイズ発症者)
(参考). 就業状況	(平成25年国民生活基礎調査：男)
表2-4. 日常生活への影響	(エイズ発症者)
(参考). 日常生活への影響	(平成25年国民生活基礎調査：男)
表2-5. 健康意識	(エイズ発症者)
(参考). 健康意識	(平成25年国民生活基礎調査：男)
表2-6. こころの状態	(エイズ発症者)
(参考). こころの状態	(平成25年国民生活基礎調査：男)
表2-7-1. 通院頻度	(エイズ発症者)
表2-7-2. 通院に掛かる時間	(エイズ発症者)
表2-8-1. 障害者手帳の取得状況	(エイズ発症者)
表2-8-2. 障害者手帳を取得していない理由	(エイズ発症者)
表2-9. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況	(エイズ発症者)
表2-10. 障害福祉サービスの利用状況	(エイズ発症者)
表2-11. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況	(エイズ発症者)
表2-12. 生活意識	(エイズ発症者)
(参考). 生活意識	(平成25年国民生活基礎調査)
表2-13. 所得金額	(エイズ発症者)
(参考). 所得金額	(平成25年国民生活基礎調査)
表2-14. 自由記載欄の記入の有無	(エイズ発症者)

表2-1. 住居の種類（エイズ発症者）

現在の住まい (問1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等）	19 (100.0)	27 (93.1)	25 (100.0)	9 (90.0)	80 (96.4)
病院・診療所に入院中	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
社会福祉施設等に入所中	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (1.2)
その他	0 (0.0)	2 (6.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
計	19	29	25	10	83

表2-2. 世帯人員数（エイズ発症者）

世帯人員数 (問2)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 人	5 (26.3)	5 (17.2)	8 (32.0)	6 (60.0)	24 (28.9)
2 人	4 (21.1)	10 (34.5)	10 (40.0)	4 (40.0)	28 (33.7)
3 人	5 (26.3)	6 (20.7)	4 (16.0)	0 (0.0)	15 (18.1)
4 人	3 (15.8)	7 (24.1)	3 (12.0)	0 (0.0)	13 (15.7)
5 人	2 (10.5)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.6)
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
計	19	29	25	10	83

表2-3. 就業状況（エイズ発症者）

過去 1 か月間の仕事の状況 (問3)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
仕事あり	12 (63.2)	14 (48.3)	12 (48.0)	2 (20.0)	40 (48.2)
主に仕事をしている	10 (52.6)	11 (37.9)	9 (36.0)	1 (10.0)	31 (37.3)
主に家事で仕事あり	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)
主に通学で仕事あり	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)
仕事あり（上記以外）	1 (5.3)	2 (6.9)	3 (12.0)	1 (10.0)	7 (8.4)
仕事なし	7 (36.8)	15 (51.7)	13 (52.0)	8 (80.0)	43 (51.8)
失業・求職中	5 (26.3)	7 (24.1)	7 (28.0)	2 (20.0)	21 (25.3)
家事（専業）	1 (5.3)	2 (6.9)	3 (12.0)	4 (40.0)	10 (12.0)
その他	1 (5.3)	6 (20.7)	3 (12.0)	2 (20.0)	12 (14.5)
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
計	19	29	25	10	83

表2-3 (参考). 就業状況 (平成25年国民生活基礎調査：男)

5 月中の仕事の状況 (世帯票-質問 1 3)	年齢				合計 (30～69 歳)
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	
仕事あり	(93.3)	(93.7)	(91.7)	(64.3)	(84.9)
主に仕事をしている	(92.2)	(92.6)	(90.5)	(59.5)	(82.8)
主に家事で仕事あり	(0.2)	(0.4)	(0.4)	(1.5)	(0.7)
主に通学で仕事あり	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.1)
その他	(0.8)	(0.6)	(0.7)	(3.3)	(1.4)
仕事なし	(6.7)	(6.3)	(8.3)	(35.7)	(15.1)
通学	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.2)
家事	(0.5)	(0.6)	(0.9)	(3.3)	(1.4)
その他	(5.9)	(5.5)	(7.3)	(32.3)	(13.5)

表2-4. 日常生活への影響 (エイズ発症者)

日常生活への影響 (問 4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
ある	16 (88.9)	22 (75.9)	17 (68.0)	6 (66.7)	61 (75.3)
通常時に影響がある	8 (44.4)	15 [68.2]	10 (40.0)	6 (66.7)	39 (48.1)
血友病による出血時に影響がある	14 (77.8)	18 [81.8]	13 (52.0)	5 (55.6)	50 (61.7)
それ以外の時に影響がある	3 (16.7)	6 [27.3]	4 (16.0)	1 (11.1)	14 (17.3)
ない	2 (11.1)	7 (24.1)	8 (32.0)	3 (33.3)	20 (24.7)
不明	1 —	0 —	0 —	1 —	2 —
計	19	29	25	10	83

表2-4 (参考). 日常生活への影響 (平成25年国民生活基礎調査：男)

日常生活への影響 (問 4)	年齢				合計 (30～69 歳)
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	
ある	(6.0)	(7.4)	(10.8)	(15.2)	(10.1)
ない	(94.0)	(92.6)	(89.2)	(84.8)	(89.9)

表2-5. 健康意識 (エイズ発症者)

現在の健康状態 (問 5)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
よい	1 (5.6)	1 (3.4)	1 (4.3)	0 (0.0)	3 (3.8)
まあよい	3 (16.7)	3 (10.3)	4 (17.4)	1 (10.0)	11 (13.8)
ふつう	6 (33.3)	10 (34.5)	7 (30.4)	3 (30.0)	26 (32.5)
あまりよくない	8 (44.4)	10 (34.5)	11 (47.8)	3 (30.0)	32 (40.0)
よくない	0 (0.0)	5 (17.2)	0 (0.0)	3 (30.0)	8 (10.0)
不明	1 —	0 —	2 —	0 —	3 —
計	19	29	25	10	83

表2-5 (参考). 健康意識 (平成25年国民生活基礎調査：男)

現在の健康状態 (健康票-質問7)	年齢				合計 (30～69 歳)
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	
よい	(23.9)	(21.8)	(16.4)	(14.4)	(18.9)
まあよい	(19.8)	(18.6)	(16.8)	(16.3)	(17.8)
ふつう	(47.8)	(49.4)	(54.1)	(54.3)	(51.5)
あまりよくない	(7.3)	(8.9)	(11.1)	(12.7)	(10.1)
よくない	(1.1)	(1.3)	(1.6)	(2.3)	(1.6)

表2-6. こころの状態 (エイズ発症者)

こころの状態 (K6 の合計点数) (問6)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
0～4 点	7 (38.9)	11 (39.3)	5 (20.8)	3 (30.0)	26 (32.5)
5～9 点	6 (33.3)	8 (28.6)	8 (33.3)	2 (20.0)	24 (30.0)
10～14 点	5 (27.8)	3 (10.7)	8 (33.3)	1 (10.0)	17 (21.3)
15 点～	0 (0.0)	6 (21.4)	3 (12.5)	4 (40.0)	13 (16.3)
不明	1 —	1 —	1 —	0 —	3 —
計	19	29	25	10	83

表2-6 (参考). こころの状態 (平成25年国民生活基礎調査：男)

こころの状態 (K6 の合計点数) (健康票-質問11)	年齢				合計 (30～69 歳)
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	
0～4 点	(70.0)	(69.7)	(71.3)	(78.0)	(72.5)
5～9 点	(18.2)	(19.1)	(19.2)	(16.0)	(18.1)
10～14 点	(8.4)	(8.2)	(7.3)	(4.6)	(7.1)
15 点～	(3.4)	(2.9)	(2.1)	(1.3)	(2.4)

表2-7-1. 通院頻度 (エイズ発症者)

通院頻度 (問7-1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 週間に 1 回以上	0 (0.0)	2 (7.1)	3 (12.0)	1 (10.0)	6 (7.3)
2 週間に 1 回以上	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)
1 か月に 1 回以上	14 (73.7)	19 (67.9)	18 (72.0)	7 (70.0)	58 (70.7)
3 か月に 1 回以上	3 (15.8)	7 (25.0)	4 (16.0)	1 (10.0)	15 (18.3)
6 か月に 1 回以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
それ以下	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (1.2)
不明	0 —	1 —	0 —	0 —	1 —
計	19	29	25	10	83

表2-7-2. 通院に掛かる時間（エイズ発症者）

通院に掛かる時間（片道） （問7-2）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
30分未満	5 (26.3)	7 (25.0)	6 (24.0)	2 (20.0)	20 (24.4)
1時間未満	9 (47.4)	13 (46.4)	9 (36.0)	3 (30.0)	34 (41.5)
2時間未満	4 (21.1)	8 (28.6)	8 (32.0)	4 (40.0)	24 (29.3)
3時間未満	1 (5.3)	1 (3.6)	2 (8.0)	0 (0.0)	4 (4.9)
不明	0 -	0 -	0 -	1 -	1 -
7計	19	29	25	10	83

表2-8-1. 障害者手帳の取得状況（エイズ発症者）

障害者手帳の取得状況 （問8）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
取得している	13 (76.5)	20 (95.2)	22 (95.7)	7 (77.8)	62 (88.6)
身体障害者手帳	13 (76.5)	20 (95.2)	22 (95.7)	7 (77.8)	62 (88.6)
療育手帳 （愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)
精神障害者保健福祉手帳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
取得していない	4 (23.5)	1 (4.8)	1 (4.3)	2 (22.2)	8 (11.4)
不明	2 -	8 -	2 -	1 -	13 -
計	19	29	25	10	83

表2-8-2. 障害者手帳を取得していない理由（エイズ発症者）

障害者手帳を取得していない理由 （問8-1）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
手帳の制度や取得の手続きが わからない	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)
とくに手帳がなくても困らない	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	4 (50.0)
手帳を持ちたくない	1 (25.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	3 (37.5)
その他	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (50.0)	3 (37.5)
不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
計	4	1	1	2	8

表2-9. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（エイズ発症者）

障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（問 9）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	1 (5.9)	4 (14.3)	1 (4.0)	1 (12.5)	7 (9.0)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
認定は受けていない	6 (35.3)	13 (46.4)	13 (52.0)	6 (75.0)	38 (48.7)
わからない	10 (58.8)	11 (39.3)	11 (44.0)	1 (12.5)	33 (42.3)
不明（無回答）	2 —	1 —	0 —	2 —	5 —
計	19	29	25	10	83

表2-10. 障害福祉サービスの利用状況（エイズ発症者）

障害福祉サービスの利用（問 10）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
利用している	1 (5.3)	6 (21.4)	5 (20.0)	0 (0.0)	12 (14.8)
訪問系サービス （居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援）	1 (5.3)	3 (10.7)	2 (8.0)	0 (0.0)	6 (7.4)
就労支援系サービス	1 (5.3)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.5)
訓練系サービス	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他日中活動サービス	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
障害者のグループホーム・ケアホーム	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (1.2)
入所施設	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
指定相談支援	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	2 (7.1)	3 (12.0)	0 (0.0)	5 (6.2)
わからない	0 (0.0)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)
利用していない	18 (94.7)	22 (78.6)	20 (80.0)	9(100.0)	69 (85.2)
不明	0 —	1 —	0 —	1 —	2 —
計	19	29	25	10	83

表2-11. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（エイズ発症者）

介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（問 11）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	1 (5.3)	4 (14.3)	2 (8.0)	3 (37.5)	10 (12.5)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
認定は受けていない	14 (73.7)	22 (78.6)	21 (84.0)	5 (62.5)	62 (77.5)
わからない	4 (21.1)	2 (7.1)	2 (8.0)	0 (0.0)	8 (10.0)
不明（無回答）	0 —	1 —	0 —	2 —	3 —
計	19	29	25	10	83

表2-12. 生活意識（エイズ発症者）

現在の暮らしの状況 (問 12)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
苦しい	13 (68.4)	17 (60.7)	14 (56.0)	7 (70.0)	51 (62.2)
大変苦しい	4 (21.1)	4 (14.3)	7 (28.0)	1 (10.0)	16 (19.5)
やや苦しい	9 (47.4)	13 (46.4)	7 (28.0)	6 (60.0)	35 (42.7)
普通	4 (21.1)	11 (39.3)	11 (44.0)	1 (10.0)	27 (32.9)
ゆとりがある	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	4 (4.9)
ややゆとりがある	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	3 (3.7)
大変ゆとりがある	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)
不明	0 -	1 -	0 -	0 -	1 -
計	19	29	25	10	83

表2-12 (参考). 生活意識（平成25年国民生活基礎調査）

現在の暮らしの状況 (所得票-質問 8)	合計
苦しい	(61.6)
大変苦しい	(28.9)
やや苦しい	(32.7)
普通	(34.4)
ゆとりがある	(4.0)
ややゆとりがある	(3.6)
大変ゆとりがある	(0.4)

表2-13. 所得金額（エイズ発症者）

昨年のおおよその年間所得総額 (問 13)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
200 万円未満	5 (35.7)	7 (33.3)	11 (47.8)	4 (50.0)	27 (40.9)
200～400 万円未満	6 (42.9)	10 (47.6)	6 (26.1)	4 (50.0)	26 (39.4)
400～600 万円未満	3 (21.4)	1 (4.8)	4 (17.4)	0 (0.0)	8 (12.1)
600～800 万円未満	0 (0.0)	2 (9.5)	1 (4.3)	0 (0.0)	3 (4.5)
800～1000 万円未満	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)
1000 万円以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (1.5)
わからない	4 -	3 -	1 -	0 -	8 -
不明（未回答）	1 -	5 -	1 -	2 -	9 -
計	19	29	25	10	83

表2-13 (参考). 所得金額 (平成25年国民生活基礎調査)

所得金額	世帯主の年齢				合計 (30～69 歳)
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	
200 万円未満	(8.4)	(11.1)	(12.4)	(19.8)	(14.1)
200～400 万円未満	(21.6)	(15.8)	(16.8)	(28.9)	(21.7)
400～600 万円未満	(33.7)	(22.3)	(16.1)	(19.7)	(21.7)
600～800 万円未満	(20.6)	(21.5)	(17.2)	(12.9)	(17.2)
800～1000 万円未満	(9.3)	(14.9)	(14.4)	(7.7)	(11.3)
1000 万円以上	(6.4)	(14.5)	(23.1)	(11.0)	(14.1)

表 2-14. 自由記載欄の記入の有無 (エイズ発症者)

自由記載欄の記入の有無 (問 1 4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
記載あり	13 (68.4)	19 (65.5)	19 (76.0)	7 (70.0)	58 (69.9)
健康、医療、福祉に関すること	12 (63.2)	17 (58.6)	19 (76.0)	5 (50.0)	53 (63.9)
日常生活、仕事、収入に関すること	11 (57.9)	16 (55.2)	17 (68.0)	7 (70.0)	51 (61.4)
その他のこと	6 (31.6)	8 (27.6)	8 (32.0)	4 (40.0)	26 (31.3)
記載なし	6 (31.6)	10 (34.5)	6 (24.0)	3 (30.0)	25 (30.1)
計	19	29	25	10	83

第4章 資料

2015年－健1

様式2－2

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、発症者健康管理手当の費用の受給者が担当医師に今年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の生活状況報告書とともに8月1日から31日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。
2. 現況届（様式第3号）のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかながみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
3. 今年度の健康状態を担当医師が2期分（Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月））のみ記入して下さい。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック（✓）を入れ、（ ）には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、2期分（Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月））の健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載して下さい。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称 住 所（〒 ） 電話番号 （ ） 医師氏名 （診療科名 印 ）						
備 考						

{ 1/4 }

A. 基礎疾患と肝炎等の状況				
基 礎 疾 患	☐ 血友病A ☐ 血友病B ☐ von Willebrand病 ☐ 二次感染 ☐ 三次感染 ☐ その他 ()			
肝炎等の有無	☐ 無し ☐ 慢性肝炎 ☐ 肝硬変 ☐ 肝臓 ☐ その他 ()			
HBs- 抗 原	☐ + ☐ - ☐ 不明	HCV-抗体	☐ + ☐ - ☐ 不明	
H C V - R N A	☐ TaqMan法 [() Log IU/mL ☐ 検出せず] ☐ RT-PCR法() $\times 10^3$ IU/mL ☐ 未検査			
血 小 板 数	() $\times 10^4$ /mm ³ ☐ 未検査	A F P	()ng-mL ☐ 未検査	
T.bil	()mg/dL ☐ 未検査	クレアチニン	()mg/dL ☐ 未検査	
ALT (GPT)	()IU/L ☐ 未検査	インターフェロン製剤 での治療歴 (リバビリンの併用の有無)	☐ 有 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 無	
アルブミン	()g/dL ☐ 未検査			
プロトロンビン	PT活性%()% ☐ 未検査	肝 移 植 歴	☐ 有 ☐ 無	
脳 血 管 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 脳出血 ☐ 脳梗塞 ☐ その他の脳血管疾患			
虚 血 性 心 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 心筋梗塞 ☐ その他の虚血性心疾患			
悪性新生物(肝以外)の有無	☐ 無し ☐ 肝臓以外の悪性新生物 (部位:)			
そ の 他 の 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 高血圧 ☐ 糖尿病 ☐ その他 ()			

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・AFP値・クレアチニン値については、[単位にご注意のうえ](#) () に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

B. 検査の実施状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
検査実施年月日	(2015/ /)	(2015/ /)	(2015/ /)	(2016/ /)
期間中の診察の有無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
期間中のCD4値検査の有無	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査
CD4値 (/ μ L)	()	()	()	()
CD4/CD8比	()	()	()	()
期間中のHIV-RNA量検査の有無	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査	☐ 実施 ☐ 未検査
HIV-RNA量の検査法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法
HIV-RNA量	() コピー/mL	() コピー/mL	() コピー/mL	() コピー/mL
*単位は「コピー/mL」でご記入下さい (例: $4.3 \times 10^3 \rightarrow 4300$ コピー/mL)。 *検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入下さい。	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	I 期 (4~6月)	II 期 (7~9月)	III 期 (10~12月)	IV 期 (1~3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. ジドブジン・ラミブジン[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. テノホビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. アバカビル・ラミブジン[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. テノフォビル・エムトリシタビン[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. デラビルジン [DLV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. リルピビルン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. インジナビル [IDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. ロピナビル・リトナビル[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・ テノホビル [EVG・COBI・FTC・TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
27. ドルテグラビル [DTG]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック (✓) をし、記入例のように服薬状況を **5段階** から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック (✓) をして下さい。また、1~26以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の () に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	✓	(1 ・ ② ・ 3 ・ 4 ・ 5)		

D. インターフェロン製剤等の投与状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
2. リバビリン	☐	☐	☐	☐
3. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
4. シメプレビル	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（✓）をし、インターフェロン製剤等の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

E. 副作用の発現状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐
その他3 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（✓）して下さい。副作用の無かった場合は、「0.なし」にチェック（✓）して下さい。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入下さい。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. アトパコン	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（✓）して下さい。投与が無かった場合は、「0.実施していない」をチェック（✓）して下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

G. 眼底検査実施の有無	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（✓）して下さい。

2015-健2

様式3

生 活 状 況 報 告 書

(本人記入用)

		個人番号	-0
氏名		記入日	年 月 日現在

記入要領

1. この報告書は、発症者健康管理手当の受給者が今年度の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書とともに8月1日から31日までの間に提出してください。**
2. 現況届（様式第3号）のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら、治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかんがみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
3. あなたの日常生活の状態について、問1～問14の回答方法に応じて、最も良く当てはまると思われる状態の数字を○で囲むか、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなたの現在のお住まいはどこですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等） | 3. 社会福祉施設等に入所中 |
| 2. 病院・診療所に入院中 | 4. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、**あなたを含めて**何人ですか。（一時的に不在の方を含みます。）

人 ➡ 2人以上 と答えた方に伺います。

問2-1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。
あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|------------|---------|
| 1. 配偶者 | 3. 子ども（成人） | 5. 兄弟姉妹 |
| 2. 子ども（未成年） | 4. 父母 | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 失業・求職中 |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 家事（専業） |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. その他（ ） |
| 4. 仕事あり（1～3以外） | |

※収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4（仕事あり）、まったく仕事をしなかった方は5～7（仕事なし）の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4（仕事あり）とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7（仕事なし）とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

〔1/4〕

問 8 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください。

1. 身体障害者手帳	→ 等級に○をつけてください。
2. 療育手帳（愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）	ア. 1 級 エ. 4 級
3. 精神障害者保健福祉手帳	イ. 2 級 オ. 5 級
4. 取得していない	ウ. 3 級 カ. 6 級

4. 取得していない と答えた方に伺います。	→ 種別に○をつけてください。
	ア. 肢体不自由
	イ. 免疫機能障害
	ウ. その他

問 8-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない
2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない
3. とくに手帳がなくても困らない
4. 手帳を持ちたくない
5. その他

問-9 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください。

1. 認定を受けている	→ 区分に○をつけてください。
2. 認定調査は受けたが、非該当だった	ア. 区分 1 エ. 区分 4
3. 認定を受けていない	イ. 区分 2 オ. 区分 5
4. わからない	ウ. 区分 3 カ. 区分 6

問-10 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください。

1. 利用している	2. 利用していない	→ 問 11 へ
-----------	------------	----------

1. 利用している と答えた方に伺います。

問10-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援）
2. 就労支援系サービス
3. 訓練系サービス
4. その他日中活動サービス
5. 障害者のグループホーム・ケアホーム
6. 入所施設
7. 指定相談支援
8. その他
9. わからない

[3/4]

問11 あなたは介護保険法に基づく要介護（支援）認定を受けていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 認定を受けている | 3. 認定を受けていない |
| 2. 認定調査は受けたが、非該当だった | 4. わからない |

1. 認定を受けている と答えた方に伺います。

区分に○をつけてください。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ア. 要支援 1 | ウ. 要介護 1 | カ. 要介護 4 |
| イ. 要支援 2 | エ. 要介護 2 | キ. 要介護 5 |
| オ. 要介護 3 | ク. わからない | |

現在、介護（予防）サービスを利用していますか。

- | |
|------------|
| 1. 利用している |
| 2. 利用していない |

問12 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 2. やや苦しい | 3. 普通 | 4. ややゆとりがある | 5. 大変ゆとりがある |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|

問13 差し支えなければ、あなたの世帯の昨年のおおよその年間所得総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 200 万円未満 | 5. 800～1000 万円未満 |
| 2. 200～400 万円未満 | 6. 1000 万円以上 |
| 3. 400～600 万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800 万円未満 | |

問14 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。

以下の項目に分けて、自由にお書きください。

あなたの健康、医療、福祉に関すること
日常生活、仕事、収入に関すること
その他のこと

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）TEL. _____
 ※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式第4号）を速やかに提出して下さいをお願いします。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

〔4/4〕

エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

平成 26 年度 報告書

発行日 平成 28 年 3 月 第 1 版

発行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV 感染者の調査研究班 事務局
国立大阪医療センター 臨床研究センター 内
エイズ先端医療研究部
〒540-0006
大阪市中央区法円坂 2-1-14
TEL 06 - 6942 - 1331 FAX 06 - 6946 - 3652

編集	班 長	国立大阪医療センター	白阪 琢磨
	班 員	国立国際医療研究センター	岡 慎一
		藤田保健衛生大学	川戸美由紀
		藤田保健衛生大学	橋本 修二
		兵庫医科大学	日笠 聡
		東京医科大学	福武 勝幸
		国立長崎医療センター	八橋 弘

印刷・製本 (株)太陽美術
