



エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV感染者の調査研究

平成27・28年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

研究班の構成

班長	白 阪 琢 磨	国立大阪医療センター
班員	大 金 美 和	国立国際医療研究センター
	岡 慎 一	国立国際医療研究センター
	岡 本 学	国立大阪医療センター
	川 戸 美由紀	藤田保健衛生大学
	橋 本 修 二	藤田保健衛生大学
	日 笠 聡	兵庫医科大学
	福 武 勝 幸	東京医科大学
	八 橋 弘	国立長崎医療センター

目 次

はじめに

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目的	1
第2章 結果の概要	2
1. 臨床・日常生活の現状	2
2. 治療の現状	6
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討	10

第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法	17
1. 集計の対象者	17
2. 集計の基礎資料	17
3. データの取り扱い	17
4. 結果表の作成方法	18
5. 集計結果を見る上での注意	22
第4章 結果表	25
1. 臨床・日常生活・治療の現状	25
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移	44
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）	58
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）	68
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）	78
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）	88
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連	98
8. 生活状況	114

第Ⅲ部 エイズ発症者調査

第5章 目的と方法、結果の概要	121
第6章 集計方法	122
第7章 結果表	123
1. 臨床・治療状況	123
2. 生活状況	129

第Ⅳ部 資料

1. 健康状態報告書	135
2. 日常報告書	139
3. 生活状況報告書	143
4. 健康状態報告書（エイズ発症者調査）	147
5. 生活状況報告書（エイズ発症者調査）	151

は じ め に

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進展しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることも可能となった。また、これらの進展は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いわば「管理可能な慢性疾患」に近づきつつあるといえるが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることによって、これまでとは別の課題も表面化してきている。以前にもまして、臨床、日常生活と治療の現状や推移を的確に把握し、治療法変更の影響やエイズ発症の関連要因の検討などを通して、HIV 感染者の QOL 向上を目指すことの重要性が大きくなってきている。また、長期療養に関する今後の対応方策を検討する上で、生活の状況の把握が基礎となると考えられる。さらに、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症の HIV 感染者とともに、エイズ発症者の状況の把握が大切であろう。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている（厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書）。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

研究報告書は、前年度までの事業で集積された情報を分析したものであるため、その名称に情報の年度（前年度）を付けてきた。昨年度（平成 27 年度）は「平成 26 年度 報告書」である。混乱を招くとの意見から、次年度以降は研究報告書の名称には分析した年度を付けることにし、本年度は移行年度のために「平成 27・28 年度 報告書」とした。

本研究報告書において、平成 27 年度までの本事業で集積された情報に基づいて、エイズ未発症の HIV 感染者における臨床・日常生活・治療の現状および推移等を、「第Ⅰ部 目的、結果の概要」と「第Ⅱ部 集計方法、結果表」に示している。本年度からは生活の状況に関する情報も追加されている。第Ⅰ部では、本報告書の概要を理解したい読者を想定し、目的と結果の概要をコンパクトかつ視覚的に提示することに留意した。第Ⅱ部には本報告書をより詳細に理解したい読者のために、詳細な集計方法を示すとともに、集計結果のすべてを結果表として提示した。「第Ⅲ部 エイズ発症者調査の概要」には、エイズ発症者における臨床・治療と生活の状況に関する調査結果を示した。また、「第Ⅳ部 資料」には事業への報告書を資料として添付した。HIV 感染者・エイズ発症者やその家族、医師や医療関係者、行政関係者、研究者などの今後の活動において、本報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに公益財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目 的

第2章 結果の概要

1. 臨床・日常生活の現状
2. 治療の現状
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

第1章 目 的

抗HIV治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることに伴って、HIV感染者のQOL維持・向上において、臨床・日常生活・治療の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。また、長期療養に関する今後の対応方策を検討する上で、生活の状況の把握が基礎となると考えられる。さらに、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症のHIV感染者とともに、エイズ発症者の状況の把握が大切であろう。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」（以下、本事業）は、血液製剤によるHIV感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成5年度から開始され、その対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。また、エイズ発症者の状況を把握するため、平成26年度から「エイズ発症者調査」を実施している。

研究目的は、血液製剤によるHIV感染者において、臨床・日常生活・治療についての平成27年度の現状および平成5～27年度の推移並びに生活の状況を明らかにすることにある。臨床状況としてはCD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、および、肝炎の状況などである。日常生活状況としては身体状況と日常生活動作などである。治療状況としては、抗HIV薬の併用状況、服用状況と副作用とともに、ニューモシスチス肺炎予防薬の投与と眼底検査実施の状況などである。生活の状況としては、住居、就業、生活意識などであり、平成27年度途中に調査への協力を依頼した。また、「エイズ発症者調査」からエイズ発症者における臨床・治療と生活の状況を検討した。

第2章 結果の概要

平成27年度事業対象者は520人であった。27年度の開始者は1人で、エイズ発症・死亡などに伴う中止者は7人であった。5～27年度では、事業対象者の実人数は946人であり、エイズ発症・死亡などに伴う中止者が434人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 臨床・日常生活の現状」、「2. 治療の現状」と「3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

1. 臨床・日常生活の現状

平成27年度第4期（28年1～3月）事業対象者515人において、CD4値、HIV-RNA量、身体状況と日常生活動作および肝炎の状況を観察した。なお、第4期データが未報告の場合、第1～3期のものを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、25年度と26年度の第4期の結果を付記）。CD4値は200／ μ l未満が7%、200～350未満が16%、350～500未満が26%、500以上が51%であった。HIV-RNA量は検出せずと50未満が94%であり、10,000以上は1%であった。25・26年度の結果と比べて、CD4値は500以上の割合が、HIV-RNA量は検出せずと50未満の割合が高い傾向であった。

図2-1-3～4にCD4値別、身体状況と日常生活動作の良い者の割合を示す（表4-1-18～19を参照）。なお、身体状況の良い者とは食欲や疲れなどの13項目の平均が「どちらともいえない」よりも良い状態であり、日常生活動作の良い者とは「全く健康」または「軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる」である（「第3章 集計方法」を参照）。身体状況の良い者の割合は62%、日常生活動作の良い者の割合は50%であった。いずれも良い者の割合はCD4値が200未満で低い傾向であった。

図2-1-5～6に肝炎ウイルスと肝炎の状況を示す（表4-2-1～2を参照、25年度と26年度の第4期の結果を付記）。HCV抗体陽性は91%であった。肝炎の状況としては、肝がんが2%、肝硬変が13%、慢性肝炎が50%に見られた。25・26年度の結果と比べて、肝がんと肝硬変の割合に大きな変化がなかった。

以上、CD4値とHIV-RNA量の良好な状態にある者が多かった。CD4値の低い者では日常生活状況が良くない傾向であった。肝がんや肝硬変が一部の者に見られ、慢性肝炎の者が多かった。

図2-1-1. CD4値の分布（平成25～平成27年度第4期事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（平成25～平成27年度第4期事業対象者）




図2-1-3. CD4値別、身体状況（平成27年度第4期事業対象者）

身体状況

良い者の割合
(%)




図2-1-4. CD4値別、日常生活動作（平成27年度第4期事業対象者）

日常生活動作

良い者の割合
(%)




図2-1-5. 肝炎ウイルスの状況（平成27年度第4期事業対象者）





図2-1-6. 肝炎の状況（平成25～平成27年度第4期事業対象者）



2. 治療の現状

平成27年度第4期事業対象者において、抗HIV薬の併用区分、服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査の状況を観察した。図2-2-1にCD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照）。抗HIV薬の併用区分としては、「INSTI」（インテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせ）が65%と最も多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が11%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が11%、それ以外の投与状況が7%であった。投与なしは過去の投与歴なしが4%、過去の投与歴ありが2%であった。なお、投与歴なしは本事業の対象者となった時点以降に抗HIV薬の投与がないことを指し、それ以前の投与ありが一部含まれている可能性がある。

図2-2-2に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の8つの組み合わせが10人以上に投与され、投与者全体の65%を占めていた。その中で、5つの組み合わせが「INSTI」（3TC+ABC+RAL、3TC+ABC+DTG、TDF+FTC+RAL、TDF+FTC+DTG、TDF+FTC+EVG+COBI）であり、268人（投与者全体の55%）に投与されていた。なお、この併用区分は各期間内に投与された薬剤に基づくものであり、同時併用と異なるケースも若干含まれることに注意を要する。

図2-2-3～4に抗HIV薬の併用区分別、服用状況と副作用を示す（表4-1-7～8を参照）。「全部服用」の割合が98%と高く、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」ごとにみても同様であった。副作用としては、リポジストロフィーが多く、それ以外は「NRTI2剤+PI1・2剤」の下痢などであった。なお、副作用は各期間またはそれ以前に投与された薬剤に基づくものであり、投与中の薬剤によらないもの（副作用によって薬剤が変更される場合など）が含まれることに注意を要する。図2-2-5にCD値別、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を示す（表4-1-12～13を参照）。CD4値が200未満では、ニューモシスチス肺炎予防薬が42%に投与されていた。

以上、抗HIV薬の投与はインテグラーゼ阻害薬を含む、いくつかの組み合わせに集中していた。服薬状況はきわめて良好であったが、一方、リポジストロフィーなどの副作用もみられた。最新の知見に基づく適切な治療が実施されているように思われる。HIV-RNA量とCD4値、服用状況と副作用に留意しつつ、「抗HIV治療ガイドライン（2016年3月）」（平成27年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）による「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班」）を参考にして、一層の適切な治療へ向かうことを望みたい。

図2-2-1. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成27年度第4期事業対象者）







図2-2-2. 抗HIV薬の併用の主な組み合わせ（平成27年度第4期事業対象者）



* 10例以上のみ表示

図2-2-3. 抗HIV薬の併用区分別、服薬状況（平成27年度第4期事業対象者）



抗HIV薬の併用区分

図2-2-4. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成27年度第4期事業対象者）





図2-2-5. CD4値別、ニューモシスチス肺炎(PCP)予防薬と眼底検査(平成27年度第4期事業対象者)



3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

平成5年度第4期当初の事業対象者417人と9年度第1期当初の事業対象者605人において、[図2-3-1～2](#)にエイズ発症・死亡者数の推移を示す。エイズ発症・死亡者数は5～8年度に多かったが、9年度以降に著しく減少し、さらに23年度以降に若干の減少がみられた。

[図2-3-3～6](#)にCD4値とHIV-RNA量の推移を示す（[表4-5-1、5](#)を参照）。CD4値の中央値について、エイズ未発症の生存者では、9～13年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいが続いたが、20年度頃から上昇傾向がみられた。エイズ発症・死亡者を最悪値とみて観察対象に含めると、CD4値の中央値は14～17年度に低下傾向、その後ほぼ横ばい、最近に若干の上昇傾向であった。CD4値350以上の割合も同様に最近上昇傾向であった。HIV-RNA量の中央値は9年度第1期以降急激に低下し、11年度第3期から400未満（検出限界以下）であった。400未満の割合はさらに上昇し、エイズ未発症の生存者では95%以上であった。[図2-3-7～8](#)に身体状況と日常生活動作の推移を示す（[表4-5-3～4](#)を参照）。身体状況と日常生活動作の良い者の割合は9年度から低下し、エイズ未発症の生存者では最近若干の低下傾向であった。

[図2-3-9](#)に抗HIV薬の併用区分の推移を示す（[表4-5-6](#)を参照）。「NRTI2剤+PI1・2剤」の割合は11年度まで急激に上昇し、その後に低下と上昇を経て、最近、低下傾向であった。「NRTI2剤+NNRTI」の割合は15年度まで急激に上昇したが、その後にほぼ横ばいが続き、最近は低下傾向であった。20年度から「INSTI」の急激な増加が開始し、27年度には投与者全体の65%程度となった。[図2-3-10](#)に9年度第2期～27年度第3期の間で抗HIV薬の併用区分が変更された主なケース（変更なしは参考）について、変更前後のCD4値の中央値を示す（[表4-6-2](#)を参照）。「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により、CD4値の中央値はそれぞれ100程度と50程度の上昇傾向であった。また、「投与なし（投与歴あり）」と「NRTI2剤+NNRTI」から「INSTI」への変更により上昇傾向であった。また、CD4値の中央値が高い状況で、「NRTI2剤+PI1・2剤」から「INSTI」へ変更している傾向であった。

以上、エイズ発症・死亡は以前より著しく減少し、最近、さらに若干の減少がみられた。HIV-RNA量とCD4値はさらに改善が進んでいる傾向であった。抗HIV薬の併用区分では「INSTI」が増加し、投与者全体の65%程度となった。抗HIV薬の変更とCD4値の変化との間には強い関連性が示唆された。今後、さらに推移観察を継続するとともに、推移の関連要因の検討を進めることが重要であろう。

図2-3-1. エイズ発症・死亡者数の推移（平成5年度第4期事業対象者）

エイズ発症・
死亡者数





図2-3-2. エイズ発症・死亡者数の推移（平成9年度第1期事業対象者）

エイズ発症・
死亡者数







図2-3-5. CD4値350以上の者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-6. HIV-RNA量400未満の者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-7. 身体状況の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-8. 日常生活動作の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-9. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）





図2-3-10. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）



第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法

1. 集計の対象者
2. 集計の基礎資料
3. データの取り扱い
4. 結果表の作成方法
5. 集計結果を見る上での注意

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状
2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移
3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）
4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）
5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）
6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）
7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連
8. 生活状況

第3章 集計方法

1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～27年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、9年度以降はその制限がなくなっている。エイズを発症すると、本事業の対象から外れる。なお、エイズ発症者は「エイズ発症者調査」の対象であり、詳細は「第Ⅲ部」に示す。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。5～26年度に一度でも本事業の対象になった実人数は946である。その中で、5年度に本事業の対象となった者が48%、6～9年度が8～12%、10～16年度が1～3%、17～27年度が1%未満であった。本事業の中止者は434人であり、中止理由のほとんどはエイズ発症・死亡に伴うものである。その中で、8年度末までの中止者が177人であり、41%を占めている。27年度第4期での本事業対象者は515人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（AIDS既発症者と死亡者を除く）は2015年5月時点で562人とされており、その92%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は5～27年度に本事業対象者から提出された調査票である。調査票には「健康状態報告書」と「日常報告書」があり、いずれも四半期ごとに調査される（「日常報告書」は5～8年度には毎月調査された）。また、平成27年度の途中で新たに「生活状況報告書」への協力を依頼した。

「健康状態報告書」の主な項目は、年齢、CD4値、CD4/CD8比、抗HIV薬の投与状況などである。9年度以降にはHIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用などが追加されている。肝炎ウイルスと肝炎に関係する項目は14年度以降に順次拡充されている。抗HIV薬の投与状況としては5～8年度ではAZTとddlを挙げて、それ以外は薬剤名を記入する方式になっていた。9年度以降では抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名を追加し、それ以外は薬剤名を記入する方式となっている（記入された薬剤名もすべて計上した）。副作用としては14年度には中枢神経症状とリポジストロフィー（13年度までは「その他」に含む）、16年度にはすべての副作用の有無が追加された。「日常報告書」の主な項目は、体重、身体状況、日常生活動作などである。身体状況と日常生活動作は5～8年度と9年度以降で一部変更がある。「生活状況報告書」の主な項目は、日常生活への影響、こころの状態、就業状況、所得金額、生活意識、障害者手帳の取得、障害福祉サービスの利用などである。平成27年度の「健康状態報告書」、「日常報告書」と「生活状況報告書」を「第Ⅳ部 資料」に付けた。

3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化した。CD4値のカテゴリーは200未満、

200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。臨床・日常生活・治療の現状の集計（「4. 結果表の作成方法」を参照）では、HIV-RNA量について、最近の検査法の検出限界50を考慮して、400未満を、検出せず、50未満と50～400未満に細分した。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」に区分した。投与ありについては、「NRTI1剤」、「NRTI2剤」、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」と「その他」に区分した。「NRTI2剤+PI1・2剤」とはNRTI2剤とPI1剤または2剤とした。「NRTI2剤+NNRTI」とはNRTI2剤とNNRTI1剤とした。「INSTI」とはインテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせとした。なお、コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

身体状況は食欲や疲れなどの項目からなり、5～8年度では11項目、9年度以降では13項目である。各項目は「とてもある」などから「全くない」などまでの5段階の選択肢であり、項目ごとに好ましい選択肢から順に「1」～「5」までのスコアを与えた。また、項目全体の総合スコアとして、項目全体の平均スコアを算出し、1～2未満、2～3未満、3～4未満、4～5の4カテゴリーまたは1～3未満とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、総合スコアのCronbachの α 係数は9年度第1期～第4期で0.90～0.91であり、高い内的整合性を示した。総合スコアの4カテゴリーは9年度第1期と第2期の κ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者451人）が0.80（重み付き κ 係数0.84）であり、高い再現性を示した。

日常生活動作は5～8年度では「無症状で、通常の活動が可能」から「過去1か月間、日中の半分以上、床上安静生活を行った」までの4段階の選択肢であり、9年度以降では「全く健康」から「重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある」までの8段階の選択肢である。好ましい選択肢の順に「1」からスコアを与え、1、2、3、4以上の4カテゴリーまたは1・2とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、この4カテゴリーは9年度第1期と第2期の κ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者420人）が0.87（重み付き κ 係数0.91）であり、高い再現性を示した。

4. 結果表の作成方法

本集計は8つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も8つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

（1）臨床・日常生活・治療の現状

本集計は本事業対象者の臨床・日常生活・治療の現状把握を目指したものである。集計対象者は27年度第4期の事業対象者515人とした。基礎資料は同時点（最新）のものとし、抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量が未報告の場合、第1～3期の最も新しい時点に変更した（表3-4-1）。集計対象項目は基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、抗HIV薬の投与・服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬、眼底検査、体重、身体状況と日常生活動作のすべてを取り上げた。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した（表4-1-1～2）。

CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した（表4-1-3～4）。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した（表4-1-5）。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した（表4-1-6）。抗HIV薬の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。また、CD4値別に、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を集計した（表4-1-12～13）。

体重、身体状況、日常生活動作はCD4値別に基礎統計量を示した（表4-1-14）。身体状況と日常生活動作は年齢別の分布（表4-1-15～16）を示した。CD4値と抗HIV薬の併用区分別に、体重、身体状況と日常生活動作の分布（表4-1-17～19）を示した。CD4値別または抗HIV薬の併用区分別に、身体状況の各項目を集計した（表4-1-20～21）。疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、高血圧・糖尿病）を集計した（表4-1-22）。

（2）臨床（肝炎関連）の現状と推移

本集計は本事業対象者の臨床（肝炎関連）の現状と推移の把握を目指したものである。現状の把握では、集計対象者は27年度第4期の事業対象者とし、基礎資料は最新のもので「（1）」と同じとした。推移の把握では、集計対象者は17年第1期当初（17年4月1日）の事業対象者633人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。集計対象項目は肝炎の状況、肝炎ウイルス（HBs抗原、HCV抗体、HCV-RNA定性、HCV-RNA定量）、血小板数と総ビリルビン、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植、および、インターフェロン製剤等の現在の投与状況とし、それ以外にCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況などを取り上げた。

肝炎関連の現状として、肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-2-1～2）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-2-3）。肝炎の状況別に、HCV-RNA定量、血小板数、ALT(GPT)、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、AFP、クレアチニンの分布を示した（表4-2-4～11）。肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植歴、インターフェロン製剤等の現在の投与状況を示した（表4-2-12～14）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、抗HIV薬、身体状況、日常生活動作の分布を集計した（表4-2-15～20）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分を組み合わせ集計した（表4-2-21）。

肝炎関連の推移として、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-22）。観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況のそれぞれ別に、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-23～25）。

（3）臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本集計は各時点の本事業対象者の臨床・日常生活・治療状況の把握を目指したものである。集計対象者は各時点の事業対象者とし、各時点の基礎資料を用いた。結果表には5～24年度の各第1期と25～27年度の各四半期の結果を示した。CD4値、CD4/CD8比は各時点の分布と中央値を示した（表4-3-1～2）。身体状況は総合スコアの各時点の分布と割合（スコア1～3未満の割合）を示した（表4-3-3）。日常生活動作は各時点の分布と割合（スコア1と2の割合）を示した（表4-3-4）。また、HIV-RNA量は各時点（平成9年度以降）の分布と中央値を示した（表4-3-5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-3-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は各時点（平成9年度以降）の分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-3-7～8）。

この集計では、各時点の事業対象者に入出りがあることに注意を要する。また、身体状況と

日常生活動作では5～8年度と9年度以降で調査内容が異なる。

(4) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は5年度第4期当初（6年1月1日時点）の事業対象者417人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には5年度第4期、6～24年度の各第1期と25～27年度の各四半期の結果を示した。なお、観察開始を5年度第4期としたのは、より長い期間の推移を観察することを目指し、事業対象者がある程度の人数になった時点を選んだものである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-4-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-4-7～8）。HIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用は9年度以降である。

本集計対象者にはエイズ発症・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、エイズ発症・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。エイズ発症・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。エイズ発症・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。エイズ発症・死亡の割合は、測定値の不明者を除くと、15年度以降では40％程度以上と大きいことから、中央値と割合の精度が高くないことに注意を要する。なお、集計対象者および中央値の計算方法が異なる以外は「(3)」の集計方法と同じである。

(5) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者605人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には9～24年度の各第1期と25～27年度の各四半期の結果を示した。9年度第1期としたのは、その時点で調査項目の大幅な変更（HIV-RNA量などの追加、身体状況などの項目の変更）があったためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-5-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-5-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-5-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。一方、AIDS発病・死亡の割合は26年度第4期でも40％程度であることから、「(4)」と異なり、エイズ発症・死亡を含めた場合の中央値と割合の精度はそれほど低くない。

(6) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本集計は、同一集団の臨床・日常生活・治療状況について、最近の推移把握を目指したものである。集計対象者は19年度第1期当初（19年4月1日時点）の事業対象者601人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。19年度第1期としたのは、最近の抗HIV治療の進展を考慮したためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の

分布と中央値または割合を示した（表4-6-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-6-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-6-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」と「(5)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、エイズ発症・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。

(7) 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本集計では、抗HIV薬の併用区分・併用薬剤の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連について検討を試みた。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。

9年度第2期～27年度第4期までの時点ごとに、前の時点と当該時点の抗HIV薬の併用区分の組み合わせ別に該当する人数を集計した（表4-7-1）。また、9年度第2期～27年度第3期に生じた抗HIV薬の併用区分の変更状況別の延べ対象者について、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」のCD4値とHIV-RNA量の中央値を算定するとともに、「前の時点」と「後の時点」の間の差を符号付きWilcoxon検定により検定した（表4-7-2～3）。「前の時点」におけるCD4値が500未満の者、HIV-RNA量が400以上の者に限定した集計、および、3期間（9～13年度、14～18年度、19～27年度）別の集計も行った。同様に、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」における服用状況、副作用、身体状況、日常生活動作について集計した（表4-7-4～7）。なお、HIV-RNA量について、中央値の算定では、検出限界の検査結果は検出限界区間の半分の値（400未満では200、50未満では25など）とし、また、検出せずの検査結果は0とした。

集計対象について詳しく説明する。たとえば、9年度第2期において、抗HIV薬の併用区分が「NRTI2剤」であって、かつ、その前の時点（9年度第1期）のそれが「投与なし（投与歴あり）」であれば、抗HIV薬の併用区分の変更は「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に分類され、また、「前の時点」が9年度第1期、「その時点」が第2期、「後の時点」が第3期となる。本集計では「延べ対象者」と呼んでいるが、これは、たとえば「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」の者が「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に2人、「NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）」に1人と数えられるためである。なお、「NRTI2剤+PI1・2剤→NRTI2剤+PI1・2剤」の分類には前後の抗HIV薬の比較により「変更薬剤なし」、「変更薬剤1剤」と「変更薬剤2剤以上」の細分類も加えた。

(8) 生活状況

本集計は本事業対象者の生活状況の現状把握を目指したものである。集計対象者は「生活状況報告書」（平成27年度の途中に調査への協力を依頼）の提出者391人（平成27年度事業対象者520人の75%）とした。基礎資料は「生活状況調査票」から得た。集計対象項目は住居の種類、世帯人員数、就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態、通院頻度、通院に掛かる時間、障害者手帳の取得状況、障害者手帳を取得していない理由、障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況、障害福祉サービスの利用状況、介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況、生活意識、所得金額、自由記載欄の記入の有無のすべてを取り上げた。各調査項目について、年齢階級別の回答分布を示した（表4-8-1～16）。年齢階級は39歳以下、40～49歳、50～59歳、60歳以上とした。こころの状態はうつ病・不安障害等のスクリーニング尺度のK 6の得点により0～4点、5～9点、10～14点、15点以上（重い問題の可能性あり）

に区分した。

5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第2章 結果の概要」と「第4章 結果表」に示した。これらの集計結果を見る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関わる注意点として、データの正確性と精度などがある。データの正確性としては、たとえば、データの記載間違い、データのコンピュータ媒体への入力段階での誤りなどの可能性がある。本事業対象者のエイズ発症・死亡がすべて把握されているとは限らない。死亡原因、エイズ発症者のその後の死亡状況、および、死亡者の死亡時点でのエイズ発症状況は不明である。データの精度としては、たとえば、CD4値やHIV-RNA量などは四半期内の1回の測定によるものであり、測定精度が関係する。抗HIV薬の併用区分は「健康状態報告書」に記載された抗HIV薬の投与状況によって分類しているが、5～8年度と9年度以降では調査票の形式が異なる。投与歴の有無は、あくまでも、本事業対象者になった時点以降の抗HIV薬の投与状況に基づいており、それ以前の投与状況は考慮されていない。副作用は抗HIV薬に限って調査したのではなく、その関係もあって「投与なし」にも副作用は若干存在する。身体状況と日常生活動作は先に述べた通り5～8年度と9年度以降では調査内容が異なることから、この2つの期間では厳密な比較ができない。HIV-RNA量の測定方法は年次とともに変更されてきたが、その違いによる測定値への影響を考慮していない。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表4-4-1～5、表4-5-1～5などでは、2通りの中央値または割合を示している。これはAIDS発病・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。さらに、治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連（表4-7-1～7）については、それ以外の表とは全く集計方法が異なるが、結果表を見る上では、その集計方法を十分に理解することが大切である（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

それ以外の注意点として、たとえば、表4-1-6にCD4値とHIV-RNA量別の抗HIV薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4値とHIV-RNA量によって抗HIV薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗HIV薬の併用によってCD4値とHIV-RNA量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗HIV薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況（集計対象者）

		全体	各期ごと			
			第1期	第2期	第3期	第4期
平成5年度	事業対象者数	453	385	384	415	438
	開始者数	453	385	0	35	33
	中止者数	23	1	4	10	8
平成6年度	事業対象者数	530	463	489	487	492
	開始者数	100	33	34	13	20
	中止者数	55	8	15	15	17
平成7年度	事業対象者数	552	490	498	496	510
	開始者数	77	15	20	16	26
	中止者数	50	12	18	12	8
平成8年度	事業対象者数	603	553	554	558	561
	開始者数	101	51	21	13	16
	中止者数	49	20	9	13	7
平成9年度	事業対象者数	667	621	633	642	654
	開始者数	113	67	16	15	15
	中止者数	18	4	6	3	5
平成10年度	事業対象者数	672	658	656	662	661
	開始者数	23	9	2	7	5
	中止者数	15	4	1	6	4
平成11年度	事業対象者数	682	666	667	674	676
	開始者数	25	9	3	8	5
	中止者数	9	2	1	3	3
平成12年度	事業対象者数	682	677	673	668	662
	開始者数	9	4	4	1	0
	中止者数	20	8	6	6	0
平成13年度	事業対象者数	670	666	664	663	662
	開始者数	8	4	1	3	0
	中止者数	9	3	4	1	1
平成14年度	事業対象者数	673	666	666	666	664
	開始者数	12	5	2	2	3
	中止者数	16	2	2	5	7
平成15年度	事業対象者数	663	662	661	657	652
	開始者数	6	5	1	0	0
	中止者数	20	2	4	5	9
平成16年度	事業対象者数	648	645	646	646	641
	開始者数	5	2	1	1	1
	中止者数	15	0	1	6	8
平成17年度	事業対象者数	634	633	628	625	620
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	18	5	3	6	4
平成18年度	事業対象者数	618	617	614	609	605
	開始者数	2	1	0	0	1
	中止者数	17	3	5	5	4
平成19年度	事業対象者数	603	601	598	593	586
	開始者数	2	0	0	1	1
	中止者数	18	3	6	8	1
平成20年度	事業対象者数	587	587	579	576	572
	開始者数	2	2	0	0	0
	中止者数	20	8	3	4	5
平成21年度	事業対象者数	567	567	566	564	561
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	8	1	2	3	2
平成22年度	事業対象者数	563	559	560	556	554
	開始者数	4	0	4	0	0
	中止者数	15	3	4	2	6
平成23年度	事業対象者数	548	548	547	546	543
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	1	1	3	2
平成24年度	事業対象者数	541	541	538	536	535
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	9	3	2	1	3
平成25年度	事業対象者数	534	532	532	529	529
	開始者数	2	0	1	0	1
	中止者数	9	1	3	1	4
平成26年度	事業対象者数	525	525	523	522	519
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	7	2	1	3	1
平成27年度	事業対象者数	520	520	519	517	515
	開始者数	1	1	0	0	0
	中止者数	7	1	2	2	2

表3-4-1. 臨床・日常生活・治療の現状の平成27年度集計における基礎資料の時点

基礎資料の報告状況	集計に用いた時点					
	第1期	第2期	第3期	第4期	なし	計
1. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量の報告あり	1	6	61	441	—	509
2. 抗HIV薬、CD4値の報告あり	0	0	0	1	—	1
3. 抗HIV薬、HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	2	—	2
4. 抗HIV薬の報告あり	0	0	0	1	—	1
5. CD4値、HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
6. CD4値の報告あり	0	0	0	0	—	0
7. HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
8. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量以外の報告あり	0	0	0	0	—	0
9. データなし	—	—	—	—	2	2
計	1	6	61	445	2	515

第4章 結果表

1. 臨床・日常生活・治療の現状

本節では、以下の表を示した。

表4-1-1.	基礎疾患	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-2.	性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布	
表4-1-3.	年齢別、CD4値	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-4.	年齢別、HIV-RNA量	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-5.	CD4値別、HIV-RNA量	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-6.	CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-7.	抗HIV薬の併用区分別、服用状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-8.	抗HIV薬の併用区分別、副作用	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-9.	抗HIV薬の併用薬剤	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-10.	抗HIV薬別、服用状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-11.	抗HIV薬別、副作用	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-12.	CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-13.	CD4値別、眼底検査	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-14.	CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-15.	年齢別、身体状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-16.	年齢別、日常生活動作	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-17.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-18.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-19.	CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-20.	CD4値別、身体状況の各項目	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-21.	抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-1-22.	疾患の有無	(平成27年度第4期事業対象者)

表4-1-1. 基礎疾患（平成27年度第4期事業対象者）

基礎疾患	人数	(%)
血友病A	370	(71.8)
血友病B	112	(21.7)
von Willebrand 病	3	(0.6)
二次感染	20	(3.9)
三次感染	2	(0.4)
その他	8	(1.6)
計	515	

表4-1-2. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（平成27年度第4期事業対象者）

		人数	(%)			人数	(%)
性別	男	489	(95.0)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	2	(0.4)
	女	26	(5.0)		0.10～0.50 未満	71	(15.0)
	計	515			0.50～1.00 未満	204	(43.0)
年齢	0～10 歳未満	1	(0.2)		1.00～1.50 未満	116	(24.5)
	10～20 歳未満	1	(0.2)		1.50 以上	81	(17.1)
	20～30 歳未満	2	(0.4)		不明	41	—
	30～40 歳未満	145	(28.2)		計	515	
	40～50 歳未満	242	(47.0)		平均値 0.977 (標準偏差 0.535) 中央値 0.850		
	50～60 歳未満	91	(17.7)	HIV-RNA 量	検出せず ^a	265	(51.7)
	60 歳以上	33	(6.4)		50 未満*	219	(42.7)
	計	515			50～400 未満	13	(2.5)
平均値 44.5 歳 (標準偏差 8.5 歳) 中央値 43.0 歳			400～1000 未満		5	(1.0)	
CD4 値	～200 未満	34	(6.7)		1000～5000 未満	5	(1.0)
	200～350 未満	84	(16.4)		5000～10000 未満	2	(0.4)
	350～500 未満	134	(26.2)		10000～50000 未満	3	(0.6)
	500 以上	259	(50.7)		50000 以上	1	(0.2)
	不明	4	—		不明	2	—
	計	515			計	515	
	平均値 535.3 (標準偏差 254.6) 中央値 504.0				中央値 検出せず ^a		

（ ）：計より不明を除いた数を分母とする％
*：検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表4-1-3. 年齢別、CD4値（平成27年度第4期事業対象者）

年齢	CD4 値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
20～30歳未満	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
30～40歳未満	8 (5.6)	21 (14.6)	36 (25.0)	79 (54.9)	1	145
40～50歳未満	16 (6.7)	35 (14.6)	72 (30.1)	116 (48.5)	3	242
50歳以上	9 (7.3)	27 (21.8)	26 (21.0)	62 (50.0)	0	124
計	34 (6.7)	84 (16.5)	134 (26.3)	257 (50.5)	4	513

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-4. 年齢別、HIV-RNA量（平成27年度第4期事業対象者）

年齢	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
20～30歳未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
30～40歳未満	136 (94.4)	3 (2.1)	1 (0.7)	1 (0.7)	3 (2.1)	1	145
40～50歳未満	226 (93.8)	7 (2.9)	3 (1.2)	4 (1.7)	1 (0.4)	1	242
50歳以上	119 (96.0)	3 (2.4)	1 (0.8)	1 (0.8)	0 (0.0)	0	124
計	482 (94.3)	13 (2.5)	5 (1.0)	7 (1.4)	4 (0.8)	2	513

対象：20歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-5. CD4値別、HIV-RNA量（平成27年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満†	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	28 (82.4)	3 (8.8)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	0	34
200～350未満	78 (92.9)	3 (3.6)	1 (1.2)	2 (2.4)	0 (0.0)	0	84
350～500未満	128 (95.5)	2 (1.5)	1 (0.7)	3 (2.2)	0 (0.0)	0	134
500以上	248 (95.8)	5 (1.9)	2 (0.8)	1 (0.4)	3 (1.2)	0	259
不明	2	0	0	0	0	2	4
計	484 (94.3)	13 (2.5)	5 (1.0)	7 (1.4)	4 (0.8)	2	515

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-6. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成27年度第4期事業対象者）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.7)	3 (10.7)	18 (64.3)	4 (14.3)	0	28
	50～400 未満†	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000 以上	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	2 (5.9)	4 (11.8)	3 (8.8)	21 (61.8)	4 (11.8)	0	34
200 ～350未満	50 未満*	1 (1.3)	2 (2.6)	7 (9.0)	7 (9.0)	54 (69.2)	7 (9.0)	0	78
	50～400 未満†	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (4.8)	2 (2.4)	7 (8.3)	7 (8.3)	57 (67.9)	7 (8.3)	0	84
350 ～500未満	50 未満*	2 (1.6)	2 (1.6)	13 (10.2)	14 (10.9)	93 (72.7)	4 (3.1)	0	128
	50～400 未満†	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000 未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5 (3.7)	3 (2.2)	14 (10.4)	14 (10.4)	94 (70.1)	4 (3.0)	0	134
500以上	50 未満*	3 (1.2)	2 (0.8)	31 (12.5)	31 (12.5)	160 (64.5)	21 (8.5)	0	248
	50～400 未満†	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0	5
	400～1000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	1000～10000 未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000 以上	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	8 (3.1)	3 (1.2)	31 (12.0)	33 (12.7)	162 (62.5)	22 (8.5)	0	259
不明	50 未満*	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	50～400 未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	2
	計	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4
計	50 未満*	7 (1.4)	6 (1.2)	54 (11.2)	55 (11.4)	326 (67.4)	36 (7.4)	0	484
	50～400 未満†	5 (38.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.4)	4 (30.8)	0 (0.0)	0	13
	400～1000 未満	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0	5
	1000～10000 未満	3 (42.9)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0	7
	10000 以上	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	2
	計	18 (3.5)	10 (1.9)	57 (11.1)	57 (11.1)	335 (65.2)	37 (7.2)	1	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（平成27年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	55 (96.5)	2 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	57
NRTI 2剤+NNRTI	57 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	57
INSTI	326 (97.3)	7 (2.1)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.3)	0	335
その他	36 (97.3)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	37
計	474 (97.5)	10 (2.1)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.2)	0	486

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成27年度第4期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	12 (21.4)	44 (78.6)	1	57
NRTI 2剤+NNRTI	4 (7.0)	53 (93.0)	0	57
INSTI	43 (13.0)	287 (87.0)	5	335
その他	6 (16.2)	31 (83.8)	0	37
計	65 (13.5)	415 (86.5)	6	486

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (1.8)	3 (5.3)	1 (1.8)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	7 (2.1)	8 (2.4)	2 (0.6)	3 (0.9)	3 (0.9)	2 (0.6)
その他	1 (2.7)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)
計	9 (1.9)	12 (2.5)	3 (0.6)	4 (0.8)	4 (0.8)	2 (0.4)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (5.3)	3 (5.3)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.5)	2 (3.5)	0 (0.0)	1 (1.8)
INSTI	4 (1.2)	2 (0.6)	7 (2.1)	25 (7.5)	0 (0.0)	8 (2.4)
その他	0 (0.0)	1 (2.7)	1 (2.7)	1 (2.7)	1 (2.7)	1 (2.7)
計	6 (1.2)	3 (0.6)	10 (2.1)	31 (6.4)	4 (0.8)	10 (2.1)

(): 投与者数より不明を除いた数にしろる%

表4-1-9. 抗HIV薬の併用薬剤（平成27年度第4期事業対象者）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	NRTI 2 剤+NNRTI（続き）	件数
TDF+FTC +RTV+DRV （ツルバダ服用 13 例）	13 (22.8)	3TC+ABC +RPV （エブジコム服用 4 例）	4 (7.0)
3TC+ABC +RTV+DRV （エブジコム服用 7 例）	8 (14.0)	3TC+ABC +NVP （エブジコム服用 3 例）	3 (5.3)
3TC+ABC +RTV+LPV （エブジコム服用 2 例）	4 (7.0)	3TC+TDF +EFV	2 (3.5)
AZT+3TC +NFV	3 (5.3)	AZT+3TC +EFV	2 (3.5)
TDF+FTC +ATV （ツルバダ服用 3 例）	3 (5.3)	3TC+ABC +ETR （エブジコム服用 1 例）	1 (1.8)
TDF+FTC +RTV+ATV （ツルバダ服用 3 例）	3 (5.3)	3TC+TDF +ETR	1 (1.8)
TDF+FTC +RTV+LPV （ツルバダ服用 3 例）	3 (5.3)	AZT+3TC +NVP （コンビビル服用 1 例）	1 (1.8)
3TC+ABC +RTV+FPV （エブジコム服用 2 例）	2 (3.5)	AZT+3TC +RPV （コンビビル服用 1 例）	1 (1.8)
AZT+3TC +ATV （コンビビル服用 1 例）	2 (3.5)	計（11 通り）	57 (100.0)
AZT+3TC +RTV+LPV （コンビビル服用 1 例）	2 (3.5)	INSTI	件数
3TC+ABC +ATV （エブジコム服用 1 例）	1 (1.8)	TDF+FTC +RAL （ツルバダ服用 71 例）	72 (21.5)
3TC+ABC +DRV （エブジコム服用 1 例）	1 (1.8)	TDF+FTC +DTG （ツルバダ服用 54 例）	54 (16.1)
3TC+ABC +RTV+ATV （エブジコム服用 1 例）	1 (1.8)	3TC+ABC +DTG （エブジコム服用 50 例）	52 (15.5)
3TC+ABC +SQV+RTV （エブジコム服用 1 例）	1 (1.8)	3TC+ABC +RAL （エブジコム服用 39 例）	48 (14.3)
3TC+TDF +RTV+FPV	1 (1.8)	TDF+FTC +EVG+COBI （スタリビルド）	11 (3.3)
3TC+TDF +RTV+LPV	1 (1.8)	ETR +RAL	7 (2.1)
3TC+d4T +NFV	1 (1.8)	RTV+DRV +RAL	6 (1.8)
ABC+TDF +RTV+LPV	1 (1.8)	RPV +DTG	4 (1.2)
AZT+3TC +FPV	1 (1.8)	TDF+FTC +RPV +DTG （ツルバダ服用 4 例）	4 (1.2)
AZT+3TC +RTV	1 (1.8)	3TC +ETR +RAL	3 (0.9)
AZT+3TC +RTV+FPV	1 (1.8)	3TC +RTV+DRV +RAL	3 (0.9)
TDF+FTC +DRV （ツルバダ服用 1 例）	1 (1.8)	3TC+ABC +ETR +RAL （エブジコム服用 3 例）	3 (0.9)
TDF+FTC +FPV （ツルバダ服用 1 例）	1 (1.8)	3TC+ABC +RTV+DRV +RAL （エブジコム服用 3 例）	3 (0.9)
ddl+ABC +RTV+LPV	1 (1.8)	ABC+TDF +DTG	3 (0.9)
計（24 通り）	57 (100.0)	RTV+DRV +DTG	3 (0.9)
NRTI 2 剤+NNRTI	件数	RTV+DRV +ETR +RAL	3 (0.9)
TDF+FTC +EFV （ツルバダ服用 21 例）	23 (40.4)	TDF +ETR +RAL	3 (0.9)
TDF+FTC +RPV （ツルバダ服用 13 例）	13 (22.8)	TDF+FTC +ETR +RAL （ツルバダ服用 3 例）	3 (0.9)
3TC+ABC +EFV （エブジコム服用 5 例）	6 (10.5)	3TC+TDF +RAL	2 (0.6)
	(右上へ続く)	ABC+TDF +RAL	2 (0.6)
		AZT+3TC +RAL	2 (0.6)
		RPV +RAL	2 (0.6)
		RTV+LPV +RAL	2 (0.6)
			(次ページへ続く)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-9 (続き)。抗HIV薬の併用薬剤 (平成27年度第4期事業対象者)

INSTI (続き)	件数	INSTI (続き)	件数
TDF +RAL	2 (0.6)	TDF+FTC +RTV+FPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)
TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 2例)	2 (0.6)	TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)
3TC +RPV +DTG	1 (0.3)	計 (24 通り)	335 (100.0)
3TC+ABC +RAL +MVC (エブリコム服用 1例)	1 (0.3)	その他	件数
3TC+d4T +RAL	1 (0.3)	AZT+3TC (コンビビル服用 1例)	5 (13.5)
ABC +EFV +RAL	1 (0.3)	TDF+FTC (ツルバダ服用 1例)	2 (5.4)
ABC +RAL	1 (0.3)	AZT+d4T	1 (2.7)
ABC +RPV +RAL	1 (0.3)	RTV+DRV +MVC	2 (5.4)
ABC+FTC +RAL	1 (0.3)	3TC +RTV+DRV +MVC	1 (2.7)
AZT+3TC +DTG	1 (0.3)	ABC+TDF +RPV +MVC	1 (2.7)
AZT+3TC +ETR +RAL	1 (0.3)	TDF+FTC +ETR +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (2.7)
AZT+3TC+ABC +RAL (コンビビル服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (2.7)
AZT+ddI+3TC +SQV +DTG +MVC (コンビビル服用 1例)	1 (0.3)	3TC +NFV	3 (8.1)
DRV +RPV +RAL	1 (0.3)	TDF+FTC +DRV +RPV (ツルバダ服用 2例)	2 (5.4)
DTG +MVC	1 (0.3)	3TC +RTV +ETR	1 (2.7)
ETR +RAL +MVC	1 (0.3)	3TC +RTV+DRV	1 (2.7)
FPV +DTG	1 (0.3)	3TC+ABC +DRV +RPV (エブリコム服用 1例)	1 (2.7)
FTC +RAL	1 (0.3)	3TC+ABC +RTV+DRV +ETR (エブリコム服用 1例)	1 (2.7)
FTC +RPV +RAL	1 (0.3)	3TC+ABC +RTV+LPV +EFV (エブリコム服用 1例)	1 (2.7)
RAL	1 (0.3)	ABC +EFV	1 (2.7)
RAL +MVC	1 (0.3)	ABC +RTV+LPV	1 (2.7)
RPV +RAL +MVC	1 (0.3)	AZT+3TC +RTV+LPV +ETR (コンビビル服用 1例)	1 (2.7)
RTV+DRV +DTG +MVC	1 (0.3)	AZT+3TC+TDF +RTV+LPV (コンビビル服用 1例)	1 (2.7)
RTV+DRV +EFV +RAL	1 (0.3)	RTV+DRV +ETR	1 (2.7)
RTV+DRV +RPV +RAL	1 (0.3)	RTV+DRV +RPV	1 (2.7)
RTV+LPV +DTG	1 (0.3)	TDF +RTV+ATV +RPV	1 (2.7)
SQV+RTV +RAL	1 (0.3)	TDF +RTV+LPV+DRV	1 (2.7)
TDF +RTV+ATV +RAL	1 (0.3)	TDF+FTC +NFV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.7)
TDF+FTC +DRV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +RTV+FPV +EFV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.7)
TDF+FTC +EFV +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	TDF+FTC +RTV+LPV+DRV (ツルバダ服用 1例)	1 (2.7)
TDF+FTC +EFV+RPV +DTG (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	d4T +RTV+LPV +NVP	1 (2.7)
TDF+FTC +ETR +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	d4T +SQV+RTV	1 (2.7)
TDF+FTC +RTV +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)	計 (33 通り)	37 (100.0)
TDF+FTC +RTV+DRV +ETR +RAL (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)		
TDF+FTC +RTV+DRV +RAL +MVC (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)		
TDF+FTC +RTV+DRV +RPV +DTG (ツルバダ服用 1例)	1 (0.3)		

(右上へ続く)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-10. 抗HIV薬別、服用状況（平成27年度第4期事業対象者）

抗HIV薬	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
AZT	19 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	19
ddl	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
3TC	54 (98.2)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	55
d4T	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
AZT/3TC	8 (88.9)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
ABC	30 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	30
TDF	26 (96.3)	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	27
3TC/ABC	125 (98.4)	2 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	127
FTC	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7
TDF/FTC	207 (97.2)	5 (2.3)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	213
SQV	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
RTV	71 (98.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	72
NFV	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
LPV	22 (95.7)	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	23
ATV	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	12
FPV	9 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
DRV	62 (98.4)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	63
NVP	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
EFV	41 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	41
ETR	33 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	33
RPV	41 (97.6)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	42
RAL	192 (98.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)	0	195
STB	10 (90.9)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11
DTG	124 (96.1)	5 (3.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	129
MVC	15 (93.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	0	16

（ ）：各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-11. 抗HIV薬別、副作用（平成27年度第4期事業対象者）

抗HIV薬	副作用			投与者数	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
AZT	4 (21.1)	15 (78.9)	0	19	0 (0.0)	2 (10.5)	1 (5.3)	1 (5.3)
ddl	0 (0.0)	2 (100.0)	0	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	13 (23.6)	42 (76.4)	0	55	1 (1.8)	4 (7.3)	1 (1.8)	1 (1.8)
d4T	2 (40.0)	3 (60.0)	0	5	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	2 (22.2)	7 (77.8)	0	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	5 (17.2)	24 (82.8)	1	30	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)
TDF	4 (15.4)	22 (84.6)	1	27	1 (3.8)	1 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC/ABC	15 (12.1)	109 (87.9)	3	127	4 (3.2)	3 (2.4)	0 (0.0)	1 (0.8)
FTC	0 (0.0)	7 (100.0)	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	17 (8.0)	195 (92.0)	1	213	1 (0.5)	2 (0.9)	2 (0.9)	0 (0.0)
SQV	0 (0.0)	4 (100.0)	0	4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	17 (23.9)	54 (76.1)	1	72	1 (1.4)	1 (1.4)	0 (0.0)	1 (1.4)
NFV	3 (37.5)	5 (62.5)	0	8	0 (0.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)
LPV	6 (26.1)	17 (73.9)	0	23	0 (0.0)	3 (13.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ATV	5 (41.7)	7 (58.3)	0	12	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
FPV	1 (12.5)	7 (87.5)	1	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)
DRV	14 (22.6)	48 (77.4)	1	63	1 (1.6)	2 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
NVP	1 (20.0)	4 (80.0)	0	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EFV	2 (4.9)	39 (95.1)	0	41	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ETR	5 (15.2)	28 (84.8)	0	33	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV	12 (28.6)	30 (71.4)	0	42	2 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.4)
RAL	24 (12.5)	168 (87.5)	3	195	3 (1.6)	4 (2.1)	2 (1.0)	2 (1.0)
STB	1 (9.1)	10 (90.9)	0	11	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DTG	18 (14.2)	109 (85.8)	2	129	4 (3.1)	4 (3.1)	0 (0.0)	1 (0.8)
MVC	4 (25.0)	12 (75.0)	0	16	3 (18.8)	1 (6.3)	0 (0.0)	2 (12.5)

抗HIV薬	副作用（項目別）							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
AZT	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ddl	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	0 (0.0)	1 (1.8)	2 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (12.7)	0 (0.0)	3 (5.5)
d4T	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)
ABC	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)	1 (3.4)	4 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	1 (3.8)	1 (3.8)	1 (3.8)	0 (0.0)
3TC/ABC	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	5 (4.0)	1 (0.8)	2 (1.6)
FTC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	1 (0.5)	0 (0.0)	2 (0.9)	0 (0.0)	3 (1.4)	12 (5.7)	1 (0.5)	1 (0.5)
SQV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (14.1)	3 (4.2)	2 (2.8)
NFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.3)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.3)
ATV	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	4 (33.3)	0 (0.0)
FPV	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (16.1)	0 (0.0)	2 (3.2)
NVP	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	1 (2.4)	0 (0.0)	1 (2.4)
ETR	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (15.2)	0 (0.0)	1 (3.0)
RPV	2 (4.8)	1 (2.4)	0 (0.0)	1 (2.4)	4 (9.5)	5 (11.9)	1 (2.4)	2 (4.8)
RAL	2 (1.0)	2 (1.0)	3 (1.6)	0 (0.0)	2 (1.0)	18 (9.4)	0 (0.0)	5 (2.6)
STB	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
DTG	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	5 (45.5)	6 (54.5)	0 (0.0)	3 (27.3)
MVC	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	2 (12.5)	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)	2 (12.5)

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-12. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬（平成27年度第4期事業対象者）

CD4 値	ニューモシスチス肺炎予防薬						計
	あり	ニューモシスチス肺炎予防薬の種類			なし	不明	
		ST 合剤	ペンタミジン吸入	ペンタミジン点滴			
～200未満	14 (42.4)	11 (33.3)	1 (3.0)	2 (6.1)	19 (57.6)	1	34
200～350未満	2 (2.4)	2 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	80 (97.6)	2	84
350～500未満	3 (2.3)	2 (1.5)	1 (0.8)	0 (0.0)	128 (97.7)	3	134
500以上	4 (1.6)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	252 (98.4)	3	259
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	1	4
計	23 (4.6)	17 (3.4)	3 (0.6)	3 (0.6)	482 (95.4)	10	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-13. CD4値別、眼底検査（平成27年度第4期事業対象者）

CD4 値	眼底検査			計
	あり	なし	不明	
～200未満	2 (5.9)	32 (94.1)	0	34
200～350未満	2 (2.4)	82 (97.6)	0	84
350～500未満	4 (3.0)	128 (97.0)	2	134
500以上	4 (1.6)	253 (98.4)	2	259
不明	0 (0.0)	3 (100.0)	1	4
計	12 (2.4)	498 (97.6)	5	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-14. CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量（平成27年度第4期事業対象者）

	CD4 値	人 数	平 均	標準偏差
体重*	～200 未満	33	60.7	10.5
	200～350 未満	77	60.7	8.8
	350～500 未満	126	61.9	13.4
	500 以上	244	62.1	10.5
	不明	3	57.3	4.7
	全体	483	61.7	11.0
身体状況の総合スコア	～200 未満	33	3.0	0.7
	200～350 未満	82	2.6	0.9
	350～500 未満	130	2.6	0.8
	500 以上	251	2.5	0.9
	不明	3	2.9	0.6
	全体	499	2.6	0.9
日常生活動作	～200 未満	31	3.6	1.6
	200～350 未満	84	2.7	1.5
	350～500 未満	128	2.6	1.1
	500 以上	254	2.6	1.5
	不明	2	2.0	0.0
	全体	499	2.7	1.5

* 体重の集計対象：20 歳以上男性

表4-1-15. 年齢別、身体状況の総合スコア（平成27年度第4期事業対象者）

年齢	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
20～30 歳未満	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)
30～40 歳未満	50 (35.0)	46 (32.2)	45 (31.5)	2 (1.4)	2	145	96 (67.1)
40～50 歳未満	62 (26.8)	73 (31.6)	88 (38.1)	8 (3.5)	11	242	135 (58.4)
50 歳以上	25 (20.8)	47 (39.2)	46 (38.3)	2 (1.7)	4	124	72 (60.0)
計	137 (27.6)	168 (33.9)	179 (36.1)	12 (2.4)	17	513	305 (61.5)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-16. 年齢別、日常生活動作（平成27年度第4期事業対象者）

年齢	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
20～30 歳未満	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)
30～40 歳未満	36 (26.1)	38 (27.5)	38 (27.5)	26 (18.8)	7	145	74 (53.6)
40～50 歳未満	60 (25.3)	69 (29.1)	59 (24.9)	49 (20.7)	5	242	129 (54.4)
50 歳以上	20 (16.7)	24 (20.0)	33 (27.5)	43 (35.8)	4	124	44 (36.7)
計	117 (23.5)	131 (26.4)	131 (26.4)	118 (23.7)	16	513	248 (49.9)

対象：20 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-17. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重（平成27年度第4期事業対象者）

CD4値	抗HIV薬の併用区分	体重							計
		～40未満	40～ 50未満	50～ 60未満	60～ 70未満	70～ 80未満	80以上	不明	
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0	—	0	—	0	—	0	0
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	INSTI	0 (0.0)	2 (10.0)	8 (40.0)	5 (25.0)	4 (20.0)	1 (5.0)	0	20
	その他	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0	4
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	0 (0.0)	5 (15.2)	10 (30.3)	10 (30.3)	7 (21.2)	1 (3.0)	0	33
200 ～350未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0	4
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (50.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0	6
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
	INSTI	1 (1.9)	4 (7.5)	19 (35.8)	22 (41.5)	6 (11.3)	1 (1.9)	1	54
	その他	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	0	7
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	1 (1.3)	6 (7.8)	28 (36.4)	31 (40.3)	9 (11.7)	2 (2.6)	2	79
350 ～500未満	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (7.7)	9 (69.2)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	0	13
	NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (30.8)	7 (53.8)	1 (7.7)	1 (7.7)	0	13
	INSTI	0 (0.0)	8 (8.9)	36 (40.0)	28 (31.1)	14 (15.6)	4 (4.4)	1	91
	その他	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0	4
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	0 (0.0)	9 (7.1)	54 (42.9)	41 (32.5)	16 (12.7)	6 (4.8)	1	127
500以上	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	4 (50.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	0	8
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	5 (16.7)	12 (40.0)	7 (23.3)	6 (20.0)	0 (0.0)	0	30
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (3.2)	1 (3.2)	10 (32.3)	14 (45.2)	3 (9.7)	2 (6.5)	0	31
	INSTI	0 (0.0)	14 (9.2)	48 (31.4)	59 (38.6)	24 (15.7)	8 (5.2)	1	154
	その他	0 (0.0)	3 (15.8)	5 (26.3)	8 (42.1)	3 (15.8)	0 (0.0)	1	20
	不明	0	—	0	—	0	—	0	0
	計	1 (0.4)	23 (9.4)	78 (32.0)	93 (38.1)	38 (15.6)	11 (4.5)	2	246
不明	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	投与なし（投与歴あり）	0	—	0	—	0	—	0	0
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	NRTI 2剤+NNRTI	0	—	0	—	0	—	0	0
	INSTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	その他	0	—	0	—	0	—	0	0
	不明	0	—	0	—	0	—	1	1
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	4
計	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (44.4)	6 (33.3)	3 (16.7)	1 (5.6)	0	18
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (50.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0	8
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	8 (14.8)	25 (46.3)	12 (22.2)	8 (14.8)	1 (1.9)	0	54
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (1.9)	3 (5.8)	16 (30.8)	25 (48.1)	4 (7.7)	3 (5.8)	1	53
	INSTI	1 (0.3)	28 (8.8)	111 (35.0)	115 (36.3)	48 (15.1)	14 (4.4)	3	320
	その他	0 (0.0)	4 (11.8)	8 (23.5)	15 (44.1)	6 (17.6)	1 (2.9)	1	35
	不明	0	—	0	—	0	—	1	1
	計	2 (0.4)	43 (8.9)	172 (35.6)	176 (36.4)	70 (14.5)	20 (4.1)	6	489

対象：20歳以上男性

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-18. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況（平成27年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)	
		1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明			
～200 未満	投与なし（投与歴なし）	0	－	0	－	0	0	0	－
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2	1 (50.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0	4	1 (25.0)	
	NRTI 2剤+NNRTI	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)	
	INSTI	1 (5.0)	12 (60.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	1	21	13 (65.0)	
	その他	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	0	4	0 (0.0)	
	不明	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	2 (6.1)	15 (45.5)	14 (42.4)	2 (6.1)	1	34	17 (51.5)	
200 ～350 未満	投与なし（投与歴なし）	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4	4 (100.0)	
	投与なし（投与歴あり）	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2	2 (100.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	0	7	5 (71.4)	
	NRTI 2剤+NNRTI	3 (50.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	1 (16.7)	1	7	3 (50.0)	
	INSTI	15 (26.8)	16 (28.6)	24 (42.9)	1 (1.8)	1	57	31 (55.4)	
	その他	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	0	7	5 (71.4)	
	不明	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	25 (30.5)	25 (30.5)	30 (36.6)	2 (2.4)	2	84	50 (61.0)	
350 ～500 未満	投与なし（投与歴なし）	2 (40.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5	5 (100.0)	
	投与なし（投与歴あり）	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0	3	0 (0.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (14.3)	4 (28.6)	8 (57.1)	0 (0.0)	0	14	6 (42.9)	
	NRTI 2剤+NNRTI	6 (42.9)	4 (28.6)	4 (28.6)	0 (0.0)	0	14	10 (71.4)	
	INSTI	22 (24.4)	37 (41.1)	29 (32.2)	2 (2.2)	4	94	59 (65.6)	
	その他	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	0	4	0 (0.0)	
	不明	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	32 (24.6)	48 (36.9)	48 (36.9)	2 (1.5)	4	134	80 (61.5)	
500 以上	投与なし（投与歴なし）	5 (62.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0	8	7 (87.5)	
	投与なし（投与歴あり）	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0	3	2 (66.7)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	6 (19.4)	9 (29.0)	16 (51.6)	0 (0.0)	0	31	15 (48.4)	
	NRTI 2剤+NNRTI	6 (18.2)	14 (42.4)	13 (39.4)	0 (0.0)	0	33	20 (60.6)	
	INSTI	54 (35.3)	47 (30.7)	48 (31.4)	4 (2.6)	9	162	101 (66.0)	
	その他	6 (27.3)	8 (36.4)	7 (31.8)	1 (4.5)	0	22	14 (63.6)	
	不明	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	78 (31.2)	81 (32.4)	85 (34.0)	6 (2.4)	9	259	159 (63.6)	
不明	投与なし（投与歴なし）	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)	
	投与なし（投与歴あり）	0	－	0	－	0	0	0	－
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1	0 (0.0)	
	NRTI 2剤+NNRTI	0	－	0	－	0	0	0	－
	INSTI	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1	1 (100.0)	
	その他	0	－	0	－	0	0	0	－
	不明	0	－	0	－	1	1	0	－
	計	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	1	4	1 (33.3)	
計	投与なし（投与歴なし）	8 (44.4)	8 (44.4)	1 (5.6)	1 (5.6)	0	18	16 (88.9)	
	投与なし（投与歴あり）	2 (20.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	0 (0.0)	0	10	5 (50.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	10 (17.5)	17 (29.8)	30 (52.6)	0 (0.0)	0	57	27 (47.4)	
	NRTI 2剤+NNRTI	16 (28.6)	19 (33.9)	20 (35.7)	1 (1.8)	1	57	35 (62.5)	
	INSTI	92 (28.8)	113 (35.3)	106 (33.1)	9 (2.8)	15	335	205 (64.1)	
	その他	9 (24.3)	10 (27.0)	17 (45.9)	1 (2.7)	0	37	19 (51.4)	
	不明	0	－	0	－	1	1	0	－
	計	137 (27.5)	170 (34.1)	179 (35.9)	12 (2.4)	17	515	307 (61.6)	

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-19. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作（平成27年度第4期事業対象者）

CD4 値	抗 HIV 薬の併用区分	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)					
		1	2	3	4 (4～8)	不明							
～200未満	投与なし（投与歴なし）	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－		
	投与なし（投与歴あり）	0	(0.0)	1	(50.0)	1	(50.0)	0	(0.0)	0	2	1 (50.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)	2	(66.7)	1	4	0 (0.0)	
	NRTI 2剤+NNRTI	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)	2	(66.7)	0	3	0 (0.0)	
	INSTI	2	(10.5)	3	(15.8)	5	(26.3)	9	(47.4)	2	21	5 (26.3)	
	その他	0	(0.0)	1	(25.0)	2	(50.0)	1	(25.0)	0	4	1 (25.0)	
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	2	(6.5)	5	(16.1)	10	(32.3)	14	(45.2)	3	34	7 (22.6)	
200 ～350未満	投与なし（投与歴なし）	1	(25.0)	1	(25.0)	1	(25.0)	1	(25.0)	0	4	2 (50.0)	
	投与なし（投与歴あり）	0	(0.0)	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	2	2 (100.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	4	(57.1)	1	(14.3)	0	(0.0)	2	(28.6)	0	7	5 (71.4)	
	NRTI 2剤+NNRTI	0	(0.0)	2	(28.6)	1	(14.3)	4	(57.1)	0	7	2 (28.6)	
	INSTI	15	(26.3)	12	(21.1)	18	(31.6)	12	(21.1)	0	57	27 (47.4)	
	その他	2	(28.6)	0	(0.0)	2	(28.6)	3	(42.9)	0	7	2 (28.6)	
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	22	(26.2)	18	(21.4)	22	(26.2)	22	(26.2)	0	84	40 (47.6)	
350 ～500未満	投与なし（投与歴なし）	2	(40.0)	2	(40.0)	0	(0.0)	1	(20.0)	0	5	4 (80.0)	
	投与なし（投与歴あり）	0	(0.0)	2	(66.7)	1	(33.3)	0	(0.0)	0	3	2 (66.7)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	3	(21.4)	1	(7.1)	9	(64.3)	1	(7.1)	0	14	4 (28.6)	
	NRTI 2剤+NNRTI	1	(7.7)	8	(61.5)	1	(7.7)	3	(23.1)	1	14	9 (69.2)	
	INSTI	18	(20.0)	25	(27.8)	28	(31.1)	19	(21.1)	4	94	43 (47.8)	
	その他	0	(0.0)	1	(33.3)	2	(66.7)	0	(0.0)	1	4	1 (33.3)	
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	24	(18.8)	39	(30.5)	41	(32.0)	24	(18.8)	6	134	63 (49.2)	
500以上	投与なし（投与歴なし）	4	(50.0)	1	(12.5)	1	(12.5)	2	(25.0)	0	8	5 (62.5)	
	投与なし（投与歴あり）	2	(66.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)	0	3	2 (66.7)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	5	(16.7)	13	(43.3)	7	(23.3)	5	(16.7)	1	31	18 (60.0)	
	NRTI 2剤+NNRTI	9	(27.3)	9	(27.3)	7	(21.2)	8	(24.2)	0	33	18 (54.5)	
	INSTI	44	(27.8)	36	(22.8)	38	(24.1)	40	(25.3)	4	162	80 (50.6)	
	その他	5	(22.7)	10	(45.5)	5	(22.7)	2	(9.1)	0	22	15 (68.2)	
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	計	69	(27.2)	69	(27.2)	58	(22.8)	58	(22.8)	5	259	138 (54.3)	
不明	投与なし（投与歴なし）	0	－	0	－	0	－	0	－	1	1	0	－
	投与なし（投与歴あり）	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	(0.0)	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	1	1 (100.0)	
	NRTI 2剤+NNRTI	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	INSTI	0	(0.0)	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	1	1 (100.0)	
	その他	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0	0	－
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	1	1	0	－
	計	0	(0.0)	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	4	2 (100.0)	
計	投与なし（投与歴なし）	7	(41.2)	4	(23.5)	2	(11.8)	4	(23.5)	1	18	11 (64.7)	
	投与なし（投与歴あり）	2	(20.0)	5	(50.0)	2	(20.0)	1	(10.0)	0	10	7 (70.0)	
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	12	(21.8)	16	(29.1)	17	(30.9)	10	(18.2)	2	57	28 (50.9)	
	NRTI 2剤+NNRTI	10	(17.9)	19	(33.9)	10	(17.9)	17	(30.4)	1	57	29 (51.8)	
	INSTI	79	(24.3)	77	(23.7)	89	(27.4)	80	(24.6)	10	335	156 (48.0)	
	その他	7	(19.4)	12	(33.3)	11	(30.6)	6	(16.7)	1	37	19 (52.8)	
	不明	0	－	0	－	0	－	0	－	1	1	0	－
	計	117	(23.4)	133	(26.7)	131	(26.3)	118	(23.6)	16	515	250 (50.1)	

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20. CD4値別、身体状況の各項目（平成27年度第4期事業対象者）

身体状況の項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	～200未満	6 (17.6)	12 (35.3)	11 (32.4)	4 (11.8)	1 (2.9)	0	34	18 (52.9)
	200～350未満	23 (27.4)	29 (34.5)	21 (25.0)	11 (13.1)	0 (0.0)	0	84	52 (61.9)
	350～500未満	54 (40.6)	44 (33.1)	31 (23.3)	4 (3.0)	0 (0.0)	1	134	98 (73.7)
	500以上	99 (38.4)	87 (33.7)	53 (20.5)	17 (6.6)	2 (0.8)	1	259	186 (72.1)
	不明	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	4	1 (33.3)
	計	183 (35.7)	172 (33.6)	118 (23.0)	36 (7.0)	3 (0.6)	3	515	355 (69.3)
味覚	～200未満	12 (35.3)	6 (17.6)	12 (35.3)	4 (11.8)	0 (0.0)	0	34	18 (52.9)
	200～350未満	38 (45.2)	16 (19.0)	20 (23.8)	8 (9.5)	2 (2.4)	0	84	54 (64.3)
	350～500未満	68 (51.5)	22 (16.7)	32 (24.2)	8 (6.1)	2 (1.5)	2	134	90 (68.2)
	500以上	119 (46.3)	50 (19.5)	65 (25.3)	18 (7.0)	5 (1.9)	2	259	169 (65.8)
	不明	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	1 (33.3)
	計	238 (46.7)	94 (18.4)	130 (25.5)	39 (7.6)	9 (1.8)	5	515	332 (65.1)
口乾	～200未満	4 (11.8)	3 (8.8)	9 (26.5)	12 (35.3)	6 (17.6)	0	34	7 (20.6)
	200～350未満	19 (22.6)	15 (17.9)	20 (23.8)	22 (26.2)	8 (9.5)	0	84	34 (40.5)
	350～500未満	37 (27.6)	19 (14.2)	36 (26.9)	25 (18.7)	17 (12.7)	0	134	56 (41.8)
	500以上	66 (25.7)	49 (19.1)	65 (25.3)	58 (22.6)	19 (7.4)	2	259	115 (44.7)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	1	4	0 (0.0)
	計	126 (24.6)	86 (16.8)	132 (25.8)	117 (22.9)	51 (10.0)	3	515	212 (41.4)
口内炎・ 口の中の痛み	～200未満	8 (24.2)	7 (21.2)	6 (18.2)	8 (24.2)	4 (12.1)	1	34	15 (45.5)
	200～350未満	35 (41.7)	8 (9.5)	19 (22.6)	19 (22.6)	3 (3.6)	0	84	43 (51.2)
	350～500未満	48 (35.8)	24 (17.9)	30 (22.4)	22 (16.4)	10 (7.5)	0	134	72 (53.7)
	500以上	100 (38.8)	42 (16.3)	64 (24.8)	44 (17.1)	8 (3.1)	1	259	142 (55.0)
	不明	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	2 (66.7)
	計	192 (37.5)	82 (16.0)	119 (23.2)	94 (18.4)	25 (4.9)	3	515	274 (53.5)
下痢	～200未満	6 (17.6)	8 (23.5)	11 (32.4)	7 (20.6)	2 (5.9)	0	34	14 (41.2)
	200～350未満	18 (21.7)	17 (20.5)	17 (20.5)	27 (32.5)	4 (4.8)	1	84	35 (42.2)
	350～500未満	26 (19.4)	30 (22.4)	33 (24.6)	32 (23.9)	13 (9.7)	0	134	56 (41.8)
	500以上	54 (20.9)	52 (20.2)	67 (26.0)	61 (23.6)	24 (9.3)	1	259	106 (41.1)
	不明	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	2 (66.7)
	計	104 (20.3)	109 (21.3)	128 (25.0)	128 (25.0)	43 (8.4)	3	515	213 (41.6)
体重減少	～200未満	9 (26.5)	8 (23.5)	9 (26.5)	5 (14.7)	3 (8.8)	0	34	17 (50.0)
	200～350未満	29 (34.9)	13 (15.7)	31 (37.3)	10 (12.0)	0 (0.0)	1	84	42 (50.6)
	350～500未満	54 (41.2)	33 (25.2)	38 (29.0)	5 (3.8)	1 (0.8)	3	134	87 (66.4)
	500以上	97 (37.6)	51 (19.8)	81 (31.4)	21 (8.1)	8 (3.1)	1	259	148 (57.4)
	不明	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	4	2 (66.7)
	計	190 (37.3)	106 (20.8)	160 (31.4)	41 (8.1)	12 (2.4)	6	515	296 (58.2)
息切れ	～200未満	2 (5.9)	3 (8.8)	8 (23.5)	15 (44.1)	6 (17.6)	0	34	5 (14.7)
	200～350未満	14 (16.7)	14 (16.7)	24 (28.6)	18 (21.4)	14 (16.7)	0	84	28 (33.3)
	350～500未満	20 (14.9)	15 (11.2)	35 (26.1)	38 (28.4)	26 (19.4)	0	134	35 (26.1)
	500以上	59 (23.0)	40 (15.6)	62 (24.2)	58 (22.7)	37 (14.5)	3	259	99 (38.7)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	0 (0.0)
	計	95 (18.6)	72 (14.1)	131 (25.6)	130 (25.4)	83 (16.2)	4	515	167 (32.7)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20 (続き). CD4値別、身体状況の各項目 (平成27年度第4期事業対象者)

身体状況の 項目	CD4 値	項目のスコア						計	1 および 2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	～200未満	0 (0.0)	2 (5.9)	8 (23.5)	15 (44.1)	9 (26.5)	0	34	2 (5.9)
	200～350未満	12 (14.3)	7 (8.3)	17 (20.2)	23 (27.4)	25 (29.8)	0	84	19 (22.6)
	350～500未満	12 (9.0)	16 (12.0)	24 (18.0)	50 (37.6)	31 (23.3)	1	134	28 (21.1)
	500以上	32 (12.5)	33 (12.8)	60 (23.3)	70 (27.2)	62 (24.1)	2	259	65 (25.3)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	0 (0.0)
	計	56 (11.0)	58 (11.4)	111 (21.7)	159 (31.1)	127 (24.9)	4	515	114 (22.3)
手足のしびれ・ 痛み	～200未満	3 (8.8)	5 (14.7)	12 (35.3)	11 (32.4)	3 (8.8)	0	34	8 (23.5)
	200～350未満	31 (36.9)	6 (7.1)	16 (19.0)	25 (29.8)	6 (7.1)	0	84	37 (44.0)
	350～500未満	32 (23.9)	25 (18.7)	29 (21.6)	33 (24.6)	15 (11.2)	0	134	57 (42.5)
	500以上	79 (30.6)	23 (8.9)	54 (20.9)	66 (25.6)	36 (14.0)	1	259	102 (39.5)
	不明	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1	4	1 (33.3)
	計	145 (28.3)	60 (11.7)	111 (21.6)	137 (26.7)	60 (11.7)	2	515	205 (40.0)
37℃以上の 発熱	～200未満	5 (14.7)	8 (23.5)	13 (38.2)	8 (23.5)	0 (0.0)	0	34	13 (38.2)
	200～350未満	35 (41.7)	19 (22.6)	15 (17.9)	14 (16.7)	1 (1.2)	0	84	54 (64.3)
	350～500未満	49 (36.6)	36 (26.9)	30 (22.4)	16 (11.9)	3 (2.2)	0	134	85 (63.4)
	500以上	110 (42.8)	51 (19.8)	66 (25.7)	23 (8.9)	7 (2.7)	2	259	161 (62.6)
	不明	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	2 (66.7)
	計	199 (38.9)	116 (22.7)	124 (24.2)	62 (12.1)	11 (2.1)	3	515	315 (61.5)
皮膚の湿疹・ かゆみ・ できもの	～200未満	3 (8.8)	1 (2.9)	10 (29.4)	10 (29.4)	10 (29.4)	0	34	4 (11.8)
	200～350未満	16 (19.0)	13 (15.5)	13 (15.5)	25 (29.8)	17 (20.2)	0	84	29 (34.5)
	350～500未満	26 (19.4)	20 (14.9)	27 (20.1)	41 (30.6)	20 (14.9)	0	134	46 (34.3)
	500以上	49 (19.1)	38 (14.8)	55 (21.4)	75 (29.2)	40 (15.6)	2	259	87 (33.9)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	0 (0.0)
	計	94 (18.4)	72 (14.1)	107 (20.9)	152 (29.7)	87 (17.0)	3	515	166 (32.4)
視野	～200未満	10 (29.4)	8 (23.5)	10 (29.4)	3 (8.8)	3 (8.8)	0	34	18 (52.9)
	200～350未満	40 (47.6)	15 (17.9)	19 (22.6)	6 (7.1)	4 (4.8)	0	84	55 (65.5)
	350～500未満	59 (44.4)	26 (19.5)	30 (22.6)	13 (9.8)	5 (3.8)	1	134	85 (63.9)
	500以上	126 (48.8)	38 (14.7)	56 (21.7)	31 (12.0)	7 (2.7)	1	259	164 (63.6)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1	4	0 (0.0)
	計	235 (45.9)	87 (17.0)	117 (22.9)	54 (10.5)	19 (3.7)	3	515	322 (62.9)
睡眠	～200未満	5 (14.7)	7 (20.6)	10 (29.4)	10 (29.4)	2 (5.9)	0	34	12 (35.3)
	200～350未満	19 (22.6)	19 (22.6)	23 (27.4)	19 (22.6)	4 (4.8)	0	84	38 (45.2)
	350～500未満	32 (23.9)	33 (24.6)	36 (26.9)	29 (21.6)	4 (3.0)	0	134	65 (48.5)
	500以上	75 (29.2)	50 (19.5)	63 (24.5)	57 (22.2)	12 (4.7)	2	259	125 (48.6)
	不明	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	4	1 (33.3)
	計	132 (25.8)	109 (21.3)	134 (26.2)	115 (22.5)	22 (4.3)	3	515	241 (47.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21. 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目（平成27年度第4期事業対象者）

身体状況の項目	抗HIV薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
食欲	投与なし(投与歴なし)	10 (55.6)	3 (16.7)	4 (22.2)	1 (5.6)	0 (0.0)	0	18	13 (72.2)
	投与なし(投与歴あり)	4 (40.0)	2 (20.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	6 (60.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	14 (24.6)	14 (24.6)	23 (40.4)	6 (10.5)	0 (0.0)	0	57	28 (49.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	21 (36.8)	19 (33.3)	13 (22.8)	3 (5.3)	1 (1.8)	0	57	40 (70.2)
	INSTI	120 (36.0)	123 (36.9)	65 (19.5)	23 (6.9)	2 (0.6)	2	335	243 (73.0)
	その他	14 (37.8)	11 (29.7)	9 (24.3)	3 (8.1)	0 (0.0)	0	37	25 (67.6)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	183 (35.7)	172 (33.6)	118 (23.0)	36 (7.0)	3 (0.6)	3	515	355 (69.3)
味覚	投与なし(投与歴なし)	10 (55.6)	5 (27.8)	1 (5.6)	2 (11.1)	0 (0.0)	0	18	15 (83.3)
	投与なし(投与歴あり)	5 (50.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0	10	5 (50.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	19 (33.3)	13 (22.8)	20 (35.1)	5 (8.8)	0 (0.0)	0	57	32 (56.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	27 (47.4)	11 (19.3)	12 (21.1)	5 (8.8)	2 (3.5)	0	57	38 (66.7)
	INSTI	163 (49.2)	55 (16.6)	85 (25.7)	22 (6.6)	6 (1.8)	4	335	218 (65.9)
	その他	14 (37.8)	10 (27.0)	9 (24.3)	3 (8.1)	1 (2.7)	0	37	24 (64.9)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	238 (46.7)	94 (18.4)	130 (25.5)	39 (7.6)	9 (1.8)	5	515	332 (65.1)
口乾	投与なし(投与歴なし)	7 (38.9)	5 (27.8)	1 (5.6)	4 (22.2)	1 (5.6)	0	18	12 (66.7)
	投与なし(投与歴あり)	3 (30.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0	10	4 (40.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	10 (17.5)	7 (12.3)	14 (24.6)	17 (29.8)	9 (15.8)	0	57	17 (29.8)
	NRTI 2剤+NNRTI	11 (19.3)	10 (17.5)	14 (24.6)	14 (24.6)	8 (14.0)	0	57	21 (36.8)
	INSTI	85 (25.5)	60 (18.0)	94 (28.2)	66 (19.8)	28 (8.4)	2	335	145 (43.5)
	その他	10 (27.0)	3 (8.1)	7 (18.9)	15 (40.5)	2 (5.4)	0	37	13 (35.1)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	126 (24.6)	86 (16.8)	132 (25.8)	117 (22.9)	51 (10.0)	3	515	212 (41.4)
口内炎・ 口の中の痛み	投与なし(投与歴なし)	12 (66.7)	2 (11.1)	0 (0.0)	4 (22.2)	0 (0.0)	0	18	14 (77.8)
	投与なし(投与歴あり)	4 (40.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0	10	5 (50.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	17 (29.8)	14 (24.6)	12 (21.1)	12 (21.1)	2 (3.5)	0	57	31 (54.4)
	NRTI 2剤+NNRTI	19 (33.3)	11 (19.3)	17 (29.8)	7 (12.3)	3 (5.3)	0	57	30 (52.6)
	INSTI	128 (38.4)	49 (14.7)	83 (24.9)	57 (17.1)	16 (4.8)	2	335	177 (53.2)
	その他	12 (32.4)	5 (13.5)	6 (16.2)	11 (29.7)	3 (8.1)	0	37	17 (45.9)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	192 (37.5)	82 (16.0)	119 (23.2)	94 (18.4)	25 (4.9)	3	515	274 (53.5)
下痢	投与なし(投与歴なし)	6 (33.3)	7 (38.9)	3 (16.7)	2 (11.1)	0 (0.0)	0	18	13 (72.2)
	投与なし(投与歴あり)	4 (40.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	0	10	4 (40.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	5 (8.8)	9 (15.8)	17 (29.8)	20 (35.1)	6 (10.5)	0	57	14 (24.6)
	NRTI 2剤+NNRTI	11 (19.3)	13 (22.8)	14 (24.6)	11 (19.3)	8 (14.0)	0	57	24 (42.1)
	INSTI	74 (22.2)	75 (22.5)	83 (24.9)	76 (22.8)	25 (7.5)	2	335	149 (44.7)
	その他	4 (10.8)	5 (13.5)	9 (24.3)	15 (40.5)	4 (10.8)	0	37	9 (24.3)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	104 (20.3)	109 (21.3)	128 (25.0)	128 (25.0)	43 (8.4)	3	515	213 (41.6)
体重減少	投与なし(投与歴なし)	9 (50.0)	4 (22.2)	4 (22.2)	0 (0.0)	1 (5.6)	0	18	13 (72.2)
	投与なし(投与歴あり)	6 (60.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0	10	7 (70.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	15 (26.3)	10 (17.5)	24 (42.1)	7 (12.3)	1 (1.8)	0	57	25 (43.9)
	NRTI 2剤+NNRTI	25 (44.6)	8 (14.3)	18 (32.1)	4 (7.1)	1 (1.8)	1	57	33 (58.9)
	INSTI	124 (37.5)	77 (23.3)	98 (29.6)	23 (6.9)	9 (2.7)	4	335	201 (60.7)
	その他	11 (29.7)	6 (16.2)	14 (37.8)	6 (16.2)	0 (0.0)	0	37	17 (45.9)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	190 (37.3)	106 (20.8)	160 (31.4)	41 (8.1)	12 (2.4)	6	515	296 (58.2)
息切れ	投与なし(投与歴なし)	5 (27.8)	5 (27.8)	5 (27.8)	2 (11.1)	1 (5.6)	0	18	10 (55.6)
	投与なし(投与歴あり)	3 (30.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	0	10	3 (30.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (15.8)	8 (14.0)	10 (17.5)	22 (38.6)	8 (14.0)	0	57	17 (29.8)
	NRTI 2剤+NNRTI	5 (8.8)	11 (19.3)	14 (24.6)	16 (28.1)	11 (19.3)	0	57	16 (28.1)
	INSTI	65 (19.6)	45 (13.6)	91 (27.4)	75 (22.6)	56 (16.9)	3	335	110 (33.1)
	その他	8 (21.6)	3 (8.1)	9 (24.3)	13 (35.1)	4 (10.8)	0	37	11 (29.7)
	不明	0	0	0	0	0	1	1	0
	計	95 (18.6)	72 (14.1)	131 (25.6)	130 (25.4)	83 (16.2)	4	515	167 (32.7)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21 (続き). 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目 (平成27年度第4期事業対象者)

身体状況の項目	抗HIV薬の併用区分	項目のスコア						計	1および2 (再掲)
		1	2	3	4	5	不明		
疲れ	投与なし(投与歴なし)	5 (27.8)	4 (22.2)	6 (33.3)	2 (11.1)	1 (5.6)	0	18	9 (50.0)
	投与なし(投与歴あり)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	4 (40.0)	4 (40.0)	0	10	2 (20.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	6 (10.5)	5 (8.8)	11 (19.3)	24 (42.1)	11 (19.3)	0	57	11 (19.3)
	NRTI 2剤+NNRTI	6 (10.5)	9 (15.8)	6 (10.5)	17 (29.8)	19 (33.3)	0	57	15 (26.3)
	INSTI	32 (9.6)	37 (11.1)	80 (24.1)	100 (30.1)	83 (25.0)	3	335	69 (20.8)
	その他	6 (16.2)	2 (5.4)	8 (21.6)	12 (32.4)	9 (24.3)	0	37	8 (21.6)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	56 (11.0)	58 (11.4)	111 (21.7)	159 (31.1)	127 (24.9)	4	515	114 (22.3)
手足のしびれ・ 痛み	投与なし(投与歴なし)	6 (33.3)	3 (16.7)	3 (16.7)	4 (22.2)	2 (11.1)	0	18	9 (50.0)
	投与なし(投与歴あり)	2 (20.0)	0 (0.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0	10	2 (20.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	14 (24.6)	8 (14.0)	17 (29.8)	14 (24.6)	4 (7.0)	0	57	22 (38.6)
	NRTI 2剤+NNRTI	14 (24.6)	6 (10.5)	8 (14.0)	16 (28.1)	13 (22.8)	0	57	20 (35.1)
	INSTI	101 (30.2)	40 (12.0)	67 (20.1)	91 (27.2)	35 (10.5)	1	335	141 (42.2)
	その他	8 (21.6)	3 (8.1)	12 (32.4)	11 (29.7)	3 (8.1)	0	37	11 (29.7)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	145 (28.3)	60 (11.7)	111 (21.6)	137 (26.7)	60 (11.7)	2	515	205 (40.0)
37℃以上の 発熱	投与なし(投与歴なし)	12 (66.7)	2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	0	18	14 (77.8)
	投与なし(投与歴あり)	4 (40.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0	10	4 (40.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	15 (26.3)	20 (35.1)	18 (31.6)	4 (7.0)	0 (0.0)	0	57	35 (61.4)
	NRTI 2剤+NNRTI	24 (42.1)	11 (19.3)	12 (21.1)	8 (14.0)	2 (3.5)	0	57	35 (61.4)
	INSTI	131 (39.3)	74 (22.2)	81 (24.3)	39 (11.7)	8 (2.4)	2	335	205 (61.6)
	その他	13 (35.1)	9 (24.3)	8 (21.6)	6 (16.2)	1 (2.7)	0	37	22 (59.5)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	199 (38.9)	116 (22.7)	124 (24.2)	62 (12.1)	11 (2.1)	3	515	315 (61.5)
皮膚の湿疹・ かゆみ・ できもの	投与なし(投与歴なし)	4 (22.2)	4 (22.2)	3 (16.7)	5 (27.8)	2 (11.1)	0	18	8 (44.4)
	投与なし(投与歴あり)	1 (10.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	0	10	2 (20.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	9 (15.8)	5 (8.8)	12 (21.1)	21 (36.8)	10 (17.5)	0	57	14 (24.6)
	NRTI 2剤+NNRTI	12 (21.1)	7 (12.3)	11 (19.3)	16 (28.1)	11 (19.3)	0	57	19 (33.3)
	INSTI	63 (18.9)	50 (15.0)	72 (21.6)	95 (28.5)	53 (15.9)	2	335	113 (33.9)
	その他	5 (13.5)	5 (13.5)	7 (18.9)	12 (32.4)	8 (21.6)	0	37	10 (27.0)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	94 (18.4)	72 (14.1)	107 (20.9)	152 (29.7)	87 (17.0)	3	515	166 (32.4)
視野	投与なし(投与歴なし)	10 (55.6)	6 (33.3)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	18	16 (88.9)
	投与なし(投与歴あり)	5 (50.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0	10	6 (60.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	17 (29.8)	11 (19.3)	22 (38.6)	6 (10.5)	1 (1.8)	0	57	28 (49.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	28 (49.1)	8 (14.0)	9 (15.8)	6 (10.5)	6 (10.5)	0	57	36 (63.2)
	INSTI	161 (48.3)	52 (15.6)	74 (22.2)	36 (10.8)	10 (3.0)	2	335	213 (64.0)
	その他	14 (37.8)	9 (24.3)	7 (18.9)	5 (13.5)	2 (5.4)	0	37	23 (62.2)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	235 (45.9)	87 (17.0)	117 (22.9)	54 (10.5)	19 (3.7)	3	515	322 (62.9)
睡眠	投与なし(投与歴なし)	9 (50.0)	4 (22.2)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	0	18	13 (72.2)
	投与なし(投与歴あり)	4 (40.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0	10	5 (50.0)
	NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (14.0)	16 (28.1)	15 (26.3)	17 (29.8)	1 (1.8)	0	57	24 (42.1)
	NRTI 2剤+NNRTI	18 (31.6)	11 (19.3)	13 (22.8)	13 (22.8)	2 (3.5)	0	57	29 (50.9)
	INSTI	82 (24.6)	71 (21.3)	91 (27.3)	72 (21.6)	17 (5.1)	2	335	153 (45.9)
	その他	11 (29.7)	6 (16.2)	11 (29.7)	8 (21.6)	1 (2.7)	0	37	17 (45.9)
	不明	0	—	0	—	0	—	1	0
	計	132 (25.8)	109 (21.3)	134 (26.2)	115 (22.5)	22 (4.3)	3	515	241 (47.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-22. 疾患の有無（平成27年度第4期事業対象者）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	28 (5.5)	484 (94.5)	3	515
(内訳) 脳出血	23 (4.5)			
脳梗塞	1 (0.2)			
その他の脳血管疾患	4 (0.8)			
虚血性心疾患	6 (1.2)	507 (98.8)	2	515
(内訳) 心筋梗塞	2 (0.4)			
その他の虚血性心疾患	4 (0.8)			
肝以外の悪性新生物	13 (2.5)	500 (97.5)	2	515
高血圧・糖尿病	127 (24.9)	384 (75.1)	4	515
(内訳) 高血圧	100 (19.6)			
糖尿病	45 (8.8)			

2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移

本節では、以下の表を示した。

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-5. 肝炎の状況別、血小板数	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-6. 肝炎の状況別、ALT(GPT)	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-7. 肝炎の状況別、総ビリルビン	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-8. 肝炎の状況別、アルブミン	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-9. 肝炎の状況別、プロトロンビン	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-10. 肝炎の状況別、AFP	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-11. 肝炎の状況別、クレアチニン	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-12. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-13. 肝炎の状況別、肝移植歴	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-15. 肝炎の状況別、CD4値	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-16. 肝炎の状況別、HIV-RNA量	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-17. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-19. 肝炎の状況別、身体状況	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-20. 肝炎の状況別、日常生活動作	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-21. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ	(平成27年度第4期事業対象者)
表4-2-22. 肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-23. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-24. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)
表4-2-25. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移	(平成17年度第1期事業対象者)

表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況（平成27年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	2 (10.5)	1 (5.3)	8 (42.1)	8 (42.1)	1	20
陰性	7 (1.6)	56 (12.9)	216 (49.7)	156 (35.9)	3	438
不明	1 (1.8)	8 (14.5)	28 (50.9)	18 (32.7)	2	57
計	10 (2.0)	65 (12.8)	252 (49.5)	182 (35.8)	6	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況（平成27年度第4期事業対象者）

HCV 抗体の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	10 (2.3)	58 (13.3)	240 (55.2)	127 (29.2)	5	440
陰性	0 (0.0)	1 (2.3)	1 (2.3)	41 (95.3)	0	43
不明	0 (0.0)	6 (19.4)	11 (35.5)	14 (45.2)	1	32
計	10 (2.0)	65 (12.8)	252 (49.5)	182 (35.8)	6	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況（平成27年度第4期事業対象者）

HBs抗原の保有状況	HCV 抗体の保有状況			計
	陽性	陰性	不明	
陽性	16 (84.2)	3 (15.8)	1	20
陰性	380 (91.1)	37 (8.9)	21	438
不明	44 (93.6)	3 (6.4)	10	57
計	440 (91.1)	43 (8.9)	32	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (LogIU/ml)							計
	検出せず	～3.7 未満	3.7～6.0 未満	6.0～6.7 未満	6.7 以上	未実施	不明	
肝がんあり	6 (60.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1	10
肝硬変あり	27 (41.5)	6 (9.2)	11 (16.9)	7 (10.8)	3 (4.6)	9 (10.0)	2	65
慢性肝炎あり	120 (47.6)	12 (4.8)	22 (8.7)	26 (10.3)	21 (8.3)	41 (10.1)	10	252
いずれもなし	113 (62.1)	2 (1.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	2 (1.1)	43 (31.3)	21	182
不明	4 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	270 (52.4)	20 (3.9)	36 (7.0)	34 (6.6)	26 (5.0)	94 (17.0)	35	515

() : 各行の計に対する%

表4-2-5. 肝炎の状況別、血小板数（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	血小板数 ($\times 10^4/\text{mm}^3$)					計
	～15 未満	15～20 未満	20～25 未満	25 以上～	不明	
肝がんあり	9 (90.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	50 (76.9)	6 (9.2)	5 (7.7)	4 (6.2)	0	65
慢性肝炎あり	63 (25.2)	87 (34.8)	68 (27.2)	32 (12.8)	2	252
いずれもなし	23 (12.9)	54 (30.3)	52 (29.2)	49 (27.5)	4	182
不明	0 (0.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1	6
計	145 (28.5)	150 (29.5)	128 (25.2)	85 (16.7)	7	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-6. 肝炎の状況別、ALT(GPT) (平成27年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	ALT(GPT) (IU/L)					計
	～40 未満	40～80 未満	80～120 未満	120 以上～	不明	
肝がんあり	3 (30.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	37 (56.9)	17 (26.2)	10 (15.4)	1 (1.5)	0	65
慢性肝炎あり	156 (62.2)	65 (25.9)	20 (8.0)	10 (4.0)	1	252
いずれもなし	140 (77.3)	31 (17.1)	7 (3.9)	3 (1.7)	1	182
不明	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	341 (66.6)	119 (23.2)	37 (7.2)	15 (2.9)	3	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-7. 肝炎の状況別、総ビリルビン (平成27年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	総ビリルビン (mg/dl)					計
	～0.7 未満	0.7～1.3 未満	1.3～1.6 未満	1.6 以上～	不明	
肝がんあり	3 (30.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	18 (28.6)	22 (34.9)	6 (9.5)	17 (27.0)	2	65
慢性肝炎あり	114 (47.1)	102 (42.1)	11 (4.5)	15 (6.2)	10	252
いずれもなし	89 (51.4)	73 (42.2)	6 (3.5)	5 (2.9)	9	182
不明	3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2	6
計	227 (46.1)	203 (41.3)	24 (4.9)	38 (7.7)	23	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-8. 肝炎の状況別、アルブミン (平成27年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	アルブミン (g/dL)					計
	～3.0 未満	3.0～3.5 未満	3.5～4.0 未満	4.0 以上～	不明	
肝がんあり	1 (10.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	4 (40.0)	0	10
肝硬変あり	12 (19.0)	4 (6.3)	12 (19.0)	35 (55.6)	2	65
慢性肝炎あり	2 (0.9)	2 (0.9)	16 (7.1)	204 (91.1)	28	252
いずれもなし	0 (0.0)	3 (1.8)	12 (7.4)	148 (90.8)	19	182
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	3	6
計	15 (3.2)	10 (2.2)	44 (9.5)	394 (85.1)	52	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-9. 肝炎の状況別、プロトロンビン (平成27年度第4期事業対象者)

肝炎の状況	プロトロンビン PT 活性% (%)					計
	～50 未満	50～70 未満	70～100 未満	100 以上～	不明	
肝がんあり	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)	3	10
肝硬変あり	1 (1.9)	15 (28.3)	30 (56.6)	7 (13.2)	12	65
慢性肝炎あり	7 (4.4)	6 (3.8)	92 (58.2)	53 (33.5)	94	252
いずれもなし	0 (0.0)	4 (3.8)	50 (47.6)	51 (48.6)	77	182
不明	1 (25.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	2	6
計	10 (3.1)	27 (8.3)	178 (54.4)	112 (34.3)	188	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-10. 肝炎の状況別、AFP（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	AFP (ng/mL)					計
	～3 未満	3～6 未満	6～20 未満	20 以上～	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	4 (44.4)	2 (22.2)	3 (33.3)	1	10
肝硬変あり	11 (20.8)	23 (43.4)	17 (32.1)	2 (3.8)	12	65
慢性肝炎あり	69 (42.3)	65 (39.9)	22 (13.5)	7 (4.3)	89	252
いずれもなし	31 (56.4)	20 (36.4)	3 (5.5)	1 (1.8)	127	182
不明	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	6
計	113 (40.1)	112 (39.7)	44 (15.6)	13 (4.6)	233	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-11. 肝炎の状況別、クレアチニン（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	クレアチニン (mg/dL)					計
	～0.6 未満	0.6～1.2 未満	1.2～1.8 未満	1.8 以上～	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	8 (12.9)	43 (69.4)	4 (6.5)	7 (11.3)	3	65
慢性肝炎あり	28 (11.6)	200 (82.6)	9 (3.7)	5 (2.1)	10	252
いずれもなし	33 (19.1)	132 (76.3)	6 (3.5)	2 (1.2)	9	182
不明	2 (40.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	73 (14.8)	386 (78.5)	19 (3.9)	14 (2.8)	23	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-12. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤での治療歴						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	4 (40.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	6 (60.0)	0	10
肝硬変あり	43 (69.4)	34 (54.8)	4 (6.5)	5 (8.1)	19 (30.6)	3	65
慢性肝炎あり	155 (63.0)	126 (51.2)	19 (7.7)	10 (4.1)	91 (37.0)	6	252
いずれもなし	62 (35.6)	49 (28.2)	10 (5.7)	3 (1.7)	112 (64.4)	8	182
不明	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	1	6
計	265 (53.3)	213 (42.9)	34 (6.8)	18 (3.6)	232 (46.7)	18	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-13. 肝炎の状況別、肝移植歴（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	肝移植歴			計
	あり	なし	不明	
肝がんあり	1 (10.0)	9 (90.0)	0	10
肝硬変あり	3 (4.8)	60 (95.2)	2	65
慢性肝炎あり	1 (0.4)	243 (99.6)	8	252
いずれもなし	1 (0.6)	176 (99.4)	5	182
不明	0 (0.0)	5 (100.0)	1	6
計	6 (1.2)	493 (98.8)	16	515

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	インターフェロン製剤の現在の投与状況						計
	あり	リバビリンの併用			なし	不明	
		あり	なし	不明			
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)	0	10
肝硬変あり	10 (15.6)	2 (3.1)	8 (12.5)	0 (0.0)	54 (84.4)	1	65
慢性肝炎あり	32 (12.8)	4 (1.6)	28 (11.2)	0 (0.0)	218 (87.2)	2	252
いずれもなし	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	175 (100.0)	7	182
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)	1	6
計	42 (8.3)	6 (1.2)	36 (7.1)	0 (0.0)	462 (91.7)	11	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

肝炎の状況	インターフェロン製剤の種類（重複あり）				
	インターフェロン			その他	投与あり
	α	β	ベグ		
肝がんあり	0 —	0 —	0 —	0 —	0
肝硬変あり	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	8 (72.7)	11
慢性肝炎あり	1 (3.1)	0 (0.0)	3 (9.4)	28 (87.5)	32
いずれもなし	0 —	0 —	0 —	0 —	0
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0
計	2 (4.8)	1 (2.4)	3 (7.1)	36 (85.7)	42

(): 各行のインターフェロン製剤等投与ありの数を分母とする%

表4-2-15. 肝炎の状況別、CD4値（平成27年度第4期事業対象者）

	CD4 値					計
	～200 未満	200～350 未満	350～500 未満	500 以上	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	4 (40.0)	0 (0.0)	4 (40.0)	0	10
肝硬変あり	13 (20.0)	19 (29.2)	14 (21.5)	19 (29.2)	0	65
慢性肝炎あり	11 (4.4)	35 (14.0)	70 (28.0)	134 (53.6)	2	252
いずれもなし	8 (4.4)	25 (13.8)	48 (26.5)	100 (55.2)	1	182
不明	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	1	6
計	34 (6.7)	84 (16.4)	134 (26.2)	259 (50.7)	4	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-16. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	HIV-RNA 量						計
	50 未満*	50～ 400 未満†	400～ 1000 未満	1000～ 10000 未満	10000 以上	不明	
肝がんあり	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
肝硬変あり	63 (96.9)	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	65
慢性肝炎あり	242 (96.4)	5 (2.0)	0 (0.0)	3 (1.2)	1 (0.4)	1	252
いずれもなし	165 (90.7)	6 (3.3)	4 (2.2)	4 (2.2)	3 (1.6)	0	182
不明	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
計	484 (94.3)	13 (2.5)	5 (1.0)	7 (1.4)	4 (0.8)	2	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-17. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬の併用区分							計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
肝がんあり	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	6 (60.0)	1 (10.0)	0	10
肝硬変あり	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (9.2)	7 (10.8)	44 (67.7)	8 (12.3)	0	65
慢性肝炎あり	6 (2.4)	3 (1.2)	25 (9.9)	26 (10.3)	173 (68.7)	19 (7.5)	0	252
いずれもなし	10 (5.5)	6 (3.3)	25 (13.7)	22 (12.1)	110 (60.4)	9 (4.9)	0	182
不明	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1	6
計	18 (3.5)	10 (1.9)	57 (11.1)	57 (11.1)	335 (65.2)	37 (7.2)	1	515

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-18. 肝炎の状況別、抗HIV薬（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬							
	AZT	ddl	3TC	d4T	AZT/3TC	ABC	TDF	3TC/ABC
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)
肝硬変あり	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (15.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	10 (15.4)	4 (6.2)	16 (24.6)
慢性肝炎あり	11 (4.4)	2 (0.8)	28 (11.1)	2 (0.8)	7 (2.8)	13 (5.2)	15 (6.0)	60 (23.8)
いずれもなし	8 (4.4)	0 (0.0)	17 (9.3)	2 (1.1)	2 (1.1)	7 (3.8)	8 (4.4)	48 (26.4)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)
計	19 (3.7)	2 (0.4)	55 (10.7)	5 (1.0)	9 (1.7)	30 (5.8)	27 (5.2)	127 (24.7)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	FTC	TDF/FTC	SQV	RTV	NFV	LPV	ATV	FPV
肝がんあり	0 (0.0)	7 (70.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
肝硬変あり	1 (1.5)	23 (35.4)	0 (0.0)	10 (15.4)	1 (1.5)	4 (6.2)	1 (1.5)	1 (1.5)
慢性肝炎あり	4 (1.6)	109 (43.3)	3 (1.2)	37 (14.7)	5 (2.0)	11 (4.4)	7 (2.8)	4 (1.6)
いずれもなし	2 (1.1)	72 (39.6)	1 (0.5)	24 (13.2)	1 (0.5)	8 (4.4)	4 (2.2)	3 (1.6)
不明	0 (0.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	7 (1.4)	213 (41.4)	4 (0.8)	72 (14.0)	8 (1.6)	23 (4.5)	12 (2.3)	9 (1.7)

肝炎の状況	抗HIV薬							
	DRV	NVP	EFV	ETR	RPV	RAL	STB	DTG
肝がんあり	1 (10.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	5 (50.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
肝硬変あり	8 (12.3)	1 (1.5)	6 (9.2)	8 (12.3)	6 (9.2)	32 (49.2)	2 (3.1)	10 (15.4)
慢性肝炎あり	31 (12.3)	2 (0.8)	25 (9.9)	14 (5.6)	17 (6.7)	92 (36.5)	7 (2.8)	74 (29.4)
いずれもなし	23 (12.6)	2 (1.1)	7 (3.8)	10 (5.5)	19 (10.4)	64 (35.2)	2 (1.1)	44 (24.2)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	63 (12.2)	5 (1.0)	41 (8.0)	33 (6.4)	42 (8.2)	195 (37.9)	11 (2.1)	129 (25.0)

肝炎の状況	抗HIV薬		対象者数
	MVC		
肝がんあり	0 (0.0)		10
肝硬変あり	4 (6.2)		65
慢性肝炎あり	6 (2.4)		252
いずれもなし	6 (3.3)		182
不明	0 (0.0)		6
計	16 (3.1)		515

(): 対象者数を分母とする%

表4-2-19. 肝炎の状況別、身体状況（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	身体状況の総合スコア					計	1～3 未満 (再掲)
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	不明		
肝がんあり	2 (20.0)	2 (20.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	0	10	4 (40.0)
肝硬変あり	12 (19.0)	20 (31.7)	29 (46.0)	2 (3.2)	2	65	32 (50.8)
慢性肝炎あり	69 (28.2)	81 (33.1)	89 (36.3)	6 (2.4)	7	252	150 (61.2)
いずれもなし	53 (30.3)	65 (37.1)	53 (30.3)	4 (2.3)	7	182	118 (67.4)
不明	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1	6	3 (60.0)
計	137 (27.5)	170 (34.1)	179 (35.9)	12 (2.4)	17	515	307 (61.6)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-20. 肝炎の状況別、日常生活動作（平成27年度第4期事業対象者）

肝炎の状況	日常生活動作					計	1および2 (再掲)
	1	2	3	4 (4～8)	不明		
肝がんあり	2 (20.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	0	10	3 (30.0)
肝硬変あり	9 (13.8)	7 (10.8)	16 (24.6)	33 (50.8)	0	65	16 (24.6)
慢性肝炎あり	65 (26.9)	67 (27.7)	65 (26.9)	45 (18.6)	10	252	132 (54.5)
いずれもなし	41 (23.2)	57 (32.2)	42 (23.7)	37 (20.9)	5	182	98 (55.4)
不明	0 (0.0)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1	6	1 (20.0)
計	117 (23.4)	133 (26.7)	131 (26.3)	118 (23.6)	16	515	250 (50.1)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-21. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成27年度第4期事業対象者）

A. 肝硬変あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (18.2)	0 (0.0)	7 (63.6)	2 (18.2)	0	11
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (23.1)	0 (0.0)	8 (61.5)	2 (15.4)	0	13
200 ～350 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (15.8)	13 (68.4)	3 (15.8)	0	19
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (15.8)	13 (68.4)	3 (15.8)	0	19
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	2 (14.3)	10 (71.4)	1 (7.1)	0	14
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	2 (14.3)	10 (71.4)	1 (7.1)	0	14
500 以上	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.5)	2 (10.5)	13 (68.4)	2 (10.5)	0	19
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.5)	2 (10.5)	13 (68.4)	2 (10.5)	0	19
不明	50未満*	0	0	0	0	0	0	0	0
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
計	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (7.9)	7 (11.1)	43 (68.3)	8 (12.7)	0	63
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (9.2)	7 (10.8)	44 (67.7)	8 (12.3)	0	65

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-21 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成27年度第4期事業対象者）

B. 慢性肝炎あり

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤	NRTI 2 剤 + NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	5 (62.5)	1 (12.5)	0	8
	50～400未満†	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	2 (18.2)	7 (63.6)	1 (9.1)	0	11
200 ～350 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.1)	3 (9.1)	23 (69.7)	3 (9.1)	0	33
	50～400未満†	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (2.9)	0 (0.0)	4 (11.4)	3 (8.6)	24 (68.6)	3 (8.6)	0	35
350 ～500 未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (8.8)	8 (11.8)	51 (75.0)	3 (4.4)	0	68
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (10.0)	8 (11.4)	52 (74.3)	3 (4.3)	0	70
500 以上	50未満*	2 (1.5)	2 (1.5)	13 (9.8)	13 (9.8)	90 (68.2)	12 (9.1)	0	132
	50～400未満†	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (3.0)	2 (1.5)	13 (9.7)	13 (9.7)	90 (67.2)	12 (9.0)	0	134
不明	50未満*	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
計	50未満*	3 (1.2)	2 (0.8)	23 (9.5)	26 (10.7)	169 (69.8)	19 (7.9)	0	242
	50～400未満†	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0	5
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0	3
	10000以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	6 (2.4)	3 (1.2)	25 (9.9)	26 (10.3)	173 (68.7)	19 (7.5)	0	252

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-21 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ (平成27年度第4期事業対象者)

C. いずれもなし

CD4 値	HIV-RNA 量	抗 HIV 薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	5 (71.4)	0 (0.0)	0	7
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	5 (62.5)	0 (0.0)	0	8
200 ～350未満	50未満*	1 (4.5)	2 (9.1)	3 (13.6)	1 (4.5)	14 (63.6)	1 (4.5)	0	22
	50～400未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (8.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	16 (64.0)	1 (4.0)	0	25
350 ～500未満	50未満*	2 (4.5)	1 (2.3)	6 (13.6)	4 (9.1)	31 (70.5)	0 (0.0)	0	44
	50～400未満†	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000未満	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5 (10.4)	2 (4.2)	6 (12.5)	4 (8.3)	31 (64.6)	0 (0.0)	0	48
500以上	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (16.5)	14 (15.4)	55 (60.4)	7 (7.7)	0	91
	50～400未満†	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0	4
	400～1000未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2
	1000～10000未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	10000以上	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (3.0)	1 (1.0)	15 (15.0)	16 (16.0)	57 (57.0)	8 (8.0)	0	100
不明	50未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400未満†	0	0	0	0	0	0	0	0
	400～1000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000～10000未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	1	0	0	1
計	50未満*	3 (1.8)	3 (1.8)	25 (15.2)	20 (12.1)	106 (64.2)	8 (4.8)	0	165
	50～400未満†	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0	6
	400～1000未満	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	0	4
	1000～10000未満	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	10000以上	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	10 (5.5)	6 (3.3)	25 (13.7)	22 (12.1)	110 (60.4)	9 (4.9)	0	182

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満 (検出限界値 50 以下) を含む

†: 検出限界未満 (検出限界値 51～400、不明) を含む

表4-2-22. 肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象者）

年度	肝炎の状況							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (1.0)	49 (8.1)	431 (70.9)	122 (20.1)	25	－	－	633
平成18年度	5 (0.8)	47 (7.6)	412 (67.0)	133 (21.6)	18	3 (0.5)	15 (2.4)	633
平成19年度	4 (0.7)	43 (7.0)	396 (64.5)	137 (22.3)	19	5 (0.8)	29 (4.7)	633
平成20年度	8 (1.3)	48 (7.7)	360 (58.0)	153 (24.6)	12	9 (1.4)	43 (6.9)	633
平成21年度	8 (1.3)	49 (8.0)	340 (55.3)	146 (23.7)	18	16 (2.6)	56 (9.1)	633
平成22年度	6 (1.0)	57 (9.1)	334 (53.6)	146 (23.4)	10	16 (2.6)	64 (10.3)	633
平成23年度	6 (1.0)	57 (9.1)	323 (51.7)	145 (23.2)	8	20 (3.2)	74 (11.8)	633
平成24年度	5 (0.8)	58 (9.4)	315 (50.9)	140 (22.6)	14	21 (3.4)	80 (12.9)	633
平成25年度	12 (1.9)	65 (10.5)	270 (43.4)	165 (26.5)	11	23 (3.7)	87 (14.0)	633
平成26年度	10 (1.6)	60 (9.6)	272 (43.5)	164 (26.2)	8	23 (3.7)	96 (15.4)	633
平成27年度	11 (1.8)	67 (10.7)	249 (39.6)	175 (27.9)	5	23 (3.7)	103 (16.4)	633

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-23. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝がんあり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	6 (100.0)	—	—	—	—	—	—	6
平成18年度	3 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (50.0)	6
平成19年度	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	0 (0.0)	4 (80.0)	6
平成20年度	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	5 (83.3)	6
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成23年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成25年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成26年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6
平成27年度	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	6 (100.0)	6

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝肝硬変あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	49 (100.0)	—	—	—	—	—	49
平成18年度	0 (0.0)	33 (67.3)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	1 (2.0)	6 (12.2)	49
平成19年度	1 (2.0)	24 (49.0)	7 (14.3)	3 (6.1)	0	2 (4.1)	12 (24.5)	49
平成20年度	1 (2.0)	21 (42.9)	8 (16.3)	2 (4.1)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成21年度	2 (4.1)	22 (44.9)	7 (14.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	15 (30.6)	49
平成22年度	2 (4.2)	21 (43.8)	5 (10.4)	3 (6.3)	1	2 (4.2)	15 (31.3)	49
平成23年度	1 (2.0)	20 (40.8)	8 (16.3)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	17 (34.7)	49
平成24年度	2 (4.2)	19 (39.6)	6 (12.5)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	17 (35.4)	49
平成25年度	3 (6.3)	20 (41.7)	3 (6.3)	2 (4.2)	1	2 (4.2)	18 (37.5)	49
平成26年度	3 (6.1)	17 (34.7)	6 (12.2)	1 (2.0)	0	2 (4.1)	20 (40.8)	49
平成27年度	3 (6.1)	16 (32.7)	4 (8.2)	3 (6.1)	0	2 (4.1)	21 (42.9)	49

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝慢性肝炎あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	431 (100.0)	—	—	—	—	431
平成18年度	2 (0.5)	11 (2.6)	376 (89.7)	27 (6.4)	12	2 (0.5)	1 (0.2)	431
平成19年度	2 (0.5)	17 (4.0)	355 (84.3)	37 (8.8)	10	3 (0.7)	7 (1.7)	431
平成20年度	6 (1.4)	24 (5.7)	321 (75.7)	54 (12.7)	7	5 (1.2)	14 (3.3)	431
平成21年度	6 (1.4)	25 (6.0)	302 (72.2)	52 (12.4)	13	10 (2.4)	23 (5.5)	431
平成22年度	4 (0.9)	33 (7.7)	296 (69.2)	54 (12.6)	3	10 (2.3)	31 (7.2)	431
平成23年度	5 (1.2)	33 (7.7)	281 (65.8)	58 (13.6)	4	14 (3.3)	36 (8.4)	431
平成24年度	3 (0.7)	36 (8.5)	275 (64.6)	56 (13.1)	5	15 (3.5)	41 (9.6)	431
平成25年度	8 (1.9)	40 (9.4)	239 (56.4)	77 (18.2)	7	17 (4.0)	43 (10.1)	431
平成26年度	7 (1.6)	39 (9.2)	234 (55.1)	78 (18.4)	6	17 (4.0)	50 (11.8)	431
平成27年度	8 (1.9)	48 (11.2)	217 (50.8)	83 (19.4)	4	17 (4.0)	54 (12.6)	431

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝いずれもなし の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	122 (100.0)	—	—	—	122
平成18年度	0 (0.0)	1 (0.8)	20 (16.9)	97 (82.2)	4	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成19年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.9)	90 (78.3)	7	0 (0.0)	0 (0.0)	122
平成20年度	0 (0.0)	2 (1.7)	21 (17.9)	90 (76.9)	5	1 (0.9)	3 (2.6)	122
平成21年度	0 (0.0)	1 (0.9)	22 (18.8)	86 (73.5)	5	2 (1.7)	6 (5.1)	122
平成22年度	0 (0.0)	1 (0.9)	24 (20.7)	83 (71.6)	6	2 (1.7)	6 (5.2)	122
平成23年度	0 (0.0)	3 (2.5)	24 (20.2)	82 (68.9)	3	2 (1.7)	8 (6.7)	122
平成24年度	0 (0.0)	2 (1.7)	24 (20.7)	79 (68.1)	6	2 (1.7)	9 (7.8)	122
平成25年度	1 (0.8)	3 (2.5)	20 (16.5)	82 (67.8)	1	2 (1.7)	13 (10.7)	122
平成26年度	0 (0.0)	2 (1.7)	21 (17.5)	82 (68.3)	2	2 (1.7)	13 (10.8)	122
平成27年度	0 (0.0)	1 (0.8)	19 (15.7)	84 (69.4)	1	2 (1.7)	15 (12.4)	122

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-23 (続き). 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移 (平成17年度第1期事業対象)

年度	肝炎の状況： 平成17年度＝不明 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	—	—	—	—	25	—	—	25
平成18年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	8 (34.8)	2	0 (0.0)	5 (21.7)	25
平成19年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	7 (29.2)	1	0 (0.0)	6 (25.0)	25
平成20年度	0 (0.0)	1 (4.0)	10 (40.0)	7 (28.0)	0	1 (4.0)	6 (24.0)	25
平成21年度	0 (0.0)	1 (4.0)	9 (36.0)	7 (28.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成22年度	0 (0.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	6 (24.0)	0	2 (8.0)	6 (24.0)	25
平成23年度	0 (0.0)	1 (4.2)	10 (41.7)	4 (16.7)	1	2 (8.3)	7 (29.2)	25
平成24年度	0 (0.0)	1 (4.3)	10 (43.5)	3 (13.0)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25
平成25年度	0 (0.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	4 (17.4)	2	2 (8.7)	7 (30.4)	25
平成26年度	0 (0.0)	2 (8.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	0	2 (8.0)	7 (28.0)	25
平成27年度	0 (0.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	5 (20.0)	0	2 (8.0)	7 (28.0)	25

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-24. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移 (平成17年度第1期事業対象)

年度	HBs抗原の保有状況： 平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	3 (7.7)	32 (82.1)	4 (10.3)	0	—	—	39
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.6)	30 (78.9)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	0 (0.0)	39
平成19年度	1 (2.7)	1 (2.7)	29 (78.4)	5 (13.5)	2	1 (2.7)	0 (0.0)	39
平成20年度	1 (2.6)	1 (2.6)	27 (69.2)	8 (20.5)	0	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成21年度	1 (2.6)	1 (2.6)	28 (73.7)	6 (15.8)	1	1 (2.6)	1 (2.6)	39
平成22年度	1 (2.6)	1 (2.6)	25 (64.1)	9 (23.1)	0	1 (2.6)	2 (5.1)	39
平成23年度	0 (0.0)	3 (7.7)	27 (69.2)	5 (12.8)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39
平成24年度	1 (2.6)	1 (2.6)	24 (63.2)	8 (21.1)	1	1 (2.6)	3 (7.9)	39
平成25年度	1 (2.6)	3 (7.7)	21 (53.8)	10 (25.6)	0	1 (2.6)	3 (7.7)	39
平成26年度	1 (2.6)	1 (2.6)	23 (59.0)	9 (23.1)	0	1 (2.6)	4 (10.3)	39
平成27年度	2 (5.3)	0 (0.0)	19 (50.0)	10 (26.3)	1	1 (2.6)	6 (15.8)	39

年度	HBs抗原の保有状況： 平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.1)	44 (9.5)	320 (69.1)	94 (20.3)	9	—	—	472
平成18年度	4 (0.9)	43 (9.3)	307 (66.3)	100 (21.6)	9	0 (0.0)	9 (1.9)	472
平成19年度	3 (0.7)	38 (8.2)	290 (62.9)	106 (23.0)	11	2 (0.4)	22 (4.8)	472
平成20年度	6 (1.3)	42 (9.1)	267 (57.5)	112 (24.1)	8	4 (0.9)	33 (7.1)	472
平成21年度	4 (0.9)	43 (9.3)	253 (55.0)	109 (23.7)	12	9 (2.0)	42 (9.1)	472
平成22年度	4 (0.9)	50 (10.8)	239 (51.5)	114 (24.6)	8	9 (1.9)	48 (10.3)	472
平成23年度	6 (1.3)	46 (9.9)	233 (50.1)	111 (23.9)	7	13 (2.8)	56 (12.0)	472
平成24年度	3 (0.6)	50 (10.8)	225 (48.7)	108 (23.4)	10	14 (3.0)	62 (13.4)	472
平成25年度	10 (2.2)	50 (10.8)	197 (42.4)	124 (26.7)	7	16 (3.4)	68 (14.6)	472
平成26年度	8 (1.7)	48 (10.3)	191 (41.1)	126 (27.1)	7	16 (3.4)	76 (16.3)	472
平成27年度	7 (1.5)	52 (11.1)	182 (38.8)	132 (28.1)	3	16 (3.4)	80 (17.1)	472

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-25. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	5 (1.0)	45 (8.6)	401 (77.0)	70 (13.4)	10	—	—	531
平成18年度	4 (0.8)	45 (8.7)	377 (72.8)	80 (15.4)	13	2 (0.4)	10 (1.9)	531
平成19年度	3 (0.6)	40 (7.8)	356 (69.5)	86 (16.8)	19	4 (0.8)	23 (4.5)	531
平成20年度	7 (1.3)	47 (9.0)	325 (62.5)	100 (19.2)	11	6 (1.2)	35 (6.7)	531
平成21年度	8 (1.6)	47 (9.1)	308 (59.7)	96 (18.6)	15	12 (2.3)	45 (8.7)	531
平成22年度	6 (1.1)	56 (10.7)	298 (57.0)	99 (18.9)	8	12 (2.3)	52 (9.9)	531
平成23年度	6 (1.1)	53 (10.1)	289 (55.2)	99 (18.9)	7	16 (3.1)	61 (11.6)	531
平成24年度	5 (1.0)	56 (10.8)	283 (54.4)	93 (17.9)	11	17 (3.3)	66 (12.7)	531
平成25年度	12 (2.3)	60 (11.5)	245 (47.0)	113 (21.7)	10	19 (3.6)	72 (13.8)	531
平成26年度	9 (1.7)	56 (10.7)	243 (46.3)	117 (22.3)	6	19 (3.6)	81 (15.4)	531
平成27年度	10 (1.9)	64 (12.1)	225 (42.6)	125 (23.7)	3	19 (3.6)	85 (16.1)	531

年度	HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成17年度	0 (0.0)	2 (4.7)	5 (11.6)	36 (83.7)	2	—	—	45
平成18年度	0 (0.0)	1 (2.2)	6 (13.3)	38 (84.4)	0	0 (0.0)	0 (0.0)	45
平成19年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (17.8)	36 (80.0)	0	0 (0.0)	1 (2.2)	45
平成20年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	34 (77.3)	1	1 (2.3)	2 (4.5)	45
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (16.3)	32 (74.4)	2	1 (2.3)	3 (7.0)	45
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.9)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成23年度	0 (0.0)	1 (2.3)	6 (13.6)	33 (75.0)	1	1 (2.3)	3 (6.8)	45
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (14.3)	32 (76.2)	3	1 (2.4)	3 (7.1)	45
平成25年度	0 (0.0)	2 (4.4)	4 (8.9)	34 (75.6)	0	1 (2.2)	4 (8.9)	45
平成26年度	1 (2.3)	1 (2.3)	4 (9.3)	32 (74.4)	2	1 (2.3)	4 (9.3)	45
平成27年度	1 (2.2)	0 (0.0)	4 (8.9)	33 (73.3)	0	1 (2.2)	6 (13.3)	45

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

	CD4 値					計	中央値
	～200 未満	200～ 350 未満	350～ 500 未満	500 以上	不明		
平成5年度 第1期	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	379	385	163
平成6年度 第1期	103 (32.7)	95 (30.2)	68 (21.6)	49 (15.6)	148	463	288
平成7年度 第1期	134 (36.2)	99 (26.8)	87 (23.5)	50 (13.5)	120	490	277
平成8年度 第1期	141 (34.4)	117 (28.5)	93 (22.7)	59 (14.4)	143	553	286
平成9年度 第1期	136 (25.2)	148 (27.4)	139 (25.7)	117 (21.7)	81	621	332
平成10年度 第1期	104 (17.8)	177 (30.4)	155 (26.6)	147 (25.2)	75	658	356
平成11年度 第1期	79 (13.0)	178 (29.3)	182 (29.9)	169 (27.8)	58	666	389
平成12年度 第1期	83 (13.8)	167 (27.8)	175 (29.1)	176 (29.3)	76	677	394
平成13年度 第1期	71 (12.2)	154 (26.4)	179 (30.7)	179 (30.7)	83	666	398
平成14年度 第1期	68 (11.3)	169 (28.2)	156 (26.0)	207 (34.5)	66	666	412
平成15年度 第1期	74 (13.0)	157 (27.6)	166 (29.2)	171 (30.1)	94	662	402
平成16年度 第1期	74 (12.7)	150 (25.7)	165 (28.3)	195 (33.4)	61	645	408
平成17年度 第1期	59 (10.5)	157 (27.9)	152 (27.0)	194 (34.5)	71	633	408
平成18年度 第1期	77 (13.6)	154 (27.3)	136 (24.1)	198 (35.0)	52	617	395
平成19年度 第1期	67 (12.2)	172 (31.4)	136 (24.9)	172 (31.4)	54	601	381
平成20年度 第1期	70 (13.0)	155 (28.9)	155 (28.9)	157 (29.2)	50	587	389
平成21年度 第1期	50 (9.5)	141 (26.7)	127 (24.1)	210 (39.8)	39	567	432
平成22年度 第1期	56 (10.6)	133 (25.3)	153 (29.1)	184 (35.0)	33	559	432
平成23年度 第1期	49 (9.6)	118 (23.1)	150 (29.4)	193 (37.8)	38	548	442
平成24年度 第1期	37 (7.4)	107 (21.4)	149 (29.7)	208 (41.5)	40	541	459
平成25年度 第1期	34 (6.8)	117 (23.5)	120 (24.1)	226 (45.5)	35	532	469
第2期	40 (8.0)	96 (19.2)	149 (29.7)	216 (43.1)	31	532	465
第3期	41 (8.2)	91 (18.1)	139 (27.6)	232 (46.1)	26	529	473
第4期	29 (6.4)	93 (20.7)	124 (27.6)	204 (45.3)	79	529	481
平成26年度 第1期	36 (7.3)	90 (18.4)	131 (26.7)	233 (47.6)	35	525	485
第2期	41 (8.3)	80 (16.2)	135 (27.3)	239 (48.3)	28	523	492
第3期	37 (7.5)	68 (13.8)	132 (26.9)	254 (51.7)	31	522	507
第4期	34 (7.4)	74 (16.2)	115 (25.1)	235 (51.3)	62	520	508
平成27年度 第1期	38 (7.7)	87 (17.6)	121 (24.4)	249 (50.3)	25	520	505
第2期	36 (7.2)	82 (16.5)	123 (24.7)	256 (51.5)	22	519	504
第3期	37 (7.4)	85 (17.1)	118 (23.7)	257 (51.7)	20	517	511
第4期	31 (6.8)	80 (17.7)	118 (26.0)	224 (49.4)	62	515	497

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

	CD4 / CD8 比						計	中央値
	～0.10未満	0.10～ 0.50 未満	0.50～ 1.00 未満	1.00～ 1.50 未満	1.50 以上	不明		
平成5年度 第1期	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	379	385	0.17
平成6年度 第1期	45 (14.5)	168 (54.2)	90 (29.0)	4 (1.3)	3 (1.0)	153	463	0.31
平成7年度 第1期	45 (12.2)	199 (53.8)	114 (30.8)	12 (3.2)	0 (0.0)	120	490	0.34
平成8年度 第1期	59 (14.5)	231 (56.6)	109 (26.7)	8 (2.0)	1 (0.2)	145	553	0.34
平成9年度 第1期	31 (5.9)	281 (53.6)	185 (35.3)	26 (5.0)	1 (0.2)	97	621	0.40
平成10年度 第1期	18 (3.1)	280 (48.4)	241 (41.6)	37 (6.4)	3 (0.5)	79	658	0.48
平成11年度 第1期	20 (3.4)	283 (48.3)	227 (38.7)	50 (8.5)	6 (1.0)	80	666	0.48
平成12年度 第1期	11 (1.9)	273 (46.9)	236 (40.5)	50 (8.6)	12 (2.1)	95	677	0.50
平成13年度 第1期	11 (2.0)	244 (43.5)	239 (42.6)	52 (9.3)	15 (2.7)	105	666	0.51
平成14年度 第1期	9 (1.6)	249 (43.6)	236 (41.3)	60 (10.5)	17 (3.0)	95	666	0.52
平成15年度 第1期	8 (1.5)	227 (42.2)	222 (41.3)	61 (11.3)	20 (3.7)	124	662	0.54
平成16年度 第1期	10 (1.8)	219 (40.4)	231 (42.6)	60 (11.1)	22 (4.1)	103	645	0.55
平成17年度 第1期	11 (2.1)	204 (38.3)	234 (43.9)	59 (11.1)	25 (4.7)	100	633	0.57
平成18年度 第1期	11 (2.1)	175 (33.2)	243 (46.1)	64 (12.1)	34 (6.5)	90	617	0.60
平成19年度 第1期	4 (0.8)	189 (36.7)	213 (41.4)	81 (15.7)	28 (5.4)	86	601	0.59
平成20年度 第1期	7 (1.4)	165 (32.1)	232 (45.1)	86 (16.7)	24 (4.7)	73	587	0.61
平成21年度 第1期	6 (1.2)	147 (30.1)	208 (42.5)	98 (20.0)	30 (6.1)	78	567	0.67
平成22年度 第1期	6 (1.2)	132 (26.7)	231 (46.7)	91 (18.4)	35 (7.1)	64	559	0.70
平成23年度 第1期	3 (0.6)	122 (25.5)	220 (46.0)	84 (17.6)	49 (10.3)	70	548	0.72
平成24年度 第1期	1 (0.2)	104 (22.0)	220 (46.6)	98 (20.8)	49 (10.4)	69	541	0.76
平成25年度 第1期	1 (0.2)	103 (21.7)	217 (45.7)	96 (20.2)	58 (12.2)	57	532	0.75
第2期	1 (0.2)	92 (19.4)	230 (48.4)	95 (20.0)	57 (12.0)	57	532	0.78
第3期	2 (0.4)	82 (17.2)	231 (48.4)	108 (22.6)	54 (11.3)	52	529	0.80
第4期	2 (0.5)	79 (18.5)	196 (46.0)	93 (21.8)	56 (13.1)	103	529	0.80
平成26年度 第1期	2 (0.4)	82 (17.8)	225 (48.8)	96 (20.8)	56 (12.1)	64	525	0.77
第2期	2 (0.4)	84 (18.1)	221 (47.5)	101 (21.7)	57 (12.3)	58	523	0.80
第3期	1 (0.2)	69 (14.9)	224 (48.3)	103 (22.2)	67 (14.4)	58	522	0.82
第4期	2 (0.5)	72 (16.5)	195 (44.6)	110 (25.2)	58 (13.3)	83	520	0.85
平成27年度 第1期	1 (0.2)	74 (15.8)	226 (48.2)	105 (22.4)	63 (13.4)	51	520	0.84
第2期	3 (0.6)	76 (16.3)	207 (44.3)	125 (26.8)	56 (12.0)	52	519	0.84
第3期	3 (0.6)	68 (14.6)	207 (44.3)	117 (25.1)	72 (15.4)	50	517	0.88
第4期	2 (0.5)	64 (15.0)	183 (43.0)	104 (24.4)	73 (17.1)	89	515	0.85

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

	身体状況の総合スコア					計	1～3未満 (再掲)
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	不明		
平成5年度 第1期	214 (56.8)	101 (26.8)	50 (13.3)	12 (3.2)	8	385	315 (83.6)
平成6年度 第1期	254 (56.1)	135 (29.8)	51 (11.3)	13 (2.9)	10	463	389 (85.9)
平成7年度 第1期	269 (55.5)	140 (28.9)	61 (12.6)	15 (3.1)	5	490	409 (84.2)
平成8年度 第1期	293 (53.8)	162 (29.7)	75 (13.8)	15 (2.8)	8	553	455 (83.0)
平成9年度 第1期	232 (39.9)	233 (40.0)	110 (18.9)	7 (1.2)	39	621	465 (79.9)
平成10年度 第1期	217 (35.4)	268 (43.7)	121 (19.7)	7 (1.1)	45	658	485 (79.1)
平成11年度 第1期	217 (34.3)	247 (39.0)	157 (24.8)	12 (1.9)	33	666	464 (73.3)
平成12年度 第1期	197 (31.2)	268 (42.4)	156 (24.7)	11 (1.7)	45	677	465 (73.6)
平成13年度 第1期	187 (29.5)	261 (41.2)	175 (27.6)	11 (1.7)	32	666	448 (70.7)
平成14年度 第1期	191 (29.8)	280 (43.6)	157 (24.5)	14 (2.2)	24	666	471 (73.4)
平成15年度 第1期	177 (28.0)	253 (40.0)	184 (29.1)	19 (3.0)	29	662	430 (67.9)
平成16年度 第1期	166 (27.0)	268 (43.6)	160 (26.1)	20 (3.3)	31	645	434 (70.7)
平成17年度 第1期	160 (26.7)	257 (42.8)	168 (28.0)	15 (2.5)	33	633	417 (69.5)
平成18年度 第1期	157 (26.1)	241 (40.1)	183 (30.4)	20 (3.3)	16	617	398 (66.1)
平成19年度 第1期	154 (26.7)	240 (41.6)	163 (28.2)	20 (3.5)	24	601	394 (68.3)
平成20年度 第1期	151 (26.5)	233 (40.9)	162 (28.4)	24 (4.2)	17	587	384 (67.4)
平成21年度 第1期	137 (25.0)	230 (42.0)	168 (30.7)	12 (2.2)	20	567	367 (67.0)
平成22年度 第1期	143 (26.3)	216 (39.8)	165 (30.4)	19 (3.5)	16	559	359 (66.1)
平成23年度 第1期	137 (25.8)	219 (41.2)	152 (28.6)	24 (4.5)	16	548	356 (66.9)
平成24年度 第1期	144 (27.6)	205 (39.3)	160 (30.7)	13 (2.5)	19	541	349 (66.6)
平成25年度 第1期	133 (26.1)	206 (40.5)	156 (30.6)	14 (2.8)	23	532	339 (66.5)
第2期	140 (27.6)	186 (36.6)	165 (32.5)	17 (3.3)	24	532	326 (64.2)
第3期	138 (27.3)	187 (37.0)	162 (32.0)	19 (3.8)	23	529	325 (64.2)
第4期	138 (26.8)	189 (36.7)	167 (32.4)	21 (4.1)	14	529	327 (63.5)
平成26年度 第1期	141 (27.4)	199 (38.6)	162 (31.5)	13 (2.5)	10	525	340 (66.0)
第2期	138 (27.1)	188 (36.9)	169 (33.1)	15 (2.9)	13	523	326 (63.9)
第3期	144 (27.9)	179 (34.7)	175 (33.9)	18 (3.5)	6	522	323 (62.6)
第4期	140 (27.5)	183 (36.0)	166 (32.6)	20 (3.9)	11	520	323 (63.5)
平成27年度 第1期	131 (25.8)	198 (39.1)	162 (32.0)	16 (3.2)	13	520	329 (64.9)
第2期	131 (25.8)	188 (37.0)	176 (34.6)	13 (2.6)	11	519	319 (62.7)
第3期	135 (26.7)	181 (35.8)	174 (34.5)	15 (3.0)	12	517	316 (62.6)
第4期	138 (27.7)	171 (34.3)	177 (35.5)	13 (2.6)	16	515	309 (61.8)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

	日常生活動作					計	1 および 2 (再掲)
	1	2	3	4 (4~8)	不明		
平成5年度 第1期	236 (66.5)	86 (24.2)	19 (5.4)	14 (3.9)	30	385	322 (90.7)
平成6年度 第1期	280 (67.8)	90 (21.8)	22 (5.3)	21 (5.1)	50	463	370 (89.6)
平成7年度 第1期	287 (66.3)	103 (23.8)	17 (3.9)	26 (6.0)	57	490	390 (90.1)
平成8年度 第1期	330 (66.8)	110 (22.3)	28 (5.7)	26 (5.3)	59	553	440 (89.1)
平成9年度 第1期	236 (43.5)	159 (29.3)	75 (13.8)	73 (13.4)	78	621	395 (72.7)
平成10年度 第1期	230 (40.4)	181 (31.8)	88 (15.4)	71 (12.5)	88	658	411 (72.1)
平成11年度 第1期	224 (37.9)	199 (33.7)	83 (14.0)	85 (14.4)	75	666	423 (71.6)
平成12年度 第1期	202 (34.9)	197 (34.1)	88 (15.2)	91 (15.7)	99	677	399 (69.0)
平成13年度 第1期	196 (33.9)	196 (33.9)	99 (17.1)	88 (15.2)	87	666	392 (67.7)
平成14年度 第1期	192 (32.5)	205 (34.7)	106 (17.9)	88 (14.9)	75	666	397 (67.2)
平成15年度 第1期	176 (30.5)	186 (32.2)	121 (21.0)	94 (16.3)	85	662	362 (62.7)
平成16年度 第1期	171 (28.0)	191 (31.3)	139 (22.7)	110 (18.0)	34	645	362 (59.2)
平成17年度 第1期	173 (29.1)	191 (32.1)	117 (19.7)	114 (19.2)	38	633	364 (61.2)
平成18年度 第1期	155 (25.1)	186 (30.1)	124 (20.1)	123 (19.9)	29	617	341 (55.3)
平成19年度 第1期	153 (27.0)	182 (32.1)	124 (21.9)	108 (19.0)	34	601	335 (59.1)
平成20年度 第1期	145 (25.5)	175 (30.8)	140 (24.6)	109 (19.2)	18	587	320 (56.2)
平成21年度 第1期	143 (26.4)	165 (30.5)	135 (25.0)	98 (18.1)	26	567	308 (56.9)
平成22年度 第1期	140 (25.7)	167 (30.6)	122 (22.4)	116 (21.3)	14	559	307 (56.3)
平成23年度 第1期	138 (26.1)	159 (30.1)	122 (23.1)	109 (20.6)	20	548	297 (56.3)
平成24年度 第1期	139 (26.7)	151 (29.0)	120 (23.0)	111 (21.3)	20	541	290 (55.7)
平成25年度 第1期	129 (25.3)	143 (28.1)	123 (24.2)	114 (22.4)	23	532	272 (53.4)
第2期	131 (25.8)	134 (26.4)	129 (25.4)	113 (22.3)	25	532	265 (52.3)
第3期	128 (25.3)	135 (26.7)	131 (25.9)	112 (22.1)	23	529	263 (52.0)
第4期	132 (25.9)	134 (26.3)	125 (24.6)	118 (23.2)	20	529	266 (52.3)
平成26年度 第1期	126 (24.7)	142 (27.8)	121 (23.7)	122 (23.9)	14	525	268 (52.4)
第2期	121 (23.8)	136 (26.8)	127 (25.0)	124 (24.4)	15	523	257 (50.6)
第3期	125 (24.8)	133 (26.4)	115 (22.8)	131 (26.0)	18	522	258 (51.2)
第4期	127 (25.1)	136 (26.9)	119 (23.6)	123 (24.4)	15	520	263 (52.1)
平成27年度 第1期	118 (23.5)	132 (26.2)	133 (26.4)	120 (23.9)	17	520	250 (49.7)
第2期	120 (24.0)	130 (25.9)	132 (26.3)	119 (23.8)	18	519	250 (49.9)
第3期	117 (23.4)	132 (26.5)	133 (26.7)	117 (23.4)	18	517	249 (49.9)
第4期	118 (23.7)	129 (26.0)	130 (26.2)	120 (24.1)	18	515	247 (49.7)

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

	HIV-RNA 量					計	中央値
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	不明		
平成9年度 第1期	109 (30.0)	30 (8.3)	112 (30.9)	112 (30.9)	258	621	2600
平成10年度 第1期	207 (38.3)	71 (13.1)	161 (29.8)	102 (18.9)	117	658	930
平成11年度 第1期	284 (48.6)	52 (8.9)	161 (27.6)	87 (14.9)	82	666	435
平成12年度 第1期	325 (55.1)	48 (8.1)	135 (22.9)	82 (13.9)	87	677	400 未満
平成13年度 第1期	346 (59.9)	39 (6.7)	118 (20.4)	75 (13.0)	88	666	400 未満
平成14年度 第1期	356 (60.4)	48 (8.1)	113 (19.2)	72 (12.2)	77	666	400 未満
平成15年度 第1期	353 (62.5)	34 (6.0)	93 (16.5)	85 (15.0)	97	662	400 未満
平成16年度 第1期	371 (64.0)	40 (6.9)	86 (14.8)	83 (14.3)	65	645	400 未満
平成17年度 第1期	379 (68.7)	24 (4.3)	71 (12.9)	78 (14.1)	81	633	400 未満
平成18年度 第1期	410 (73.5)	29 (5.2)	68 (12.2)	51 (9.1)	59	617	400 未満
平成19年度 第1期	414 (76.2)	27 (5.0)	51 (9.4)	51 (9.4)	58	601	400 未満
平成20年度 第1期	415 (77.9)	37 (6.9)	44 (8.3)	37 (6.9)	54	587	400 未満
平成21年度 第1期	443 (84.9)	16 (3.1)	32 (6.1)	31 (5.9)	45	567	400 未満
平成22年度 第1期	467 (90.0)	8 (1.5)	33 (6.4)	11 (2.1)	40	559	400 未満
平成23年度 第1期	460 (90.0)	13 (2.5)	23 (4.5)	15 (2.9)	37	548	400 未満
平成24年度 第1期	461 (91.5)	10 (2.0)	18 (3.6)	15 (3.0)	37	541	400 未満
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	470 (94.6)	8 (1.6)	12 (2.4)	7 (1.4)	35	532	400 未満
	472 (95.0)	6 (1.2)	12 (2.4)	7 (1.4)	35	532	400 未満
	483 (96.0)	6 (1.2)	10 (2.0)	4 (0.8)	26	529	400 未満
	437 (96.3)	5 (1.1)	8 (1.8)	4 (0.9)	75	529	400 未満
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	469 (96.1)	4 (0.8)	13 (2.7)	2 (0.4)	37	525	400 未満
	472 (95.5)	8 (1.6)	8 (1.6)	6 (1.2)	29	523	400 未満
	471 (95.0)	7 (1.4)	13 (2.6)	5 (1.0)	26	522	400 未満
	430 (95.1)	4 (0.9)	14 (3.1)	4 (0.9)	68	520	400 未満
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	475 (96.3)	1 (0.2)	14 (2.8)	3 (0.6)	27	520	400 未満
	475 (95.8)	9 (1.8)	7 (1.4)	5 (1.0)	23	519	400 未満
	477 (96.6)	5 (1.0)	8 (1.6)	4 (0.8)	23	517	400 未満
	436 (97.1)	6 (1.3)	5 (1.1)	2 (0.4)	66	515	400 未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分								計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	その他	不明	
平成5年度 第1期	4 (57.1)	0 (0.0)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	378	385
平成6年度 第1期	128 (39.4)	28 (8.6)	128 (39.4)	41 (12.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	138	463
平成7年度 第1期	128 (34.0)	39 (10.4)	147 (39.1)	62 (16.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	114	490
平成8年度 第1期	133 (32.0)	33 (8.0)	155 (37.3)	93 (22.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	138	553
平成9年度 第1期	132 (23.7)	20 (3.6)	58 (10.4)	220 (39.5)	92 (16.5)	0 (0.0)	35 (6.3)	64	621
平成10年度 第1期	128 (21.1)	31 (5.1)	24 (3.9)	168 (27.6)	229 (37.7)	2 (0.3)	26 (4.3)	50	658
平成11年度 第1期	126 (20.2)	30 (4.8)	17 (2.7)	125 (20.1)	299 (48.0)	6 (1.0)	20 (3.2)	43	666
平成12年度 第1期	119 (19.2)	41 (6.6)	12 (1.9)	96 (15.5)	279 (44.9)	34 (5.5)	40 (6.4)	56	677
平成13年度 第1期	98 (16.3)	33 (5.5)	12 (2.0)	83 (13.8)	275 (45.6)	63 (10.4)	39 (6.5)	63	666
平成14年度 第1期	113 (17.9)	51 (8.1)	6 (1.0)	77 (12.2)	251 (39.8)	90 (14.3)	42 (6.7)	36	666
平成15年度 第1期	100 (16.6)	63 (10.4)	4 (0.7)	66 (10.9)	223 (36.9)	97 (16.1)	51 (8.4)	58	662
平成16年度 第1期	107 (17.0)	67 (10.6)	4 (0.6)	58 (9.2)	239 (37.9)	111 (17.6)	45 (7.1)	14	645
平成17年度 第1期	98 (16.0)	65 (10.6)	3 (0.5)	54 (8.8)	229 (37.4)	111 (18.1)	53 (8.6)	20	633
平成18年度 第1期	91 (15.2)	60 (10.1)	5 (0.8)	39 (6.5)	241 (40.4)	114 (19.1)	47 (7.9)	20	617
平成19年度 第1期	76 (13.1)	45 (7.7)	3 (0.5)	31 (5.3)	267 (45.9)	113 (19.4)	47 (8.1)	19	601
平成20年度 第1期	70 (12.2)	33 (5.7)	2 (0.3)	29 (5.0)	275 (47.7)	112 (19.4)	55 (9.5)	11	587
平成21年度 第1期	63 (11.2)	28 (5.0)	1 (0.2)	22 (3.9)	243 (43.3)	111 (19.8)	93 (16.6)	6	567
平成22年度 第1期	54 (9.8)	26 (4.7)	1 (0.2)	17 (3.1)	212 (38.4)	108 (19.6)	134 (24.3)	7	559
平成23年度 第1期	47 (8.6)	26 (4.8)	1 (0.2)	14 (2.6)	188 (34.4)	99 (18.1)	171 (31.3)	2	548
平成24年度 第1期	39 (7.4)	16 (3.0)	0 (0.0)	13 (2.5)	164 (31.0)	87 (16.4)	210 (39.7)	12	541
平成25年度 第1期	30 (5.7)	12 (2.3)	0 (0.0)	9 (1.7)	129 (24.6)	90 (17.1)	255 (48.6)	7	532
平成25年度 第2期	27 (5.2)	10 (1.9)	0 (0.0)	8 (1.5)	124 (23.7)	90 (17.2)	265 (50.6)	8	532
平成25年度 第3期	26 (5.0)	9 (1.7)	0 (0.0)	8 (1.5)	117 (22.5)	89 (17.1)	271 (52.1)	9	529
平成25年度 第4期	25 (4.8)	12 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.3)	114 (22.0)	85 (16.4)	276 (53.2)	10	529
平成26年度 第1期	24 (4.6)	10 (1.9)	0 (0.0)	8 (1.5)	118 (22.7)	82 (15.8)	277 (53.4)	6	525
平成26年度 第2期	24 (4.6)	9 (1.7)	0 (0.0)	9 (1.7)	97 (18.7)	74 (14.3)	305 (58.9)	5	523
平成26年度 第3期	24 (4.6)	9 (1.7)	0 (0.0)	9 (1.7)	89 (17.1)	70 (13.5)	318 (61.3)	3	522
平成26年度 第4期	24 (4.7)	9 (1.8)	0 (0.0)	10 (1.9)	80 (15.6)	69 (13.4)	322 (62.6)	5	519
平成27年度 第1期	23 (4.4)	10 (1.9)	0 (0.0)	7 (1.4)	69 (13.3)	64 (12.4)	344 (66.5)	3	525
平成27年度 第2期	21 (4.1)	11 (2.1)	0 (0.0)	7 (1.4)	65 (12.6)	60 (11.7)	351 (68.2)	4	523
平成27年度 第3期	19 (3.7)	10 (1.9)	0 (0.0)	7 (1.4)	59 (11.5)	56 (10.9)	363 (70.6)	3	522
平成27年度 第4期	17 (3.4)	11 (2.2)	0 (0.0)	8 (1.6)	56 (11.1)	56 (11.1)	355 (70.6)	12	519

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

	服 用 状 況						投与 なし	投与 不明	計	
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成9年度 第1期	301 (78.6)	45 (11.7)	25 (6.5)	8 (2.1)	4 (1.0)	22	152	64	621	
平成10年度 第1期	346 (79.9)	57 (13.2)	21 (4.8)	6 (1.4)	3 (0.7)	16	159	50	658	
平成11年度 第1期	377 (84.0)	54 (12.0)	12 (2.7)	6 (1.3)	0 (0.0)	18	156	43	666	
平成12年度 第1期	376 (86.0)	39 (8.9)	14 (3.2)	8 (1.8)	0 (0.0)	24	160	56	677	
平成13年度 第1期	378 (85.3)	43 (9.7)	14 (3.2)	7 (1.6)	1 (0.2)	29	131	63	666	
平成14年度 第1期	388 (87.8)	34 (7.7)	14 (3.2)	6 (1.4)	0 (0.0)	24	164	36	666	
平成15年度 第1期	380 (89.6)	32 (7.5)	9 (2.1)	3 (0.7)	0 (0.0)	17	163	58	662	
平成16年度 第1期	403 (88.4)	34 (7.5)	9 (2.0)	5 (1.1)	5 (1.1)	1	174	14	645	
平成17年度 第1期	407 (90.8)	20 (4.5)	10 (2.2)	6 (1.3)	5 (1.1)	2	163	20	633	
平成18年度 第1期	406 (91.0)	21 (4.7)	12 (2.7)	6 (1.3)	1 (0.2)	0	151	20	617	
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	121	19	601	
平成20年度 第1期	439 (93.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.6)	4	103	11	587	
平成21年度 第1期	438 (93.8)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	91	6	567	
平成22年度 第1期	438 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	80	7	559	
平成23年度 第1期	453 (96.4)	9 (1.9)	5 (1.1)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	73	2	548	
平成24年度 第1期	458 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	55	12	541	
平成25年度	第1期	470 (97.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	42	7	532
	第2期	471 (96.7)	6 (1.2)	4 (0.8)	1 (0.2)	5 (1.0)	0	37	8	532
	第3期	471 (97.1)	5 (1.0)	3 (0.6)	3 (0.6)	3 (0.6)	0	35	9	529
	第4期	468 (97.1)	7 (1.5)	1 (0.2)	2 (0.4)	4 (0.8)	0	37	10	529
平成26年度	第1期	466 (96.3)	17 (3.5)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	34	6	525
	第2期	467 (96.5)	14 (2.9)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	33	5	523
	第3期	466 (96.1)	14 (2.9)	4 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	33	3	522
	第4期	460 (96.4)	15 (3.1)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	33	5	519
平成27年度	第1期	469 (96.9)	9 (1.9)	0 (0.0)	3 (0.6)	3 (0.6)	0	33	3	520
	第2期	469 (97.1)	9 (1.9)	2 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.4)	0	32	4	519
	第3期	474 (97.7)	8 (1.6)	1 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.4)	0	29	3	517
	第4期	464 (97.7)	9 (1.9)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.2)	0	28	12	515

(): 各行の計より投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度第1期	93 (23.0)	—	—	405	42 (10.4)	16 (4.0)	9 (2.2)	12 (3.0)
平成10年度第1期	127 (28.3)	—	—	449	45 (10.0)	49 (10.9)	7 (1.6)	6 (1.3)
平成11年度第1期	139 (29.8)	—	—	467	37 (7.9)	82 (17.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
平成12年度第1期	141 (30.6)	—	—	461	30 (6.5)	88 (19.1)	9 (2.0)	8 (1.7)
平成13年度第1期	143 (30.3)	—	—	472	30 (6.4)	80 (16.9)	5 (1.1)	5 (1.1)
平成14年度第1期	145 (31.1)	—	—	466	27 (5.8)	75 (16.1)	3 (0.6)	8 (1.7)
平成15年度第1期	143 (32.4)	—	—	441	26 (5.9)	59 (13.4)	3 (0.7)	5 (1.1)
平成16年度第1期	175 (38.3)	274 (60.0)	8 (1.8)	457	28 (6.1)	67 (14.7)	5 (1.1)	12 (2.6)
平成17年度第1期	166 (36.9)	271 (60.2)	13 (2.9)	450	25 (5.6)	60 (13.3)	4 (0.9)	13 (2.9)
平成18年度第1期	156 (35.0)	261 (58.5)	29 (6.5)	446	22 (4.9)	59 (13.2)	7 (1.6)	12 (2.7)
平成19年度第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
平成20年度第1期	149 (31.5)	306 (64.7)	18 (3.8)	473	20 (4.2)	32 (6.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成21年度第1期	130 (27.7)	323 (68.7)	17 (3.6)	470	12 (2.6)	27 (5.7)	3 (0.6)	9 (1.9)
平成22年度第1期	130 (27.5)	332 (70.3)	10 (2.1)	472	15 (3.2)	25 (5.3)	1 (0.2)	7 (1.5)
平成23年度第1期	126 (26.6)	330 (69.8)	17 (3.6)	473	15 (3.2)	18 (3.8)	2 (0.4)	4 (0.8)
平成24年度第1期	111 (23.4)	352 (74.3)	11 (2.3)	474	13 (2.7)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
平成25年度第1期	103 (21.3)	371 (76.8)	9 (1.9)	483	8 (1.7)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)
第2期	103 (21.1)	373 (76.6)	11 (2.3)	487	10 (2.1)	16 (3.3)	2 (0.4)	8 (1.6)
第3期	104 (21.4)	371 (76.5)	10 (2.1)	485	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.2)
第4期	104 (21.6)	368 (76.3)	10 (2.1)	482	7 (1.5)	17 (3.5)	1 (0.2)	6 (1.2)
平成26年度第1期	75 (15.5)	395 (81.4)	15 (3.1)	485	7 (1.4)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
第2期	74 (15.3)	398 (82.1)	13 (2.7)	485	7 (1.4)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
第3期	72 (14.8)	400 (82.3)	14 (2.9)	486	8 (1.6)	15 (3.1)	4 (0.8)	1 (0.2)
第4期	71 (14.8)	394 (81.9)	16 (3.3)	481	7 (1.5)	14 (2.9)	4 (0.8)	1 (0.2)
平成27年度第1期	67 (13.8)	410 (84.7)	7 (1.4)	484	9 (1.9)	11 (2.3)	3 (0.6)	4 (0.8)
第2期	66 (13.7)	410 (84.9)	7 (1.4)	483	9 (1.9)	13 (2.7)	3 (0.6)	3 (0.6)
第3期	67 (13.8)	413 (85.2)	5 (1.0)	485	10 (2.1)	12 (2.5)	3 (0.6)	3 (0.6)
第4期	64 (13.5)	405 (85.3)	6 (1.3)	475	8 (1.7)	11 (2.3)	3 (0.6)	4 (0.8)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-3-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (各時点の事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	9 (2.2)	9 (2.2)	9 (2.2)	5 (1.2)	—	—	—	20 (4.9)
平成10年度 第1期	11 (2.4)	10 (2.2)	13 (2.9)	12 (2.7)	—	—	—	31 (6.9)
平成11年度 第1期	4 (0.9)	15 (3.2)	7 (1.5)	6 (1.3)	—	—	—	23 (4.9)
平成12年度 第1期	2 (0.4)	10 (2.2)	7 (1.5)	9 (2.0)	—	—	—	24 (5.2)
平成13年度 第1期	3 (0.6)	11 (2.3)	7 (1.5)	7 (1.5)	—	—	—	34 (7.2)
平成14年度 第1期	4 (0.9)	14 (3.0)	7 (1.5)	2 (0.4)	19 (4.1)	18 (3.9)	—	19 (4.1)
平成15年度 第1期	4 (0.9)	15 (3.4)	4 (0.9)	6 (1.4)	25 (5.7)	47 (10.7)	—	17 (3.9)
平成16年度 第1期	3 (0.7)	18 (3.9)	12 (2.6)	11 (2.4)	20 (4.4)	51 (11.2)	—	33 (7.2)
平成17年度 第1期	2 (0.4)	16 (3.6)	7 (1.6)	11 (2.4)	29 (6.4)	41 (9.1)	—	37 (8.2)
平成18年度 第1期	4 (0.9)	12 (2.7)	12 (2.7)	8 (1.8)	18 (4.0)	42 (9.4)	21 (4.7)	26 (5.8)
平成19年度 第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
平成20年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	21 (4.4)	44 (9.3)	29 (6.1)	30 (6.3)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.5)	27 (5.7)	26 (5.5)
平成22年度 第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.4)	28 (5.9)	20 (4.2)
平成23年度 第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.5)	24 (5.1)	19 (4.0)
平成24年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.2)	15 (3.2)	20 (4.2)
平成25年度 第1期	2 (0.4)	6 (1.2)	6 (1.2)	5 (1.0)	12 (2.5)	43 (8.9)	17 (3.5)	17 (3.5)
第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.2)	6 (1.2)	13 (2.7)	43 (8.8)	17 (3.5)	18 (3.7)
第3期	3 (0.6)	7 (1.4)	5 (1.0)	7 (1.4)	11 (2.3)	42 (8.7)	16 (3.3)	22 (4.5)
第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.0)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.7)	14 (2.9)	18 (3.7)
平成26年度 第1期	4 (0.8)	6 (1.2)	3 (0.6)	4 (0.8)	13 (2.7)	32 (6.6)	8 (1.6)	14 (2.9)
第2期	4 (0.8)	6 (1.2)	4 (0.8)	5 (1.0)	13 (2.7)	32 (6.6)	7 (1.4)	13 (2.7)
第3期	4 (0.8)	6 (1.2)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.3)	32 (6.6)	6 (1.2)	13 (2.7)
第4期	4 (0.8)	6 (1.2)	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	31 (6.4)	5 (1.0)	14 (2.9)
平成27年度 第1期	3 (0.6)	6 (1.2)	6 (1.2)	5 (1.0)	13 (2.7)	33 (6.8)	4 (0.8)	13 (2.7)
第2期	3 (0.6)	5 (1.0)	6 (1.2)	5 (1.0)	13 (2.7)	32 (6.6)	4 (0.8)	11 (2.3)
第3期	3 (0.6)	3 (0.6)	7 (1.4)	5 (1.0)	11 (2.3)	32 (6.6)	4 (0.8)	10 (2.1)
第4期	4 (0.8)	2 (0.4)	6 (1.3)	2 (0.4)	10 (2.1)	31 (6.5)	4 (0.8)	10 (2.1)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	C D 4 値						計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成5年度 第4期	8 (2.0)	125 (31.3)	118 (29.5)	96 (24.0)	53 (13.3)	17	417	287	289
平成6年度 第1期	15 (5.0)	92 (30.6)	90 (29.9)	61 (20.3)	43 (14.3)	116	417	276	288
平成7年度 第1期	64 (18.7)	93 (27.2)	78 (22.8)	65 (19.0)	42 (12.3)	75	417	233	293
平成8年度 第1期	99 (28.1)	76 (21.6)	79 (22.4)	62 (17.6)	36 (10.2)	65	417	203	302
平成9年度 第1期	114 (29.8)	77 (20.1)	79 (20.6)	70 (18.3)	43 (11.2)	34	417	206	307
平成10年度 第1期	121 (31.5)	60 (15.6)	81 (21.1)	69 (18.0)	53 (13.8)	33	417	220	340
平成11年度 第1期	129 (33.0)	39 (10.0)	86 (22.0)	79 (20.2)	58 (14.8)	26	417	251	364
平成12年度 第1期	135 (33.8)	33 (8.3)	88 (22.1)	72 (18.0)	71 (17.8)	18	417	271	368
平成13年度 第1期	141 (36.2)	32 (8.2)	68 (17.5)	79 (20.3)	69 (17.7)	28	417	243	390
平成14年度 第1期	148 (38.0)	26 (6.7)	75 (19.3)	61 (15.7)	79 (20.3)	28	417	247	392
平成15年度 第1期	157 (40.4)	33 (8.5)	66 (17.0)	63 (16.2)	70 (18.0)	28	417	221	399
平成16年度 第1期	163 (40.8)	30 (7.5)	67 (16.8)	72 (18.0)	68 (17.0)	17	417	222	400
平成17年度 第1期	173 (44.0)	24 (6.1)	59 (15.0)	61 (15.5)	76 (19.3)	24	417	196	407
平成18年度 第1期	180 (45.2)	33 (8.3)	64 (16.1)	45 (11.3)	76 (19.1)	19	417	166	377
平成19年度 第1期	187 (46.9)	24 (6.0)	67 (16.8)	54 (13.5)	67 (16.8)	18	417	151	380
平成20年度 第1期	198 (49.0)	30 (7.4)	53 (13.1)	69 (17.1)	54 (13.4)	13	417	67	397
平成21年度 第1期	205 (50.9)	14 (3.5)	55 (13.6)	51 (12.7)	78 (19.4)	14	417	*	419
平成22年度 第1期	208 (51.5)	22 (5.4)	49 (12.1)	57 (14.1)	68 (16.8)	13	417	*	412
平成23年度 第1期	218 (54.0)	17 (4.2)	49 (12.1)	56 (13.9)	64 (15.8)	13	417	*	442
平成24年度 第1期	220 (54.9)	10 (2.5)	48 (12.0)	54 (13.5)	69 (17.2)	16	417	*	457
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	222 (55.1)	15 (3.7)	44 (10.9)	43 (10.7)	79 (19.6)	14	417	*	463
	223 (54.9)	13 (3.2)	36 (8.9)	59 (14.5)	75 (18.5)	11	417	*	445
	223 (55.2)	18 (4.5)	37 (9.2)	47 (11.6)	79 (19.6)	13	417	*	467
	225 (57.0)	14 (3.5)	37 (9.4)	46 (11.6)	73 (18.5)	22	417	*	448
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	225 (55.4)	14 (3.4)	35 (8.6)	48 (11.8)	84 (20.7)	11	417	*	452
	226 (55.9)	15 (3.7)	33 (8.2)	45 (11.1)	85 (21.0)	13	417	*	483
	228 (55.9)	12 (2.9)	29 (7.1)	44 (10.8)	95 (23.3)	9	417	*	517
	228 (56.9)	11 (2.7)	27 (6.7)	50 (12.5)	85 (21.2)	16	417	*	490
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	229 (55.9)	12 (2.9)	39 (9.5)	44 (10.7)	86 (21.0)	7	417	*	479
	230 (56.2)	11 (2.7)	36 (8.8)	41 (10.0)	91 (22.2)	8	417	*	501
	230 (56.1)	11 (2.7)	31 (7.6)	47 (11.5)	91 (22.2)	7	417	*	505
	230 (57.6)	10 (2.5)	36 (9.0)	38 (9.5)	85 (21.3)	18	417	*	500

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	CD4/CD8比							計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明		AIDS発病・死亡	
									含む	含まず
平成5年度 第4期	8 (2.0)	39 (9.9)	227 (57.9)	106 (27.0)	11 (2.8)	1 (0.3)	25	417	0.33	0.33
平成6年度 第1期	15 (5.1)	41 (13.9)	153 (51.7)	80 (27.0)	4 (1.4)	3 (1.0)	121	417	0.30	0.31
平成7年度 第1期	64 (18.7)	30 (8.8)	153 (44.7)	88 (25.7)	7 (2.0)	0 (0.0)	75	417	0.26	0.35
平成8年度 第1期	99 (28.1)	33 (9.4)	146 (41.5)	70 (19.9)	4 (1.1)	0 (0.0)	65	417	0.20	0.34
平成9年度 第1期	114 (30.2)	16 (4.2)	150 (39.7)	91 (24.1)	7 (1.9)	0 (0.0)	39	417	0.26	0.40
平成10年度 第1期	121 (31.7)	12 (3.1)	131 (34.3)	104 (27.2)	12 (3.1)	2 (0.5)	35	417	0.28	0.45
平成11年度 第1期	129 (33.9)	12 (3.1)	123 (32.3)	96 (25.2)	19 (5.0)	2 (0.5)	36	417	0.29	0.48
平成12年度 第1期	135 (34.5)	6 (1.5)	120 (30.7)	102 (26.1)	21 (5.4)	7 (1.8)	26	417	0.34	0.50
平成13年度 第1期	141 (37.3)	4 (1.1)	103 (27.2)	102 (27.0)	26 (6.9)	2 (0.5)	39	417	0.30	0.53
平成14年度 第1期	148 (39.2)	1 (0.3)	98 (25.9)	98 (25.9)	27 (7.1)	6 (1.6)	39	417	0.31	0.53
平成15年度 第1期	157 (42.1)	2 (0.5)	90 (24.1)	87 (23.3)	30 (8.0)	7 (1.9)	44	417	0.28	0.56
平成16年度 第1期	163 (43.5)	3 (0.8)	84 (22.4)	90 (24.0)	27 (7.2)	8 (2.1)	42	417	0.25	0.55
平成17年度 第1期	173 (45.8)	4 (1.1)	72 (19.0)	95 (25.1)	24 (6.3)	10 (2.6)	39	417	0.21	0.58
平成18年度 第1期	180 (46.5)	5 (1.3)	63 (16.3)	106 (27.4)	20 (5.2)	13 (3.4)	30	417	0.17	0.64
平成19年度 第1期	187 (48.7)	1 (0.3)	62 (16.1)	87 (22.7)	32 (8.3)	15 (3.9)	33	417	0.16	0.64
平成20年度 第1期	198 (50.5)	4 (1.0)	56 (14.3)	86 (21.9)	36 (9.2)	12 (3.1)	25	417	*	0.68
平成21年度 第1期	205 (53.5)	2 (0.5)	47 (12.3)	73 (19.1)	45 (11.7)	11 (2.9)	34	417	*	0.71
平成22年度 第1期	208 (52.8)	2 (0.5)	51 (12.9)	83 (21.1)	39 (9.9)	11 (2.8)	23	417	*	0.74
平成23年度 第1期	218 (55.6)	2 (0.5)	38 (9.7)	79 (20.2)	34 (8.7)	21 (5.4)	25	417	*	0.77
平成24年度 第1期	220 (56.1)	0 (0.0)	35 (8.9)	68 (17.3)	47 (12.0)	22 (5.6)	25	417	*	0.85
平成25年度 第1期	222 (55.9)	1 (0.3)	32 (8.1)	78 (19.6)	41 (10.3)	23 (5.8)	20	417	*	0.80
第2期	223 (56.2)	1 (0.3)	30 (7.6)	83 (20.9)	39 (9.8)	21 (5.3)	20	417	*	0.79
第3期	223 (56.3)	1 (0.3)	25 (6.3)	82 (20.7)	42 (10.6)	23 (5.8)	21	417	*	0.81
第4期	225 (58.3)	2 (0.5)	29 (7.5)	67 (17.4)	37 (9.6)	26 (6.7)	31	417	*	0.88
平成26年度 第1期	225 (56.5)	2 (0.5)	27 (6.8)	80 (20.1)	45 (11.3)	19 (4.8)	19	417	*	0.82
第2期	226 (56.6)	1 (0.3)	32 (8.0)	76 (19.0)	43 (10.8)	21 (5.3)	18	417	*	0.81
第3期	228 (56.7)	1 (0.2)	30 (7.5)	70 (17.4)	44 (10.9)	29 (7.2)	15	417	*	0.84
第4期	228 (58.0)	1 (0.3)	29 (7.4)	67 (17.0)	50 (12.7)	18 (4.6)	24	417	*	0.86
平成27年度 第1期	229 (57.0)	1 (0.2)	31 (7.7)	70 (17.4)	47 (11.7)	24 (6.0)	15	417	*	0.90
第2期	230 (57.5)	1 (0.3)	27 (6.8)	66 (16.5)	55 (13.8)	21 (5.3)	17	417	*	0.88
第3期	230 (57.2)	1 (0.2)	20 (5.0)	75 (18.7)	45 (11.2)	31 (7.7)	15	417	*	0.92
第4期	230 (58.8)	1 (0.3)	22 (5.6)	67 (17.1)	39 (10.0)	32 (8.2)	26	417	*	0.90

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3 未満（再掲）			
	1～2 未満	2～3 未満	3～4 未満	4～5	AIDS 発病・ 死亡	不明		人数	AIDS 発病・死亡		
									含　　む	含まず	
平成5年度 第4期	234 (56.8)	106 (25.7)	55 (13.3)	9 (2.2)	8 (1.9)	5	417	340	(82.5)	(84.2)	
平成6年度 第1期	220 (53.9)	118 (28.9)	45 (11.0)	10 (2.5)	15 (3.7)	9	417	338	(82.8)	(86.0)	
平成7年度 第1期	197 (47.5)	97 (23.4)	49 (11.8)	8 (1.9)	64 (15.4)	2	417	294	(70.8)	(83.8)	
平成8年度 第1期	163 (39.3)	97 (23.4)	47 (11.3)	9 (2.2)	99 (23.9)	2	417	260	(62.7)	(82.3)	
平成9年度 第1期	110 (27.4)	112 (27.9)	61 (15.2)	4 (1.0)	114 (28.4)	16	417	222	(55.4)	(77.4)	
平成10年度 第1期	91 (23.1)	113 (28.7)	63 (16.0)	6 (1.5)	121 (30.7)	23	417	204	(51.8)	(74.7)	
平成11年度 第1期	91 (22.4)	103 (25.4)	74 (18.2)	9 (2.2)	129 (31.8)	11	417	194	(47.8)	(70.0)	
平成12年度 第1期	81 (20.0)	110 (27.2)	72 (17.8)	6 (1.5)	135 (33.4)	13	417	191	(47.3)	(71.0)	
平成13年度 第1期	80 (19.8)	98 (24.2)	77 (19.0)	9 (2.2)	141 (34.8)	12	417	178	(44.0)	(67.4)	
平成14年度 第1期	71 (17.4)	110 (27.0)	69 (16.9)	10 (2.5)	148 (36.3)	9	417	181	(44.4)	(69.6)	
平成15年度 第1期	62 (15.3)	95 (23.4)	80 (19.7)	12 (3.0)	157 (38.7)	11	417	157	(38.7)	(63.1)	
平成16年度 第1期	62 (15.2)	98 (24.1)	70 (17.2)	14 (3.4)	163 (40.0)	10	417	160	(39.3)	(65.6)	
平成17年度 第1期	68 (16.6)	89 (21.8)	70 (17.1)	9 (2.2)	173 (42.3)	8	417	157	(38.4)	(66.5)	
平成18年度 第1期	62 (15.3)	85 (20.9)	68 (16.7)	11 (2.7)	180 (44.3)	11	417	147	(36.2)	(65.0)	
平成19年度 第1期	57 (14.0)	91 (22.4)	60 (14.7)	12 (2.9)	187 (45.9)	10	417	148	(36.4)	(67.3)	
平成20年度 第1期	52 (12.6)	90 (21.8)	64 (15.5)	9 (2.2)	198 (47.9)	4	417	142	(34.4)	(66.0)	
平成21年度 第1期	53 (13.0)	79 (19.3)	64 (15.6)	8 (2.0)	205 (50.1)	8	417	132	(32.3)	(64.7)	
平成22年度 第1期	55 (13.4)	75 (18.3)	63 (15.4)	9 (2.2)	208 (50.7)	7	417	130	(31.7)	(64.4)	
平成23年度 第1期	49 (11.9)	73 (17.8)	61 (14.8)	10 (2.4)	218 (53.0)	6	417	122	(29.7)	(63.2)	
平成24年度 第1期	51 (12.4)	73 (17.8)	60 (14.6)	7 (1.7)	220 (53.5)	6	417	124	(30.2)	(64.9)	
平成25年度	第1期	48 (11.8)	73 (17.9)	58 (14.2)	7 (1.7)	222 (54.4)	9	417	121	(29.7)	(65.1)
	第2期	51 (12.4)	65 (15.9)	64 (15.6)	7 (1.7)	223 (54.4)	7	417	116	(28.3)	(62.0)
	第3期	49 (12.1)	61 (15.0)	66 (16.3)	7 (1.7)	223 (54.9)	11	417	110	(27.1)	(60.1)
	第4期	48 (11.7)	66 (16.0)	66 (16.0)	7 (1.7)	225 (54.6)	5	417	114	(27.7)	(61.0)
平成26年度	第1期	49 (11.8)	67 (16.2)	68 (16.4)	5 (1.2)	225 (54.3)	3	417	116	(28.0)	(61.4)
	第2期	51 (12.3)	66 (16.0)	64 (15.5)	6 (1.5)	226 (54.7)	4	417	117	(28.3)	(62.6)
	第3期	50 (12.0)	64 (15.4)	68 (16.4)	5 (1.2)	228 (54.9)	2	417	114	(27.5)	(61.0)
	第4期	51 (12.3)	65 (15.7)	63 (15.3)	6 (1.5)	228 (55.2)	4	417	116	(28.1)	(62.7)
平成27年度	第1期	49 (11.8)	67 (16.2)	65 (15.7)	4 (1.0)	229 (55.3)	3	417	116	(28.0)	(62.7)
	第2期	49 (11.8)	66 (15.9)	64 (15.4)	7 (1.7)	230 (55.3)	1	417	115	(27.6)	(61.8)
	第3期	49 (11.8)	71 (17.1)	59 (14.2)	6 (1.4)	230 (55.4)	2	417	120	(28.9)	(64.9)
	第4期	50 (12.2)	64 (15.6)	64 (15.6)	3 (0.7)	230 (56.0)	6	417	114	(27.7)	(63.0)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	日常生活動作						計	1 および 2 (再掲)		
	1	2	3	4(4～8)	AIDS発病・死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成5年度　第4期	239 (67.1)	85 (23.9)	14　(3.9)	10　(2.8)	8　(2.2)	61	417	324	(91.0)	(93.1)
平成6年度　第1期	247 (66.0)	77 (20.6)	20　(5.3)	15　(4.0)	15　(4.0)	43	417	324	(86.6)	(90.3)
平成7年度　第1期	216 (57.4)	71 (18.9)	12　(3.2)	13　(3.5)	64 (17.0)	41	417	287	(76.3)	(92.0)
平成8年度　第1期	196 (51.4)	58 (15.2)	17　(4.5)	11　(2.9)	99 (26.0)	36	417	254	(66.7)	(90.1)
平成9年度　第1期	110 (28.6)	77 (20.0)	43 (11.2)	41 (10.6)	114 (29.6)	32	417	187	(48.6)	(69.0)
平成10年度　第1期	95 (24.9)	81 (21.3)	48 (12.6)	36　(9.4)	121 (31.8)	36	417	176	(46.2)	(67.7)
平成11年度　第1期	89 (22.9)	89 (22.9)	43 (11.1)	39 (10.0)	129 (33.2)	28	417	178	(45.8)	(68.5)
平成12年度　第1期	83 (21.4)	88 (22.7)	36　(9.3)	46 (11.9)	135 (34.8)	29	417	171	(44.1)	(67.6)
平成13年度　第1期	75 (19.2)	88 (22.5)	45 (11.5)	42 (10.7)	141 (36.1)	26	417	163	(41.7)	(65.2)
平成14年度　第1期	64 (16.3)	91 (23.2)	48 (12.2)	41 (10.5)	148 (37.8)	25	417	155	(39.5)	(63.5)
平成15年度　第1期	62 (15.8)	80 (20.4)	51 (13.0)	42 (10.7)	157 (40.1)	25	417	142	(36.2)	(60.4)
平成16年度　第1期	59 (14.6)	73 (18.0)	64 (15.8)	46 (11.4)	163 (40.2)	12	417	132	(32.6)	(54.5)
平成17年度　第1期	64 (15.8)	68 (16.7)	47 (11.6)	54 (13.3)	173 (42.6)	11	417	132	(32.5)	(56.7)
平成18年度　第1期	51 (12.6)	74 (18.3)	50 (12.3)	50 (12.3)	180 (44.4)	12	417	125	(30.9)	(55.6)
平成19年度　第1期	54 (13.3)	66 (16.3)	55 (13.6)	43 (10.6)	187 (46.2)	12	417	120	(29.6)	(55.0)
平成20年度　第1期	52 (12.6)	59 (14.3)	60 (14.6)	43 (10.4)	198 (48.1)	5	417	111	(26.9)	(51.9)
平成21年度　第1期	48 (11.7)	62 (15.1)	52 (12.7)	43 (10.5)	205 (50.0)	7	417	110	(26.8)	(53.7)
平成22年度　第1期	48 (11.7)	58 (14.1)	54 (13.1)	44 (10.7)	208 (50.5)	5	417	106	(25.7)	(52.0)
平成23年度　第1期	47 (11.5)	59 (14.4)	42 (10.3)	43 (10.5)	218 (53.3)	8	417	106	(25.9)	(55.5)
平成24年度　第1期	47 (11.4)	57 (13.9)	43 (10.5)	44 (10.7)	220 (53.5)	6	417	104	(25.3)	(54.5)
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	43 (10.5)	51 (12.5)	42 (10.3)	51 (12.5)	222 (54.3)	8	417	94	(23.0)	(50.3)
	44 (10.8)	47 (11.5)	43 (10.5)	52 (12.7)	223 (54.5)	8	417	91	(22.2)	(48.9)
	45 (11.1)	49 (12.0)	43 (10.6)	47 (11.5)	223 (54.8)	10	417	94	(23.1)	(51.1)
	44 (10.7)	52 (12.6)	39　(9.5)	52 (12.6)	225 (54.6)	5	417	96	(23.3)	(51.3)
平成26年度　第1期 第2期 第3期 第4期	43 (10.4)	52 (12.6)	40　(9.7)	53 (12.8)	225 (54.5)	4	417	95	(23.0)	(50.5)
	43 (10.4)	45 (10.9)	45 (10.9)	53 (12.9)	226 (54.9)	5	417	88	(21.4)	(47.3)
	45 (11.0)	43 (10.5)	40　(9.8)	54 (13.2)	228 (55.6)	7	417	88	(21.5)	(48.4)
	43 (10.4)	48 (11.6)	41　(9.9)	53 (12.8)	228 (55.2)	4	417	91	(22.0)	(49.2)
平成27年度　第1期 第2期 第3期 第4期	39　(9.5)	52 (12.6)	43 (10.4)	49 (11.9)	229 (55.6)	5	417	91	(22.1)	(49.7)
	39　(9.4)	50 (12.1)	44 (10.6)	51 (12.3)	230 (55.6)	3	417	89	(21.5)	(48.4)
	40　(9.7)	49 (11.9)	45 (10.9)	49 (11.9)	230 (55.7)	4	417	89	(21.5)	(48.6)
	39　(9.4)	48 (11.6)	44 (10.6)	53 (12.8)	230 (55.6)	3	417	87	(21.0)	(47.3)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	HIV-RNA量							中央値	
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成9年度 第1期	52 (17.6)	18 (6.1)	56 (19.0)	55 (18.6)	114 (38.6)	122	417	32000	2800
平成10年度 第1期	89 (24.5)	36 (9.9)	70 (19.3)	47 (12.9)	121 (33.3)	54	417	6700	900
平成11年度 第1期	132 (34.4)	20 (5.2)	62 (16.1)	41 (10.7)	129 (33.6)	33	417	4250	400未満
平成12年度 第1期	148 (37.6)	17 (4.3)	58 (14.7)	36 (9.1)	135 (34.3)	23	417	3300	400未満
平成13年度 第1期	146 (37.5)	22 (5.7)	50 (12.9)	30 (7.7)	141 (36.2)	28	417	2700	400未満
平成14年度 第1期	147 (37.9)	25 (6.4)	42 (10.8)	26 (6.7)	148 (38.1)	29	417	3000	400未満
平成15年度 第1期	143 (36.9)	15 (3.9)	38 (9.8)	35 (9.0)	157 (40.5)	29	417	7800	400未満
平成16年度 第1期	154 (38.6)	14 (3.5)	32 (8.0)	36 (9.0)	163 (40.9)	18	417	8800	400未満
平成17年度 第1期	152 (39.3)	8 (2.1)	23 (5.9)	31 (8.0)	173 (44.7)	30	417	24000	400未満
平成18年度 第1期	163 (41.1)	15 (3.8)	26 (6.5)	13 (3.3)	180 (45.3)	20	417	7200	400未満
平成19年度 第1期	164 (41.1)	11 (2.8)	19 (4.8)	18 (4.5)	187 (46.9)	18	417	17000	400未満
平成20年度 第1期	169 (42.0)	10 (2.5)	12 (3.0)	13 (3.2)	198 (49.3)	15	417	100000	400未満
平成21年度 第1期	173 (43.1)	4 (1.0)	8 (2.0)	11 (2.7)	205 (51.1)	16	417	*	400未満
平成22年度 第1期	179 (44.3)	1 (0.2)	12 (3.0)	4 (1.0)	208 (51.5)	13	417	*	400未満
平成23年度 第1期	173 (42.6)	5 (1.2)	5 (1.2)	5 (1.2)	218 (53.7)	11	417	*	400未満
平成24年度 第1期	176 (43.8)	1 (0.2)	2 (0.5)	3 (0.7)	220 (54.7)	15	417	*	400未満
平成25年度	第1期	177 (43.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	222 (55.1)	14	417	*	400未満
	第2期	181 (44.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	223 (55.1)	12	417	*	400未満
	第3期	177 (43.8)	0 (0.0)	3 (0.7)	223 (55.2)	13	417	*	400未満
	第4期	167 (42.2)	1 (0.3)	2 (0.5)	225 (56.8)	21	417	*	400未満
平成26年度	第1期	177 (43.8)	0 (0.0)	2 (0.5)	225 (55.7)	13	417	*	400未満
	第2期	177 (43.8)	1 (0.2)	0 (0.0)	226 (55.9)	13	417	*	400未満
	第3期	178 (43.4)	3 (0.7)	0 (0.0)	228 (55.6)	7	417	*	400未満
	第4期	166 (41.7)	3 (0.8)	1 (0.3)	228 (57.3)	19	417	*	400未満
平成27年度	第1期	178 (43.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	229 (55.9)	7	417	*	400未満
	第2期	177 (43.1)	2 (0.5)	1 (0.2)	230 (56.0)	6	417	*	400未満
	第3期	177 (43.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	230 (56.2)	8	417	*	400未満
	第4期	166 (41.7)	2 (0.5)	0 (0.0)	230 (57.8)	19	417	*	400未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1 剤	NRTI 2 剤	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成5年度 第4期	184 (45.4)	20 (4.9)	163 (40.2)	38 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8	4	417
平成6年度 第1期	117 (39.5)	26 (8.8)	115 (38.9)	38 (12.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15	106	417
平成7年度 第1期	93 (32.7)	23 (8.1)	115 (40.5)	53 (18.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	64	69	417
平成8年度 第1期	71 (27.6)	24 (9.3)	103 (40.1)	59 (23.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	99	61	417
平成9年度 第1期	54 (19.5)	14 (5.1)	32 (11.6)	106 (38.3)	52 (18.8)	0 (0.0)	19 (6.9)	114	26	417
平成10年度 第1期	44 (16.1)	19 (6.9)	11 (4.0)	72 (26.3)	116 (42.3)	1 (0.4)	11 (4.0)	121	22	417
平成11年度 第1期	43 (15.9)	17 (6.3)	7 (2.6)	55 (20.3)	137 (50.6)	1 (0.4)	11 (4.1)	129	17	417
平成12年度 第1期	42 (15.7)	17 (6.3)	5 (1.9)	46 (17.2)	124 (46.3)	16 (6.0)	18 (6.7)	135	14	417
平成13年度 第1期	33 (12.9)	14 (5.5)	3 (1.2)	39 (15.2)	123 (48.0)	26 (10.2)	18 (7.0)	141	20	417
平成14年度 第1期	32 (12.6)	22 (8.7)	0 (0.0)	33 (13.0)	108 (42.7)	36 (14.2)	22 (8.7)	148	16	417
平成15年度 第1期	32 (12.9)	27 (10.9)	0 (0.0)	27 (10.9)	96 (38.7)	42 (16.9)	24 (9.7)	157	12	417
平成16年度 第1期	30 (12.0)	32 (12.8)	0 (0.0)	24 (9.6)	97 (38.8)	45 (18.0)	22 (8.8)	163	4	417
平成17年度 第1期	27 (11.4)	28 (11.9)	0 (0.0)	22 (9.3)	91 (38.6)	48 (20.3)	20 (8.5)	173	8	417
平成18年度 第1期	25 (10.9)	21 (9.2)	0 (0.0)	15 (6.6)	104 (45.4)	46 (20.1)	18 (7.9)	180	8	417
平成19年度 第1期	20 (8.9)	18 (8.0)	0 (0.0)	11 (4.9)	111 (49.6)	46 (20.5)	18 (8.0)	187	6	417
平成20年度 第1期	18 (8.3)	12 (5.6)	0 (0.0)	10 (4.6)	113 (52.3)	39 (18.1)	24 (11.1)	198	3	417
平成21年度 第1期	18 (8.6)	8 (3.8)	0 (0.0)	8 (3.8)	99 (47.1)	36 (17.1)	41 (19.5)	205	2	417
平成22年度 第1期	14 (6.8)	8 (3.9)	0 (0.0)	6 (2.9)	85 (41.5)	35 (17.1)	57 (27.8)	208	4	417
平成23年度 第1期	8 (4.0)	9 (4.5)	0 (0.0)	4 (2.0)	71 (35.9)	34 (17.2)	72 (36.4)	218	1	417
平成24年度 第1期	6 (3.1)	5 (2.6)	0 (0.0)	4 (2.1)	63 (32.5)	30 (15.5)	86 (44.3)	220	3	417
平成25年度 第1期	5 (2.6)	5 (2.6)	0 (0.0)	3 (1.6)	49 (25.5)	32 (16.7)	98 (51.0)	222	3	417
第2期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.6)	32 (16.8)	100 (52.4)	223	3	417
第3期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	47 (24.7)	32 (16.8)	99 (52.1)	223	4	417
第4期	5 (2.6)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	46 (24.1)	32 (16.8)	101 (52.9)	225	1	417
平成26年度 第1期	5 (2.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	2 (1.0)	48 (25.1)	31 (16.2)	102 (53.4)	225	1	417
第2期	5 (2.6)	3 (1.6)	0 (0.0)	3 (1.6)	39 (20.5)	29 (15.3)	111 (58.4)	226	1	417
第3期	5 (2.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	34 (18.1)	26 (13.8)	118 (62.8)	228	1	417
第4期	5 (2.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	4 (2.2)	29 (15.7)	25 (13.5)	120 (64.9)	228	4	417
平成27年度 第1期	5 (2.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	26 (14.0)	24 (12.9)	126 (67.7)	229	2	417
第2期	5 (2.7)	5 (2.7)	0 (0.0)	3 (1.6)	23 (12.4)	23 (12.4)	127 (68.3)	230	1	417
第3期	5 (2.7)	6 (3.2)	0 (0.0)	3 (1.6)	19 (10.2)	21 (11.3)	132 (71.0)	230	1	417
第4期	4 (2.2)	6 (3.3)	0 (0.0)	3 (1.6)	17 (9.3)	20 (11.0)	132 (72.5)	230	5	417

() : 各行の計より不明とAIDS発病・死亡を除いた数を分母とする%

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計	
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明					
平成9年度 第1期	163 (80.7)	24 (11.9)	7 (3.5)	5 (2.5)	3 (1.5)	7	68	26	114	417	
平成10年度 第1期	173 (83.6)	22 (10.6)	8 (3.9)	2 (1.0)	2 (1.0)	4	63	22	121	417	
平成11年度 第1期	171 (84.7)	25 (12.4)	5 (2.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	9	60	17	129	417	
平成12年度 第1期	174 (87.0)	18 (9.0)	5 (2.5)	3 (1.5)	0 (0.0)	9	59	14	135	417	
平成13年度 第1期	169 (85.4)	22 (11.1)	5 (2.5)	2 (1.0)	0 (0.0)	11	47	20	141	417	
平成14年度 第1期	170 (87.6)	17 (8.8)	6 (3.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	5	54	16	148	417	
平成15年度 第1期	163 (87.6)	17 (9.1)	6 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	59	12	157	417	
平成16年度 第1期	162 (86.6)	14 (7.5)	6 (3.2)	3 (1.6)	2 (1.1)	1	62	4	163	417	
平成17年度 第1期	161 (89.4)	10 (5.6)	6 (3.3)	1 (0.6)	2 (1.1)	1	55	8	173	417	
平成18年度 第1期	165 (90.2)	11 (6.0)	5 (2.7)	1 (0.5)	1 (0.5)	0	46	8	180	417	
平成19年度 第1期	170 (92.4)	11 (6.0)	3 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	38	6	187	417	
平成20年度 第1期	170 (92.4)	9 (4.9)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.5)	2	30	3	198	417	
平成21年度 第1期	171 (93.4)	6 (3.3)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	1	26	2	205	417	
平成22年度 第1期	171 (96.6)	4 (2.3)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	6	22	4	208	417	
平成23年度 第1期	171 (96.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	3	17	1	218	417	
平成24年度 第1期	178 (97.3)	3 (1.6)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11	3	220	417	
平成25年度	第1期	180 (98.9)	0 (0.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10	3	222	417
	第2期	179 (98.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	3	223	417
	第3期	178 (98.3)	0 (0.0)	2 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	0	9	4	223	417
	第4期	179 (98.4)	2 (1.1)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9	1	225	417
平成26年度	第1期	179 (97.8)	4 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8	1	225	417
	第2期	178 (97.8)	3 (1.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8	1	226	417
	第3期	177 (97.8)	2 (1.1)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	7	1	228	417
	第4期	172 (97.2)	4 (2.3)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	7	4	228	417
平成27年度	第1期	175 (97.8)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0	7	2	229	417
	第2期	172 (97.7)	2 (1.1)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	0	10	1	230	417
	第3期	173 (98.9)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0	11	1	230	417
	第4期	170 (98.8)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0	10	5	230	417

(): 各行の計より AIDS 発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	47 (22.5)	—	—	209	19 (9.1)	9 (4.3)	5 (2.4)	5 (2.4)
平成10年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	18 (8.5)	28 (13.3)	4 (1.9)	3 (1.4)
平成11年度 第1期	66 (31.3)	—	—	211	12 (5.7)	40 (19.0)	3 (1.4)	4 (1.9)
平成12年度 第1期	66 (31.6)	—	—	209	8 (3.8)	41 (19.6)	2 (1.0)	2 (1.0)
平成13年度 第1期	69 (33.0)	—	—	209	10 (4.8)	43 (20.6)	3 (1.4)	2 (1.0)
平成14年度 第1期	61 (30.7)	—	—	199	8 (4.0)	33 (16.6)	1 (0.5)	3 (1.5)
平成15年度 第1期	74 (39.2)	—	—	189	8 (4.2)	32 (16.9)	2 (1.1)	2 (1.1)
平成16年度 第1期	81 (43.1)	104 (55.3)	3 (1.6)	188	11 (5.9)	30 (16.0)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成17年度 第1期	72 (39.8)	106 (58.6)	3 (1.7)	181	7 (3.9)	20 (11.0)	0 (0.0)	6 (3.3)
平成18年度 第1期	70 (38.3)	104 (56.8)	9 (4.9)	183	6 (3.3)	26 (14.2)	1 (0.5)	3 (1.6)
平成19年度 第1期	61 (32.8)	103 (55.4)	22 (11.8)	186	9 (4.8)	14 (7.5)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成20年度 第1期	59 (31.7)	121 (65.1)	6 (3.2)	186	7 (3.8)	11 (5.9)	1 (0.5)	6 (3.2)
平成21年度 第1期	48 (26.1)	129 (70.1)	7 (3.8)	184	3 (1.6)	8 (4.3)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成22年度 第1期	55 (30.1)	126 (68.9)	2 (1.1)	183	5 (2.7)	7 (3.8)	0 (0.0)	4 (2.2)
平成23年度 第1期	53 (29.3)	125 (69.1)	3 (1.7)	181	6 (3.3)	7 (3.9)	1 (0.6)	2 (1.1)
平成24年度 第1期	46 (25.1)	133 (72.7)	4 (2.2)	183	4 (2.2)	6 (3.3)	1 (0.5)	3 (1.6)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	43 (23.6)	135 (74.2)	4 (2.2)	182	3 (1.6)	6 (3.3)	0 (0.0)	1 (0.5)
	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	4 (2.2)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)
	42 (23.2)	134 (74.0)	5 (2.8)	181	4 (2.2)	5 (2.8)	0 (0.0)	1 (0.6)
	42 (23.1)	135 (74.2)	5 (2.7)	182	3 (1.6)	5 (2.7)	0 (0.0)	1 (0.5)
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	31 (16.9)	144 (78.7)	8 (4.4)	183	4 (2.2)	4 (2.2)	0 (0.0)	1 (0.5)
	30 (16.5)	145 (79.7)	7 (3.8)	182	4 (2.2)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)
	31 (17.1)	144 (79.6)	6 (3.3)	181	4 (2.2)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)
	30 (16.9)	141 (79.2)	7 (3.9)	178	4 (2.2)	3 (1.7)	1 (0.6)	1 (0.6)
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	26 (14.5)	149 (83.2)	4 (2.2)	179	6 (3.4)	4 (2.2)	1 (0.6)	2 (1.1)
	25 (14.2)	147 (83.5)	4 (2.3)	176	6 (3.4)	4 (2.3)	0 (0.0)	2 (1.1)
	24 (13.7)	147 (84.0)	4 (2.3)	175	6 (3.4)	4 (2.3)	0 (0.0)	2 (1.1)
	26 (15.1)	141 (82.0)	5 (2.9)	172	6 (3.5)	4 (2.3)	0 (0.0)	2 (1.2)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-4-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リポストロフィー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	6 (2.9)	5 (2.4)	5 (2.4)	3 (1.4)	—	—	—	9 (4.3)
平成10年度 第1期	6 (2.8)	8 (3.8)	8 (3.8)	6 (2.8)	—	—	—	18 (8.5)
平成11年度 第1期	1 (0.5)	9 (4.3)	6 (2.8)	3 (1.4)	—	—	—	11 (5.2)
平成12年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	4 (1.9)	5 (2.4)	—	—	—	15 (7.2)
平成13年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.4)	6 (2.9)	4 (1.9)	—	—	—	16 (7.7)
平成14年度 第1期	0 (0.0)	6 (3.0)	4 (2.0)	0 (0.0)	9 (4.5)	11 (5.5)	—	7 (3.5)
平成15年度 第1期	1 (0.5)	8 (4.2)	1 (0.5)	2 (1.1)	12 (6.3)	29 (15.3)	—	15 (7.9)
平成16年度 第1期	0 (0.0)	9 (4.8)	5 (2.7)	2 (1.1)	9 (4.8)	26 (13.8)	—	16 (8.5)
平成17年度 第1期	2 (1.1)	8 (4.4)	2 (1.1)	3 (1.7)	13 (7.2)	23 (12.7)	—	20 (11.0)
平成18年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	6 (3.3)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	11 (6.0)	17 (9.3)
平成19年度 第1期	1 (0.5)	5 (2.7)	2 (1.1)	3 (1.6)	8 (4.3)	20 (10.8)	10 (5.4)	10 (5.4)
平成20年度 第1期	1 (0.5)	2 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	7 (3.8)	23 (12.4)	10 (5.4)	12 (6.5)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.1)	19 (10.3)	11 (6.0)	11 (6.0)
平成22年度 第1期	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.1)	3 (1.6)	6 (3.3)	25 (13.7)	12 (6.6)	9 (4.9)
平成23年度 第1期	1 (0.6)	5 (2.8)	1 (0.6)	3 (1.7)	7 (3.9)	23 (12.7)	8 (4.4)	8 (4.4)
平成24年度 第1期	0 (0.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (12.0)	7 (3.8)	6 (3.3)
平成25年度 第1期	1 (0.5)	3 (1.6)	3 (1.6)	2 (1.1)	5 (2.7)	24 (13.2)	6 (3.3)	7 (3.8)
第2期	2 (1.1)	3 (1.6)	3 (1.6)	3 (1.6)	5 (2.7)	23 (12.6)	6 (3.3)	7 (3.8)
第3期	2 (1.1)	4 (2.2)	2 (1.1)	4 (2.2)	5 (2.8)	23 (12.7)	6 (3.3)	7 (3.9)
第4期	1 (0.5)	4 (2.2)	2 (1.1)	5 (2.7)	5 (2.7)	23 (12.6)	5 (2.7)	6 (3.3)
平成26年度 第1期	3 (1.6)	4 (2.2)	1 (0.5)	2 (1.1)	7 (3.8)	16 (8.7)	4 (2.2)	5 (2.7)
第2期	3 (1.6)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	7 (3.8)	16 (8.8)	4 (2.2)	4 (2.2)
第3期	3 (1.7)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	16 (8.8)	4 (2.2)	4 (2.2)
第4期	3 (1.7)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	15 (8.4)	3 (1.7)	5 (2.8)
平成27年度 第1期	2 (1.1)	3 (1.7)	3 (1.7)	1 (0.6)	5 (2.8)	14 (7.8)	2 (1.1)	5 (2.8)
第2期	2 (1.1)	3 (1.7)	3 (1.7)	1 (0.6)	3 (1.7)	13 (7.4)	2 (1.1)	5 (2.8)
第3期	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.6)	3 (1.7)	13 (7.4)	2 (1.1)	5 (2.9)
第4期	3 (1.7)	2 (1.2)	2 (1.2)		3 (1.7)	13 (7.6)	2 (1.2)	5 (2.9)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	CD4 値							中央値	
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	133 (25.1)	144 (27.2)	134 (25.3)	114 (21.6)	76	605	328	330
平成10年度 第1期	21 (3.9)	99 (18.3)	156 (28.8)	140 (25.9)	125 (23.1)	64	605	344	354
平成11年度 第1期	33 (6.0)	73 (13.2)	152 (27.5)	156 (28.2)	139 (25.1)	52	605	370	383
平成12年度 第1期	45 (8.1)	67 (12.1)	147 (26.4)	150 (27.0)	147 (26.4)	49	605	368	394
平成13年度 第1期	59 (10.9)	60 (11.1)	130 (24.0)	148 (27.3)	145 (26.8)	63	605	369	395
平成14年度 第1期	66 (12.0)	55 (10.0)	143 (26.0)	130 (23.6)	157 (28.5)	54	605	360	396
平成15年度 第1期	81 (15.1)	58 (10.8)	125 (23.2)	137 (25.5)	137 (25.5)	67	605	356	404
平成16年度 第1期	93 (16.5)	63 (11.2)	120 (21.3)	137 (24.3)	150 (26.6)	42	605	356	403
平成17年度 第1期	111 (20.1)	46 (8.3)	123 (22.3)	121 (21.9)	151 (27.4)	53	605	345	406
平成18年度 第1期	125 (22.1)	66 (11.7)	117 (20.7)	108 (19.1)	150 (26.5)	39	605	318	388
平成19年度 第1期	137 (24.1)	56 (9.9)	135 (23.8)	107 (18.8)	133 (23.4)	37	605	305	375
平成20年度 第1期	156 (27.5)	53 (9.3)	120 (21.1)	121 (21.3)	118 (20.8)	37	605	310	388
平成21年度 第1期	166 (29.0)	37 (6.5)	105 (18.4)	100 (17.5)	164 (28.7)	33	605	324	431
平成22年度 第1期	175 (30.4)	39 (6.8)	105 (18.3)	115 (20.0)	141 (24.5)	30	605	314	423
平成23年度 第1期	187 (32.6)	32 (5.6)	93 (16.2)	120 (20.9)	142 (24.7)	31	605	319	437
平成24年度 第1期	193 (33.6)	28 (4.9)	86 (15.0)	113 (19.7)	155 (27.0)	30	605	318	449
平成25年度 第1期	198 (34.3)	26 (4.5)	91 (15.7)	95 (16.4)	168 (29.1)	27	605	317	464
第2期	199 (34.2)	33 (5.7)	75 (12.9)	116 (19.9)	159 (27.3)	23	605	327	458
第3期	200 (34.3)	34 (5.8)	68 (11.7)	115 (19.7)	166 (28.5)	22	605	324	462
第4期	202 (36.7)	23 (4.2)	74 (13.4)	100 (18.1)	152 (27.6)	54	605	319	462
平成26年度 第1期	204 (35.6)	27 (4.7)	71 (12.4)	106 (18.5)	165 (28.8)	32	605	322	468
第2期	205 (35.3)	31 (5.3)	67 (11.5)	103 (17.7)	175 (30.1)	24	605	324	484
第3期	208 (35.7)	28 (4.8)	53 (9.1)	108 (18.6)	185 (31.8)	23	605	352	497
第4期	209 (37.3)	26 (4.6)	56 (10.0)	97 (17.3)	172 (30.7)	45	605	324	489
平成27年度 第1期	210 (35.7)	29 (4.9)	71 (12.1)	92 (15.6)	186 (31.6)	17	605	328	495
第2期	212 (36.1)	28 (4.8)	65 (11.1)	97 (16.5)	186 (31.6)	17	605	323	495
第3期	214 (36.3)	27 (4.6)	66 (11.2)	92 (15.6)	191 (32.4)	15	605	333	509
第4期	216 (38.4)	24 (4.3)	63 (11.2)	96 (17.1)	164 (29.1)	42	605	314	490

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	CD4 / CD8 比								中央値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡 含む	AIDS発病・死亡 含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	30 (5.8)	274 (53.3)	180 (35.0)	25 (4.9)	1 (0.2)	91	605	0.40	0.40
平成10年度 第1期	21 (3.9)	18 (3.4)	247 (46.0)	216 (40.2)	33 (6.1)	2 (0.4)	68	605	0.47	0.49
平成11年度 第1期	33 (6.2)	18 (3.4)	244 (45.7)	194 (36.3)	40 (7.5)	5 (0.9)	71	605	0.44	0.48
平成12年度 第1期	45 (8.3)	11 (2.0)	232 (42.9)	202 (37.3)	42 (7.8)	9 (1.7)	64	605	0.47	0.50
平成13年度 第1期	59 (11.3)	11 (2.1)	201 (38.4)	196 (37.5)	47 (9.0)	9 (1.7)	82	605	0.48	0.51
平成14年度 第1期	66 (12.5)	8 (1.5)	198 (37.5)	195 (36.9)	49 (9.3)	12 (2.3)	77	605	0.49	0.52
平成15年度 第1期	81 (15.8)	8 (1.6)	177 (34.6)	179 (35.0)	53 (10.4)	14 (2.7)	93	605	0.47	0.56
平成16年度 第1期	93 (17.6)	8 (1.5)	172 (32.6)	186 (35.3)	51 (9.7)	17 (3.2)	78	605	0.47	0.57
平成17年度 第1期	111 (21.1)	10 (1.9)	145 (27.6)	192 (36.6)	46 (8.8)	21 (4.0)	80	605	0.48	0.58
平成18年度 第1期	125 (23.1)	11 (2.0)	131 (24.3)	193 (35.7)	51 (9.4)	29 (5.4)	65	605	0.50	0.61
平成19年度 第1期	137 (25.3)	3 (0.6)	142 (26.2)	171 (31.5)	65 (12.0)	24 (4.4)	63	605	0.46	0.61
平成20年度 第1期	156 (28.4)	6 (1.1)	120 (21.8)	178 (32.4)	70 (12.7)	20 (3.6)	55	605	0.47	0.62
平成21年度 第1期	166 (30.9)	5 (0.9)	105 (19.5)	155 (28.8)	81 (15.1)	26 (4.8)	67	605	0.47	0.69
平成22年度 第1期	175 (31.8)	4 (0.7)	96 (17.4)	174 (31.6)	73 (13.2)	29 (5.3)	54	605	0.50	0.70
平成23年度 第1期	187 (34.1)	2 (0.4)	94 (17.1)	157 (28.6)	72 (13.1)	37 (6.7)	56	605	0.48	0.72
平成24年度 第1期	193 (35.0)	1 (0.2)	76 (13.8)	162 (29.4)	82 (14.9)	37 (6.7)	54	605	0.50	0.77
平成25年度 第1期	198 (35.3)	1 (0.2)	78 (13.9)	163 (29.1)	78 (13.9)	43 (7.7)	44	605	0.50	0.77
平成25年度 第2期	199 (35.5)	1 (0.2)	69 (12.3)	172 (30.7)	76 (13.5)	44 (7.8)	44	605	0.52	0.80
平成25年度 第3期	200 (35.6)	2 (0.4)	61 (10.9)	175 (31.1)	82 (14.6)	42 (7.5)	43	605	0.54	0.80
平成25年度 第4期	202 (38.1)	2 (0.4)	62 (11.7)	146 (27.5)	72 (13.6)	46 (8.7)	75	605	0.49	0.83
平成26年度 第1期	204 (37.0)	2 (0.4)	57 (10.3)	171 (31.0)	79 (14.3)	39 (7.1)	53	605	0.50	0.80
平成26年度 第2期	205 (36.7)	2 (0.4)	64 (11.4)	165 (29.5)	82 (14.7)	41 (7.3)	46	605	0.51	0.80
平成26年度 第3期	208 (37.1)	1 (0.2)	55 (9.8)	161 (28.7)	87 (15.5)	49 (8.7)	44	605	0.52	0.84
平成26年度 第4期	209 (38.5)	2 (0.4)	59 (10.9)	145 (26.7)	89 (16.4)	39 (7.2)	62	605	0.50	0.86
平成27年度 第1期	210 (36.9)	1 (0.2)	60 (10.5)	168 (29.5)	81 (14.2)	49 (8.6)	36	605	0.52	0.87
平成27年度 第2期	212 (37.5)	3 (0.5)	61 (10.8)	148 (26.1)	101 (17.8)	41 (7.2)	39	605	0.51	0.85
平成27年度 第3期	214 (37.7)	3 (0.5)	51 (9.0)	153 (26.9)	92 (16.2)	55 (9.7)	37	605	0.53	0.89
平成27年度 第4期	216 (39.8)	2 (0.4)	52 (9.6)	133 (24.5)	83 (15.3)	57 (10.5)	62	605	0.50	0.87

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア						計	1～3未満（再掲）			
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡		
									含　む	含まず	
平成9年度　第1期	226 (39.5)	227 (39.7)	108 (18.9)	7　(1.2)	4　(0.7)	33	605	453	(79.2)	(79.8)	
平成10年度　第1期	193 (34.0)	234 (41.3)	112 (19.8)	7　(1.2)	21　(3.7)	38	605	427	(75.3)	(78.2)	
平成11年度　第1期	188 (32.6)	199 (34.5)	144 (25.0)	12　(2.1)	33　(5.7)	29	605	387	(67.2)	(71.3)	
平成12年度　第1期	162 (28.2)	221 (38.5)	136 (23.7)	10　(1.7)	45　(7.8)	31	605	383	(66.7)	(72.4)	
平成13年度　第1期	152 (26.3)	212 (36.7)	145 (25.1)	10　(1.7)	59 (10.2)	27	605	364	(63.0)	(70.1)	
平成14年度　第1期	149 (25.5)	222 (37.9)	134 (22.9)	14　(2.4)	66 (11.3)	20	605	371	(63.4)	(71.5)	
平成15年度　第1期	142 (24.3)	192 (32.8)	153 (26.2)	17　(2.9)	81 (13.8)	20	605	334	(57.1)	(66.3)	
平成16年度　第1期	131 (22.7)	203 (35.2)	132 (22.9)	18　(3.1)	93 (16.1)	28	605	334	(57.9)	(69.0)	
平成17年度　第1期	132 (22.7)	189 (32.5)	138 (23.7)	12　(2.1)	111 (19.1)	23	605	321	(55.2)	(68.2)	
平成18年度　第1期	126 (21.3)	178 (30.1)	143 (24.2)	19　(3.2)	125 (21.2)	14	605	304	(51.4)	(65.2)	
平成19年度　第1期	117 (19.9)	189 (32.1)	127 (21.6)	18　(3.1)	137 (23.3)	17	605	306	(52.0)	(67.8)	
平成20年度　第1期	111 (18.8)	183 (30.9)	125 (21.1)	17　(2.9)	156 (26.4)	13	605	294	(49.7)	(67.4)	
平成21年度　第1期	111 (18.9)	167 (28.4)	132 (22.4)	12　(2.0)	166 (28.2)	17	605	278	(47.3)	(65.9)	
平成22年度　第1期	112 (19.0)	157 (26.6)	131 (22.2)	16　(2.7)	175 (29.6)	14	605	269	(45.5)	(64.7)	
平成23年度　第1期	102 (17.3)	165 (28.0)	118 (20.0)	18　(3.1)	187 (31.7)	15	605	267	(45.3)	(66.3)	
平成24年度　第1期	109 (18.4)	156 (26.3)	123 (20.7)	12　(2.0)	193 (32.5)	12	605	265	(44.7)	(66.3)	
平成25年度	第1期	98 (16.7)	158 (26.9)	122 (20.8)	11　(1.9)	198 (33.7)	18	605	256	(43.6)	(65.8)
	第2期	104 (17.6)	143 (24.2)	132 (22.3)	13　(2.2)	199 (33.7)	14	605	247	(41.8)	(63.0)
	第3期	103 (17.5)	139 (23.7)	130 (22.1)	15　(2.6)	200 (34.1)	18	605	242	(41.2)	(62.5)
	第4期	103 (17.3)	144 (24.1)	132 (22.1)	16　(2.7)	202 (33.8)	8	605	247	(41.4)	(62.5)
平成26年度	第1期	106 (17.7)	148 (24.7)	131 (21.9)	9　(1.5)	204 (34.1)	7	605	254	(42.5)	(64.5)
	第2期	105 (17.7)	140 (23.6)	133 (22.4)	11　(1.9)	205 (34.5)	11	605	245	(41.2)	(63.0)
	第3期	107 (17.8)	135 (22.5)	138 (23.0)	13　(2.2)	208 (34.6)	4	605	242	(40.3)	(61.6)
	第4期	106 (17.8)	134 (22.5)	131 (22.0)	15　(2.5)	209 (35.1)	10	605	240	(40.3)	(62.2)
平成27年度	第1期	99 (16.6)	147 (24.7)	127 (21.3)	12　(2.0)	210 (35.3)	10	605	246	(41.3)	(63.9)
	第2期	99 (16.5)	139 (23.2)	138 (23.0)	12　(2.0)	212 (35.3)	5	605	238	(39.7)	(61.3)
	第3期	101 (17.0)	135 (22.7)	134 (22.5)	11　(1.8)	214 (36.0)	10	605	236	(39.7)	(61.9)
	第4期	105 (17.7)	126 (21.2)	137 (23.1)	9　(1.5)	216 (36.4)	12	605	231	(39.0)	(61.3)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作						計	1および2 (再掲)		
	1	2	3	4 (4～8)	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含 む	含まず
平成9年度 第1期	230 (43.0)	156 (29.2)	74 (13.8)	71 (13.3)	4 (0.7)	70	605	386	(72.1)	(72.7)
平成10年度 第1期	197 (37.4)	162 (30.7)	80 (15.2)	67 (12.7)	21 (4.0)	78	605	359	(68.1)	(70.9)
平成11年度 第1期	184 (34.1)	169 (31.3)	75 (13.9)	79 (14.6)	33 (6.1)	65	605	353	(65.4)	(69.6)
平成12年度 第1期	165 (30.9)	171 (32.0)	70 (13.1)	83 (15.5)	45 (8.4)	71	605	336	(62.9)	(68.7)
平成13年度 第1期	161 (29.7)	160 (29.5)	84 (15.5)	78 (14.4)	59 (10.9)	63	605	321	(59.2)	(66.5)
平成14年度 第1期	155 (28.1)	164 (29.7)	91 (16.5)	76 (13.8)	66 (12.0)	53	605	319	(57.8)	(65.6)
平成15年度 第1期	139 (25.6)	149 (27.4)	99 (18.2)	76 (14.0)	81 (14.9)	61	605	288	(52.9)	(62.2)
平成16年度 第1期	130 (22.5)	150 (26.0)	112 (19.4)	92 (15.9)	93 (16.1)	28	605	280	(48.5)	(57.9)
平成17年度 第1期	133 (23.1)	144 (25.0)	94 (16.3)	95 (16.5)	111 (19.2)	28	605	277	(48.0)	(59.4)
平成18年度 第1期	115 (19.8)	146 (25.2)	100 (17.2)	94 (16.2)	125 (21.6)	25	605	261	(45.0)	(57.4)
平成19年度 第1期	118 (20.4)	139 (24.0)	102 (17.6)	82 (14.2)	137 (23.7)	27	605	257	(44.5)	(58.3)
平成20年度 第1期	113 (19.2)	130 (22.0)	107 (18.1)	84 (14.2)	156 (26.4)	15	605	243	(41.2)	(56.0)
平成21年度 第1期	103 (17.7)	127 (21.8)	107 (18.4)	80 (13.7)	166 (28.5)	22	605	230	(39.5)	(55.2)
平成22年度 第1期	104 (17.5)	132 (22.2)	94 (15.8)	90 (15.1)	175 (29.4)	10	605	236	(39.7)	(56.2)
平成23年度 第1期	99 (16.9)	126 (21.5)	93 (15.8)	82 (14.0)	187 (31.9)	18	605	225	(38.3)	(56.3)
平成24年度 第1期	103 (17.5)	115 (19.5)	92 (15.6)	86 (14.6)	193 (32.8)	16	605	218	(37.0)	(55.1)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	93 (15.8)	111 (18.9)	93 (15.8)	92 (15.7)	198 (33.7)	18	605	204	(34.8)	(52.4)
	93 (15.8)	104 (17.7)	99 (16.8)	93 (15.8)	199 (33.8)	17	605	197	(33.5)	(50.6)
	92 (15.6)	106 (18.0)	100 (17.0)	90 (15.3)	200 (34.0)	17	605	198	(33.7)	(51.0)
	95 (16.0)	104 (17.6)	95 (16.0)	96 (16.2)	202 (34.1)	13	605	199	(33.6)	(51.0)
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	94 (15.8)	105 (17.7)	92 (15.5)	99 (16.7)	204 (34.3)	11	605	199	(33.5)	(51.0)
	93 (15.7)	100 (16.8)	96 (16.2)	100 (16.8)	205 (34.5)	11	605	193	(32.5)	(49.6)
	93 (15.7)	99 (16.7)	89 (15.0)	103 (17.4)	208 (35.1)	13	605	192	(32.4)	(50.0)
	94 (15.8)	102 (17.1)	91 (15.3)	100 (16.8)	209 (35.1)	9	605	196	(32.9)	(50.6)
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	86 (14.6)	100 (16.9)	98 (16.6)	96 (16.3)	210 (35.6)	15	605	186	(31.5)	(48.9)
	88 (14.9)	98 (16.6)	99 (16.7)	95 (16.0)	212 (35.8)	13	605	186	(31.4)	(48.9)
	86 (14.6)	100 (16.9)	96 (16.3)	94 (15.9)	214 (36.3)	15	605	186	(31.5)	(49.5)
	85 (14.4)	97 (16.4)	96 (16.2)	97 (16.4)	216 (36.5)	14	605	182	(30.8)	(48.5)

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央 値	
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成 9 年度 第1期	108 (29.9)	30 (8.3)	109 (30.2)	110 (30.5)	4 (1.1)	244	605	2600	2400
平成10年度 第1期	184 (36.5)	63 (12.5)	140 (27.8)	96 (19.0)	21 (4.2)	101	605	1200	940
平成11年度 第1期	247 (46.1)	42 (7.8)	136 (25.4)	78 (14.6)	33 (6.2)	69	605	585	430
平成12年度 第1期	276 (50.6)	37 (6.8)	115 (21.1)	72 (13.2)	45 (8.3)	60	605	400 未満	400 未満
平成13年度 第1期	282 (52.6)	35 (6.5)	95 (17.7)	65 (12.1)	59 (11.0)	69	605	400 未満	400 未満
平成14年度 第1期	286 (52.8)	39 (7.2)	88 (16.2)	63 (11.6)	66 (12.2)	63	605	400 未満	400 未満
平成15年度 第1期	288 (53.9)	28 (5.2)	70 (13.1)	67 (12.5)	81 (15.2)	71	605	400 未満	400 未満
平成16年度 第1期	305 (54.5)	30 (5.4)	67 (12.0)	65 (11.6)	93 (16.6)	45	605	400 未満	400 未満
平成17年度 第1期	307 (56.2)	20 (3.7)	51 (9.3)	57 (10.4)	111 (20.3)	59	605	400 未満	400 未満
平成18年度 第1期	328 (58.5)	23 (4.1)	50 (8.9)	35 (6.2)	125 (22.3)	44	605	400 未満	400 未満
平成19年度 第1期	332 (58.8)	21 (3.7)	38 (6.7)	37 (6.5)	137 (24.2)	40	605	400 未満	400 未満
平成20年度 第1期	327 (57.9)	25 (4.4)	34 (6.0)	23 (4.1)	156 (27.6)	40	605	400 未満	400 未満
平成21年度 第1期	343 (60.5)	10 (1.8)	24 (4.2)	24 (4.2)	166 (29.3)	38	605	400 未満	400 未満
平成22年度 第1期	363 (63.7)	5 (0.9)	20 (3.5)	7 (1.2)	175 (30.7)	35	605	400 未満	400 未満
平成23年度 第1期	356 (61.9)	8 (1.4)	15 (2.6)	9 (1.6)	187 (32.5)	30	605	400 未満	400 未満
平成24年度 第1期	359 (62.1)	8 (1.4)	10 (1.7)	8 (1.4)	193 (33.4)	27	605	400 未満	400 未満
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	360 (62.4)	8 (1.4)	7 (1.2)	4 (0.7)	198 (34.3)	28	605	400 未満	400 未満
	366 (62.9)	5 (0.9)	8 (1.4)	4 (0.7)	199 (34.2)	23	605	400 未満	400 未満
	369 (63.4)	5 (0.9)	5 (0.9)	3 (0.5)	200 (34.4)	23	605	400 未満	400 未満
	340 (61.5)	3 (0.5)	4 (0.7)	4 (0.7)	202 (36.5)	52	605	400 未満	400 未満
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	356 (62.2)	3 (0.5)	8 (1.4)	1 (0.2)	204 (35.7)	33	605	400 未満	400 未満
	362 (62.3)	4 (0.7)	7 (1.2)	3 (0.5)	205 (35.3)	24	605	400 未満	400 未満
	361 (61.6)	6 (1.0)	8 (1.4)	3 (0.5)	208 (35.5)	19	605	400 未満	400 未満
	333 (59.8)	4 (0.7)	8 (1.4)	3 (0.5)	209 (37.5)	48	605	400 未満	400 未満
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	365 (62.2)	1 (0.2)	8 (1.4)	3 (0.5)	210 (35.8)	18	605	400 未満	400 未満
	363 (61.7)	5 (0.9)	5 (0.9)	3 (0.5)	212 (36.1)	17	605	400 未満	400 未満
	367 (62.4)	2 (0.3)	3 (0.5)	2 (0.3)	214 (36.4)	17	605	400 未満	400 未満
	337 (60.3)	3 (0.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	216 (38.6)	46	605	400 未満	400 未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分										計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1剤	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成9年度 第1期	124 (22.9)	20 (3.7)	58 (10.7)	214 (39.5)	91 (16.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (6.5)	4	59	605
平成10年度 第1期	105 (19.4)	31 (5.7)	21 (3.9)	153 (28.3)	204 (37.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	25 (4.6)	21	43	605
平成11年度 第1期	96 (18.0)	30 (5.6)	15 (2.8)	110 (20.6)	260 (48.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	18 (3.4)	33	39	605
平成12年度 第1期	92 (17.6)	36 (6.9)	11 (2.1)	86 (16.4)	235 (44.8)	28 (5.3)	0 (0.0)	36 (6.9)	45	36	605
平成13年度 第1期	74 (14.8)	28 (5.6)	9 (1.8)	73 (14.6)	230 (46.1)	50 (10.0)	0 (0.0)	35 (7.0)	59	47	605
平成14年度 第1期	80 (15.7)	45 (8.8)	5 (1.0)	66 (12.9)	204 (40.0)	71 (13.9)	0 (0.0)	39 (7.6)	66	29	605
平成15年度 第1期	66 (13.7)	52 (10.8)	3 (0.6)	58 (12.0)	180 (37.3)	78 (16.2)	0 (0.0)	45 (9.3)	81	42	605
平成16年度 第1期	70 (13.9)	58 (11.6)	4 (0.8)	49 (9.8)	195 (38.8)	89 (17.7)	0 (0.0)	37 (7.4)	93	10	605
平成17年度 第1期	61 (12.7)	54 (11.3)	3 (0.6)	45 (9.4)	182 (37.9)	92 (19.2)	0 (0.0)	43 (9.0)	111	14	605
平成18年度 第1期	56 (12.0)	52 (11.2)	5 (1.1)	33 (7.1)	192 (41.2)	91 (19.5)	0 (0.0)	37 (7.9)	125	14	605
平成19年度 第1期	46 (10.1)	41 (9.0)	3 (0.7)	27 (5.9)	213 (46.7)	92 (20.2)	0 (0.0)	34 (7.5)	137	12	605
平成20年度 第1期	41 (9.3)	30 (6.8)	2 (0.5)	25 (5.7)	211 (47.7)	88 (19.9)	5 (1.1)	40 (9.0)	156	7	605
平成21年度 第1期	41 (9.4)	24 (5.5)	1 (0.2)	20 (4.6)	185 (42.6)	85 (19.6)	41 (9.4)	37 (8.5)	166	5	605
平成22年度 第1期	35 (8.2)	22 (5.2)	1 (0.2)	15 (3.5)	162 (38.0)	83 (19.5)	78 (18.3)	30 (7.0)	175	4	605
平成23年度 第1期	28 (6.7)	19 (4.6)	1 (0.2)	12 (2.9)	142 (34.1)	74 (17.8)	116 (27.9)	24 (5.8)	187	2	605
平成24年度 第1期	22 (5.4)	12 (3.0)	0 (0.0)	11 (2.7)	121 (29.9)	68 (16.8)	143 (35.3)	28 (6.9)	193	7	605
平成25年度 第1期	17 (4.2)	11 (2.7)	0 (0.0)	8 (2.0)	97 (24.2)	68 (17.0)	170 (42.4)	30 (7.5)	198	6	605
第2期	16 (4.0)	10 (2.5)	0 (0.0)	7 (1.8)	93 (23.3)	67 (16.8)	176 (44.1)	30 (7.5)	199	7	605
第3期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	90 (22.6)	67 (16.8)	180 (45.2)	30 (7.5)	200	7	605
第4期	15 (3.8)	11 (2.8)	0 (0.0)	6 (1.5)	89 (22.4)	64 (16.1)	184 (46.2)	29 (7.3)	202	5	605
平成26年度 第1期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	91 (23.0)	61 (15.4)	191 (48.2)	22 (5.6)	204	5	605
第2期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	75 (18.9)	55 (13.9)	214 (54.0)	21 (5.3)	205	4	605
第3期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	67 (17.0)	51 (12.9)	225 (57.0)	21 (5.3)	208	2	605
第4期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	9 (2.3)	59 (15.1)	50 (12.8)	228 (58.3)	22 (5.6)	209	5	605
平成27年度 第1期	14 (3.6)	10 (2.6)	0 (0.0)	6 (1.5)	51 (13.0)	46 (11.7)	241 (61.5)	24 (6.1)	210	3	605
第2期	12 (3.1)	10 (2.6)	0 (0.0)	6 (1.5)	47 (12.0)	44 (11.3)	249 (63.7)	23 (5.9)	212	2	605
第3期	11 (2.8)	10 (2.6)	0 (0.0)	6 (1.5)	42 (10.8)	41 (10.5)	258 (66.2)	22 (5.6)	214	1	605
第4期	9 (2.4)	10 (2.6)	0 (0.0)	7 (1.8)	39 (10.2)	41 (10.8)	253 (66.4)	22 (5.8)	216	8	605

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計	
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明					
平成9年度 第1期	296 (78.5)	44 (11.7)	25 (6.6)	8 (2.1)	4 (1.1)	21	144	59	4	605	
平成10年度 第1期	310 (79.7)	53 (13.6)	17 (4.4)	6 (1.5)	3 (0.8)	16	136	43	21	605	
平成11年度 第1期	330 (84.2)	46 (11.7)	11 (2.8)	5 (1.3)	0 (0.0)	15	126	39	33	605	
平成12年度 第1期	319 (85.1)	35 (9.3)	13 (3.5)	8 (2.1)	0 (0.0)	21	128	36	45	605	
平成13年度 第1期	314 (84.4)	40 (10.8)	11 (3.0)	6 (1.6)	1 (0.3)	25	102	47	59	605	
平成14年度 第1期	321 (87.7)	29 (7.9)	11 (3.0)	5 (1.4)	0 (0.0)	19	125	29	66	605	
平成15年度 第1期	315 (89.5)	27 (7.7)	8 (2.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	12	118	42	81	605	
平成16年度 第1期	330 (88.5)	27 (7.2)	8 (2.1)	5 (1.3)	3 (0.8)	1	128	10	93	605	
平成17年度 第1期	325 (89.5)	18 (5.0)	10 (2.8)	5 (1.4)	5 (1.4)	2	115	14	111	605	
平成18年度 第1期	326 (91.1)	18 (5.0)	9 (2.5)	4 (1.1)	1 (0.3)	0	108	14	125	605	
平成19年度 第1期	337 (92.6)	15 (4.1)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	5	87	12	137	605	
平成20年度 第1期	346 (93.8)	13 (3.5)	4 (1.1)	4 (1.1)	2 (0.5)	2	71	7	156	605	
平成21年度 第1期	342 (93.4)	14 (3.8)	6 (1.6)	3 (0.8)	1 (0.3)	3	65	5	166	605	
平成22年度 第1期	341 (95.0)	12 (3.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	2 (0.6)	10	57	4	175	605	
平成23年度 第1期	352 (96.2)	9 (2.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	3	47	2	187	605	
平成24年度 第1期	358 (96.5)	9 (2.4)	2 (0.5)	2 (0.5)	0 (0.0)	0	34	7	193	605	
平成25年度	第1期	366 (98.1)	2 (0.5)	4 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.3)	0	28	6	198	605
	第2期	363 (97.3)	4 (1.1)	4 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.5)	0	26	7	199	605
	第3期	365 (97.6)	3 (0.8)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	0	24	7	200	605
	第4期	363 (97.6)	5 (1.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.5)	0	26	5	202	605
平成26年度	第1期	359 (96.8)	11 (3.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	24	5	204	605
	第2期	361 (97.0)	8 (2.2)	2 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.3)	1	23	4	205	605
	第3期	360 (97.0)	7 (1.9)	3 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.3)	1	23	2	208	605
	第4期	353 (96.7)	10 (2.7)	2 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	23	5	209	605
平成27年度	第1期	358 (97.3)	6 (1.6)	0 (0.0)	2 (0.5)	2 (0.5)	0	24	3	210	605
	第2期	359 (97.3)	6 (1.6)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	0	22	2	212	605
	第3期	362 (98.1)	5 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.5)	0	21	1	214	605
	第4期	356 (98.3)	5 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0	19	8	216	605

() : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	92 (23.1)	－	－	398	41 (10.3)	16 (4.0)	9 (2.3)	12 (3.0)
平成10年度 第1期	115 (28.4)	－	－	405	41 (10.1)	45 (11.1)	6 (1.5)	5 (1.2)
平成11年度 第1期	125 (30.7)	－	－	407	31 (7.6)	75 (18.4)	5 (1.2)	9 (2.2)
平成12年度 第1期	116 (29.3)	－	－	396	22 (5.6)	72 (18.2)	9 (2.3)	5 (1.3)
平成13年度 第1期	119 (30.0)	－	－	397	21 (5.3)	68 (17.1)	5 (1.3)	3 (0.8)
平成14年度 第1期	122 (31.7)	－	－	385	22 (5.7)	62 (16.1)	3 (0.8)	6 (1.6)
平成15年度 第1期	125 (34.3)	－	－	364	20 (5.5)	50 (13.7)	3 (0.8)	4 (1.1)
平成16年度 第1期	150 (40.1)	216 (57.8)	8 (2.1)	374	24 (6.4)	56 (15.0)	5 (1.3)	11 (2.9)
平成17年度 第1期	140 (38.4)	213 (58.4)	12 (3.3)	365	21 (5.8)	46 (12.6)	4 (1.1)	10 (2.7)
平成18年度 第1期	136 (38.0)	202 (56.4)	20 (5.6)	358	16 (4.5)	49 (13.7)	7 (2.0)	10 (2.8)
平成19年度 第1期	108 (29.3)	222 (60.2)	39 (10.6)	369	16 (4.3)	26 (7.0)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成20年度 第1期	120 (32.3)	236 (63.6)	15 (4.0)	371	16 (4.3)	23 (6.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成21年度 第1期	105 (28.5)	248 (67.2)	16 (4.3)	369	8 (2.2)	18 (4.9)	3 (0.8)	8 (2.2)
平成22年度 第1期	104 (28.2)	255 (69.1)	10 (2.7)	369	8 (2.2)	16 (4.3)	1 (0.3)	5 (1.4)
平成23年度 第1期	104 (28.2)	250 (67.8)	15 (4.1)	369	12 (3.3)	13 (3.5)	2 (0.5)	4 (1.1)
平成24年度 第1期	91 (24.5)	272 (73.3)	8 (2.2)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	7 (1.9)
平成25年度	第1期	84 (22.5)	281 (75.3)	373	6 (1.6)	14 (3.8)	1 (0.3)	5 (1.3)
	第2期	84 (22.5)	280 (75.1)	373	7 (1.9)	13 (3.5)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第3期	86 (23.0)	280 (74.9)	374	7 (1.9)	12 (3.2)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第4期	86 (23.1)	278 (74.7)	372	6 (1.6)	13 (3.5)	1 (0.3)	5 (1.3)
平成26年度	第1期	61 (16.4)	298 (80.1)	373	5 (1.3)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)
	第2期	61 (16.4)	301 (80.7)	373	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期	58 (15.6)	303 (81.5)	374	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)
	第4期	58 (15.8)	297 (80.7)	372	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)
平成27年度	第1期	52 (14.1)	309 (84.0)	368	7 (1.9)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第2期	50 (13.6)	312 (84.6)	369	7 (1.9)	8 (2.2)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期	51 (13.8)	313 (84.8)	369	8 (2.2)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第4期	50 (13.8)	306 (84.5)	362	6 (1.7)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.6)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-5-8（続き）. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	副作用（項目別）								
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボストロフィー	黄疸	その他	
平成9年度 第1期	9 (2.3)	9 (2.3)	9 (2.3)	5 (1.3)	－	－	－	20 (5.0)	
平成10年度 第1期	10 (2.5)	10 (2.5)	13 (3.2)	11 (2.7)	－	－	－	26 (6.4)	
平成11年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.2)	7 (1.7)	6 (1.5)	－	－	－	21 (5.2)	
平成12年度 第1期	2 (0.5)	9 (2.3)	6 (1.5)	8 (2.0)	－	－	－	22 (5.6)	
平成13年度 第1期	2 (0.5)	10 (2.5)	7 (1.8)	7 (1.8)	－	－	－	28 (7.1)	
平成14年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.4)	7 (1.8)	2 (0.5)	16 (4.2)	17 (4.4)	－	18 (4.7)	
平成15年度 第1期	2 (0.5)	14 (3.8)	4 (1.1)	6 (1.6)	21 (5.8)	45 (12.4)	－	17 (4.7)	
平成16年度 第1期	2 (0.5)	15 (4.0)	8 (2.1)	7 (1.9)	19 (5.1)	47 (12.6)	－	29 (7.8)	
平成17年度 第1期	2 (0.5)	16 (4.4)	4 (1.1)	9 (2.5)	27 (7.4)	36 (9.9)	－	31 (8.5)	
平成18年度 第1期	1 (0.3)	11 (3.1)	10 (2.8)	7 (2.0)	16 (4.5)	39 (10.9)	19 (5.3)	24 (6.7)	
平成19年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	8 (2.2)	4 (1.1)	15 (4.1)	31 (8.4)	19 (5.1)	17 (4.6)	
平成20年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	4 (1.1)	7 (1.9)	13 (3.5)	39 (10.5)	20 (5.4)	24 (6.5)	
平成21年度 第1期	.	5 (1.4)	7 (1.9)	8 (2.2)	8 (2.2)	36 (9.8)	19 (5.1)	22 (6.0)	
平成22年度 第1期	1 (0.3)	4 (1.1)	5 (1.4)	6 (1.6)	9 (2.4)	44 (11.9)	23 (6.2)	18 (4.9)	
平成23年度 第1期	2 (0.5)	9 (2.4)	7 (1.9)	7 (1.9)	13 (3.5)	42 (11.4)	18 (4.9)	15 (4.1)	
平成24年度 第1期	2 (0.5)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	12 (3.2)	35 (9.4)	13 (3.5)	15 (4.0)	
平成25年度	第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	5 (1.3)	4 (1.1)	7 (1.9)	38 (10.2)	12 (3.2)	14 (3.8)
	第2期	3 (0.8)	4 (1.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	8 (2.1)	37 (9.9)	12 (3.2)	14 (3.8)
	第3期	3 (0.8)	7 (1.9)	4 (1.1)	6 (1.6)	7 (1.9)	37 (9.9)	12 (3.2)	18 (4.8)
	第4期	2 (0.5)	7 (1.9)	4 (1.1)	7 (1.9)	9 (2.4)	37 (9.9)	10 (2.7)	15 (4.0)
平成26年度	第1期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	13 (3.5)
	第2期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	12 (3.2)
	第3期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	8 (2.2)	26 (7.0)	6 (1.6)	10 (2.7)
	第4期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	9 (2.4)	25 (6.8)	5 (1.4)	11 (3.0)
平成27年度	第1期	3 (0.8)	6 (1.6)	4 (1.1)	3 (0.8)	7 (1.9)	28 (7.6)	3 (0.8)	10 (2.7)
	第2期	3 (0.8)	5 (1.4)	4 (1.1)	3 (0.8)	6 (1.6)	26 (7.0)	3 (0.8)	8 (2.2)
	第3期	3 (0.8)	3 (0.8)	5 (1.4)	3 (0.8)	5 (1.4)	26 (7.0)	3 (0.8)	8 (2.2)
	第4期	4 (1.1)	2 (0.6)	4 (1.1)	0 (0.0)	5 (1.4)	26 (7.2)	3 (0.8)	8 (2.2)

() : 抗 HIV 薬投与ありに占める%

6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4 値							中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成19年度 第1期	3 (0.5)	67 (12.2)	171 (31.2)	136 (24.8)	171 (31.2)	53	601	381	381
第2期	9 (1.6)	74 (13.4)	142 (25.7)	147 (26.6)	180 (32.6)	49	601	395	397
第3期	17 (3.1)	66 (11.9)	145 (26.2)	154 (27.8)	172 (31.0)	47	601	380	384
第4期	18 (3.6)	71 (14.1)	142 (28.2)	130 (25.8)	142 (28.2)	98	601	373	385
平成20年度 第1期	26 (4.7)	66 (12.0)	150 (27.2)	153 (27.7)	157 (28.4)	49	601	386	396
第2期	29 (5.2)	63 (11.4)	142 (25.6)	149 (26.9)	171 (30.9)	47	601	392	406
第3期	33 (5.9)	59 (10.6)	154 (27.6)	141 (25.3)	170 (30.5)	44	601	382	398
第4期	38 (7.6)	49 (9.7)	139 (27.6)	122 (24.3)	155 (30.8)	98	601	376	400
平成21年度 第1期	39 (6.9)	50 (8.9)	140 (24.9)	125 (22.2)	208 (37.0)	39	601	404	431
第2期	41 (7.4)	50 (9.0)	125 (22.4)	150 (26.9)	191 (34.3)	44	601	409	429
第3期	44 (7.8)	59 (10.4)	124 (21.9)	143 (25.3)	196 (34.6)	35	601	407	425
第4期	46 (8.9)	54 (10.4)	122 (23.6)	115 (22.2)	181 (34.9)	83	601	401	420
平成22年度 第1期	49 (8.6)	53 (9.3)	131 (23.0)	153 (26.9)	183 (32.2)	32	601	400	435
第2期	53 (9.4)	50 (8.8)	127 (22.5)	141 (25.0)	194 (34.3)	36	601	409	430
第3期	55 (9.6)	50 (8.8)	127 (22.3)	133 (23.3)	205 (36.0)	31	601	411	444
第4期	61 (11.8)	50 (9.7)	107 (20.7)	125 (24.2)	173 (33.5)	85	601	397	439
平成23年度 第1期	62 (11.0)	47 (8.3)	115 (20.4)	149 (26.5)	190 (33.7)	38	601	414	442
第2期	63 (11.1)	45 (7.9)	124 (21.8)	135 (23.7)	203 (35.6)	31	601	409	441
第3期	66 (11.7)	45 (8.0)	113 (20.1)	137 (24.3)	202 (35.9)	38	601	406	448
第4期	68 (12.5)	45 (8.3)	102 (18.7)	131 (24.0)	199 (36.5)	56	601	407	440
平成24年度 第1期	71 (12.6)	37 (6.6)	105 (18.6)	147 (26.1)	204 (36.2)	37	601	421	458
第2期	73 (12.9)	37 (6.6)	115 (20.4)	137 (24.3)	202 (35.8)	37	601	416	450
第3期	74 (13.1)	35 (6.2)	115 (20.4)	129 (22.8)	212 (37.5)	36	601	436	469
第4期	77 (14.9)	31 (6.0)	100 (19.3)	118 (22.8)	192 (37.1)	83	601	411	467
平成25年度 第1期	78 (13.7)	34 (6.0)	114 (20.1)	119 (21.0)	223 (39.3)	33	601	417	469
第2期	81 (14.2)	39 (6.8)	93 (16.3)	146 (25.6)	212 (37.1)	30	601	431	466
第3期	82 (14.2)	41 (7.1)	89 (15.4)	137 (23.7)	228 (39.5)	24	601	427	473
第4期	86 (16.3)	29 (5.5)	90 (17.0)	122 (23.1)	202 (38.2)	72	601	419	482
平成26年度 第1期	88 (15.5)	35 (6.2)	88 (15.5)	129 (22.8)	227 (40.0)	34	601	429	484
第2期	89 (15.5)	41 (7.1)	77 (13.4)	134 (23.3)	233 (40.6)	27	601	441	490
第3期	92 (16.1)	36 (6.3)	65 (11.4)	131 (22.9)	248 (43.4)	29	601	449	507
第4期	93 (17.2)	34 (6.3)	71 (13.1)	114 (21.1)	228 (42.2)	61	601	436	506
平成27年度 第1期	94 (16.3)	38 (6.6)	84 (14.6)	117 (20.3)	244 (42.3)	24	601	448	506
第2期	96 (16.6)	36 (6.2)	79 (13.6)	120 (20.7)	249 (42.9)	21	601	450	504
第3期	98 (16.8)	36 (6.2)	81 (13.9)	118 (20.3)	249 (42.8)	19	601	445	511
第4期	100 (18.4)	30 (5.5)	76 (14.0)	118 (21.7)	219 (40.3)	58	601	437	497

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4 / CD8 比								中 央 値	
	AIDS発病・死亡	～0.10未満	0.10～0.50未満	0.50～1.00未満	1.00～1.50未満	1.50以上	不明	計	AIDS発病・死亡 含 む	含 まず
平成19年度 第1期	3 (0.6)	4 (0.8)	188 (36.4)	212 (41.1)	81 (15.7)	28 (5.4)	85	601	0.59	0.60
第2期	9 (1.7)	5 (1.0)	181 (34.7)	220 (42.1)	77 (14.8)	30 (5.7)	79	601	0.60	0.60
第3期	17 (3.2)	5 (1.0)	161 (30.7)	222 (42.4)	91 (17.4)	28 (5.3)	77	601	0.62	0.65
第4期	18 (3.8)	6 (1.3)	155 (32.9)	197 (41.8)	73 (15.5)	22 (4.7)	130	601	0.59	0.60
平成20年度 第1期	26 (4.9)	6 (1.1)	161 (30.4)	227 (42.9)	85 (16.1)	24 (4.5)	72	601	0.60	0.62
第2期	29 (5.5)	7 (1.3)	159 (30.0)	206 (38.9)	99 (18.7)	30 (5.7)	71	601	0.60	0.65
第3期	33 (6.2)	6 (1.1)	146 (27.5)	214 (40.3)	104 (19.6)	28 (5.3)	70	601	0.62	0.67
第4期	38 (7.9)	5 (1.0)	126 (26.2)	195 (40.5)	89 (18.5)	28 (5.8)	120	601	0.63	0.69
平成21年度 第1期	39 (7.5)	6 (1.1)	145 (27.7)	206 (39.4)	97 (18.5)	30 (5.7)	78	601	0.62	0.68
第2期	41 (7.9)	2 (0.4)	134 (26.0)	215 (41.7)	92 (17.8)	32 (6.2)	85	601	0.62	0.69
第3期	44 (8.2)	6 (1.1)	137 (25.6)	217 (40.6)	98 (18.3)	33 (6.2)	66	601	0.62	0.68
第4期	46 (9.5)	6 (1.2)	117 (24.1)	202 (41.6)	90 (18.6)	24 (4.9)	116	601	0.62	0.70
平成22年度 第1期	49 (9.1)	5 (0.9)	130 (24.2)	229 (42.6)	90 (16.7)	35 (6.5)	63	601	0.64	0.70
第2期	53 (10.0)	2 (0.4)	118 (22.2)	223 (42.0)	93 (17.5)	42 (7.9)	70	601	0.64	0.70
第3期	55 (10.3)	3 (0.6)	127 (23.7)	213 (39.7)	93 (17.4)	45 (8.4)	65	601	0.68	0.71
第4期	61 (12.5)	3 (0.6)	108 (22.1)	190 (38.9)	88 (18.0)	38 (7.8)	113	601	0.66	0.71
平成23年度 第1期	62 (11.7)	2 (0.4)	120 (22.6)	217 (40.9)	83 (15.6)	47 (8.9)	70	601	0.66	0.72
第2期	63 (11.7)	1 (0.2)	114 (21.1)	221 (40.9)	99 (18.3)	42 (7.8)	61	601	0.64	0.70
第3期	66 (12.3)	1 (0.2)	107 (20.0)	219 (40.9)	104 (19.4)	39 (7.3)	65	601	0.68	0.72
第4期	68 (13.2)	3 (0.6)	99 (19.1)	216 (41.8)	82 (15.9)	49 (9.5)	84	601	0.69	0.75
平成24年度 第1期	71 (13.3)	1 (0.2)	102 (19.1)	218 (40.7)	98 (18.3)	45 (8.4)	66	601	0.70	0.76
第2期	73 (13.6)	0 (0.0)	100 (18.7)	208 (38.8)	110 (20.5)	45 (8.4)	65	601	0.70	0.79
第3期	74 (13.8)	1 (0.2)	103 (19.3)	200 (37.4)	105 (19.6)	52 (9.7)	66	601	0.70	0.80
第4期	77 (15.7)	1 (0.2)	84 (17.1)	181 (36.8)	102 (20.7)	47 (9.6)	109	601	0.70	0.80
平成25年度 第1期	78 (14.3)	1 (0.2)	101 (18.5)	215 (39.4)	96 (17.6)	55 (10.1)	55	601	0.70	0.75
第2期	81 (14.9)	1 (0.2)	90 (16.5)	225 (41.3)	94 (17.2)	54 (9.9)	56	601	0.70	0.78
第3期	82 (14.9)	2 (0.4)	81 (14.7)	228 (41.4)	108 (19.6)	50 (9.1)	50	601	0.70	0.80
第4期	86 (17.0)	2 (0.4)	78 (15.4)	193 (38.2)	92 (18.2)	54 (10.7)	96	601	0.70	0.80
平成26年度 第1期	88 (16.3)	2 (0.4)	81 (15.0)	221 (41.0)	95 (17.6)	52 (9.6)	62	601	0.68	0.76
第2期	89 (16.3)	2 (0.4)	82 (15.0)	219 (40.2)	101 (18.5)	52 (9.5)	56	601	0.72	0.80
第3期	92 (16.8)	1 (0.2)	68 (12.5)	219 (40.1)	102 (18.7)	64 (11.7)	55	601	0.72	0.82
第4期	93 (17.9)	2 (0.4)	70 (13.5)	192 (36.9)	109 (21.0)	54 (10.4)	81	601	0.72	0.85
平成27年度 第1期	94 (17.0)	1 (0.2)	73 (13.2)	221 (40.0)	104 (18.8)	59 (10.7)	49	601	0.75	0.85
第2期	96 (17.4)	3 (0.5)	74 (13.4)	203 (36.8)	123 (22.3)	52 (9.4)	50	601	0.73	0.84
第3期	98 (17.7)	3 (0.5)	67 (12.1)	203 (36.7)	116 (21.0)	66 (11.9)	48	601	0.75	0.88
第4期	100 (19.3)	2 (0.4)	62 (12.0)	180 (34.8)	103 (19.9)	70 (13.5)	84	601	0.75	0.85

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	身体状況の総合スコア							計	1～3未満（再掲）	
	1～2未満	2～3未満	3～4未満	4～5	AIDS発病・ 死亡	不明	人数		AIDS発病・死亡	
									含　む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	154 (26.6)	240 (41.4)	163 (28.1)	20 (3.4)	3 (0.5)	21	601	394	(67.9)	(68.3)
	162 (27.8)	219 (37.6)	169 (29.0)	23 (4.0)	9 (1.5)	19	601	381	(65.5)	(66.5)
	157 (26.8)	214 (36.6)	178 (30.4)	19 (3.2)	17 (2.9)	16	601	371	(63.4)	(65.3)
	157 (27.0)	207 (35.6)	184 (31.7)	15 (2.6)	18 (3.1)	20	601	364	(62.7)	(64.7)
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	148 (25.3)	231 (39.4)	161 (27.5)	20 (3.4)	26 (4.4)	15	601	379	(64.7)	(67.7)
	148 (25.5)	208 (35.8)	172 (29.6)	24 (4.1)	29 (5.0)	20	601	356	(61.3)	(64.5)
	146 (25.3)	213 (36.9)	164 (28.4)	22 (3.8)	33 (5.7)	23	601	359	(62.1)	(65.9)
	156 (26.6)	196 (33.4)	175 (29.8)	22 (3.7)	38 (6.5)	14	601	352	(60.0)	(64.1)
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	136 (23.4)	228 (39.2)	166 (28.5)	13 (2.2)	39 (6.7)	19	601	364	(62.5)	(67.0)
	145 (24.7)	216 (36.8)	167 (28.4)	18 (3.1)	41 (7.0)	14	601	361	(61.5)	(66.1)
	137 (23.5)	217 (37.3)	167 (28.7)	17 (2.9)	44 (7.6)	19	601	354	(60.8)	(65.8)
	139 (23.8)	211 (36.1)	174 (29.7)	15 (2.6)	46 (7.9)	16	601	350	(59.8)	(64.9)
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.3)	213 (36.4)	162 (27.7)	19 (3.2)	49 (8.4)	16	601	355	(60.7)	(66.2)
	146 (25.0)	207 (35.4)	160 (27.4)	19 (3.2)	53 (9.1)	16	601	353	(60.3)	(66.4)
	142 (24.0)	199 (33.7)	175 (29.6)	20 (3.4)	55 (9.3)	10	601	341	(57.7)	(63.6)
	141 (24.1)	205 (35.1)	154 (26.4)	23 (3.9)	61 (10.4)	17	601	346	(59.2)	(66.2)
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	134 (22.9)	216 (36.9)	150 (25.6)	23 (3.9)	62 (10.6)	16	601	350	(59.8)	(66.9)
	138 (23.6)	204 (34.9)	153 (26.2)	27 (4.6)	63 (10.8)	16	601	342	(58.5)	(65.5)
	138 (23.4)	204 (34.6)	161 (27.3)	21 (3.6)	66 (11.2)	11	601	342	(58.0)	(65.3)
	143 (24.2)	199 (33.7)	157 (26.6)	23 (3.9)	68 (11.5)	11	601	342	(58.0)	(65.5)
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.1)	202 (34.4)	158 (26.9)	15 (2.6)	71 (12.1)	13	601	344	(58.5)	(66.5)
	146 (25.0)	191 (32.7)	154 (26.4)	20 (3.4)	73 (12.5)	17	601	337	(57.7)	(65.9)
	149 (25.3)	182 (30.8)	166 (28.1)	19 (3.2)	74 (12.5)	11	601	331	(56.1)	(64.1)
	147 (25.0)	183 (31.2)	164 (27.9)	16 (2.7)	77 (13.1)	14	601	330	(56.2)	(64.7)
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	129 (22.2)	205 (35.3)	153 (26.4)	15 (2.6)	78 (13.4)	21	601	334	(57.6)	(66.5)
	136 (23.4)	184 (31.7)	163 (28.1)	17 (2.9)	81 (13.9)	20	601	320	(55.1)	(64.0)
	134 (23.1)	186 (32.1)	159 (27.4)	19 (3.3)	82 (14.1)	21	601	320	(55.2)	(64.3)
	134 (22.6)	186 (31.4)	165 (27.9)	21 (3.5)	86 (14.5)	9	601	320	(54.1)	(63.2)
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	137 (23.1)	195 (32.9)	160 (27.0)	12 (2.0)	88 (14.9)	9	601	332	(56.1)	(65.9)
	134 (22.8)	185 (31.5)	165 (28.1)	15 (2.6)	89 (15.1)	13	601	319	(54.3)	(63.9)
	141 (23.7)	175 (29.4)	171 (28.7)	17 (2.9)	92 (15.4)	5	601	316	(53.0)	(62.7)
	137 (23.2)	179 (30.3)	162 (27.4)	20 (3.4)	93 (15.7)	10	601	316	(53.5)	(63.5)
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	129 (21.9)	193 (32.8)	157 (26.7)	16 (2.7)	94 (16.0)	12	601	322	(54.7)	(65.1)
	129 (21.8)	182 (30.7)	172 (29.0)	14 (2.4)	96 (16.2)	8	601	311	(52.4)	(62.6)
	133 (22.6)	176 (29.9)	168 (28.5)	14 (2.4)	98 (16.6)	12	601	309	(52.5)	(62.9)
	136 (23.1)	167 (28.4)	172 (29.3)	13 (2.2)	100 (17.0)	13	601	303	(51.5)	(62.1)

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	日 常 生 活 動 作						計	1および2（再掲）		
	1	2	3	4（4～8）	AIDS発病・ 死亡	不明		人数	AIDS発病・死亡	
									含　　む	含まず
平成19年度　第1期 第2期 第3期 第4期	153 (26.9)	182 (32.0)	124 (21.8)	106 (18.7)	3 (0.5)	33	601	335	(59.0)	(59.3)
	153 (27.0)	171 (30.2)	124 (21.9)	110 (19.4)	9 (1.6)	34	601	324	(57.1)	(58.1)
	151 (26.4)	178 (31.2)	119 (20.8)	106 (18.6)	17 (3.0)	30	601	329	(57.6)	(59.4)
	152 (26.5)	175 (30.5)	121 (21.1)	107 (18.7)	18 (3.1)	28	601	327	(57.1)	(58.9)
平成20年度　第1期 第2期 第3期 第4期	144 (24.6)	173 (29.6)	136 (23.2)	106 (18.1)	26 (4.4)	16	601	317	(54.2)	(56.7)
	143 (24.6)	164 (28.2)	131 (22.5)	114 (19.6)	29 (5.0)	20	601	307	(52.8)	(55.6)
	139 (23.9)	162 (27.8)	134 (23.0)	114 (19.6)	33 (5.7)	19	601	301	(51.7)	(54.8)
	143 (24.4)	168 (28.6)	130 (22.1)	108 (18.4)	38 (6.5)	14	601	311	(53.0)	(56.6)
平成21年度　第1期 第2期 第3期 第4期	142 (24.7)	164 (28.5)	133 (23.1)	97 (16.9)	39 (6.8)	26	601	306	(53.2)	(57.1)
	143 (24.7)	171 (29.5)	126 (21.8)	98 (16.9)	41 (7.1)	22	601	314	(54.2)	(58.4)
	138 (23.8)	158 (27.2)	133 (22.9)	107 (18.4)	44 (7.6)	21	601	296	(51.0)	(55.2)
	140 (24.0)	163 (28.0)	131 (22.5)	103 (17.7)	46 (7.9)	18	601	303	(52.0)	(56.4)
平成22年度　第1期 第2期 第3期 第4期	139 (23.6)	165 (28.1)	120 (20.4)	115 (19.6)	49 (8.3)	13	601	304	(51.7)	(56.4)
	136 (23.1)	162 (27.6)	125 (21.3)	112 (19.0)	53 (9.0)	13	601	298	(50.7)	(55.7)
	135 (23.2)	149 (25.6)	128 (22.0)	116 (19.9)	55 (9.4)	18	601	284	(48.7)	(53.8)
	137 (23.3)	149 (25.4)	131 (22.3)	109 (18.6)	61 (10.4)	14	601	286	(48.7)	(54.4)
平成23年度　第1期 第2期 第3期 第4期	135 (23.2)	157 (27.0)	121 (20.8)	107 (18.4)	62 (10.7)	19	601	292	(50.2)	(56.2)
	139 (23.9)	149 (25.6)	123 (21.2)	107 (18.4)	63 (10.8)	20	601	288	(49.6)	(55.6)
	137 (23.5)	151 (25.9)	119 (20.4)	111 (19.0)	66 (11.3)	17	601	288	(49.3)	(55.6)
	137 (23.5)	147 (25.3)	122 (21.0)	108 (18.6)	68 (11.7)	19	601	284	(48.8)	(55.3)
平成24年度　第1期 第2期 第3期 第4期	136 (23.3)	148 (25.3)	120 (20.5)	109 (18.7)	71 (12.2)	17	601	284	(48.6)	(55.4)
	135 (23.3)	139 (24.0)	125 (21.6)	108 (18.6)	73 (12.6)	21	601	274	(47.2)	(54.0)
	130 (22.5)	144 (24.9)	116 (20.1)	114 (19.7)	74 (12.8)	23	601	274	(47.4)	(54.4)
	128 (21.9)	144 (24.7)	119 (20.4)	116 (19.9)	77 (13.2)	17	601	272	(46.6)	(53.6)
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	127 (21.9)	139 (24.0)	122 (21.1)	113 (19.5)	78 (13.5)	22	601	266	(45.9)	(53.1)
	128 (22.1)	131 (22.6)	128 (22.1)	112 (19.3)	81 (14.0)	21	601	259	(44.7)	(51.9)
	125 (21.6)	133 (22.9)	129 (22.2)	111 (19.1)	82 (14.1)	21	601	258	(44.5)	(51.8)
	129 (22.0)	132 (22.5)	123 (21.0)	116 (19.8)	86 (14.7)	15	601	261	(44.5)	(52.2)
平成26年度　第1期 第2期 第3期 第4期	125 (21.3)	135 (23.0)	120 (20.4)	120 (20.4)	88 (15.0)	13	601	260	(44.2)	(52.0)
	121 (20.6)	129 (22.0)	125 (21.3)	122 (20.8)	89 (15.2)	15	601	250	(42.7)	(50.3)
	125 (21.4)	126 (21.6)	113 (19.3)	128 (21.9)	92 (15.8)	17	601	251	(43.0)	(51.0)
	127 (21.6)	129 (22.0)	117 (19.9)	121 (20.6)	93 (15.8)	14	601	256	(43.6)	(51.8)
平成27年度　第1期 第2期 第3期 第4期	116 (19.9)	128 (21.9)	131 (22.4)	115 (19.7)	94 (16.1)	17	601	244	(41.8)	(49.8)
	118 (20.2)	126 (21.6)	129 (22.1)	115 (19.7)	96 (16.4)	17	601	244	(41.8)	(50.0)
	116 (19.9)	128 (22.0)	128 (22.0)	113 (19.4)	98 (16.8)	18	601	244	(41.9)	(50.3)
	116 (19.9)	125 (21.4)	127 (21.7)	116 (19.9)	100 (17.1)	17	601	241	(41.3)	(49.8)

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA 量						計	中央 値	
	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	414 (76.1)	27 (5.0)	50 (9.2)	50 (9.2)	3 (0.6)	57	601	50	50
	414 (75.4)	24 (4.4)	56 (10.2)	46 (8.4)	9 (1.6)	52	601	50	50
	426 (76.3)	24 (4.3)	47 (8.4)	44 (7.9)	17 (3.0)	43	601	50	50
	362 (73.3)	24 (4.9)	47 (9.5)	43 (8.7)	18 (3.6)	107	601	56	50
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	409 (74.6)	35 (6.4)	44 (8.0)	34 (6.2)	26 (4.7)	53	601	50	50
	417 (75.4)	23 (4.2)	47 (8.5)	37 (6.7)	29 (5.2)	48	601	50	47
	429 (77.3)	15 (2.7)	44 (7.9)	34 (6.1)	33 (5.9)	46	601	50	41
	379 (75.6)	21 (4.2)	37 (7.4)	26 (5.2)	38 (7.6)	100	601	50	50
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	439 (79.0)	16 (2.9)	31 (5.6)	31 (5.6)	39 (7.0)	45	601	40	40
	437 (79.6)	15 (2.7)	34 (6.2)	22 (4.0)	41 (7.5)	52	601	40	40
	452 (79.7)	16 (2.8)	27 (4.8)	28 (4.9)	44 (7.8)	34	601	40	40
	403 (80.3)	10 (2.0)	23 (4.6)	20 (4.0)	46 (9.2)	99	601	40	検出せず
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	464 (82.6)	7 (1.2)	31 (5.5)	11 (2.0)	49 (8.7)	39	601	検出せず	検出せず
	460 (82.1)	12 (2.1)	23 (4.1)	12 (2.1)	53 (9.5)	41	601	検出せず	検出せず
	463 (82.4)	9 (1.6)	14 (2.5)	21 (3.7)	55 (9.8)	39	601	40	検出せず
	409 (80.0)	10 (2.0)	13 (2.5)	18 (3.5)	61 (11.9)	90	601	40	検出せず
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	454 (80.5)	13 (2.3)	22 (3.9)	13 (2.3)	62 (11.0)	37	601	検出せず	検出せず
	462 (81.3)	10 (1.8)	20 (3.5)	13 (2.3)	63 (11.1)	33	601	検出せず	検出せず
	456 (81.0)	11 (2.0)	20 (3.6)	10 (1.8)	66 (11.7)	38	601	検出せず	検出せず
	432 (79.0)	8 (1.5)	24 (4.4)	15 (2.7)	68 (12.4)	54	601	検出せず	検出せず
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	455 (80.2)	10 (1.8)	18 (3.2)	13 (2.3)	71 (12.5)	34	601	40	検出せず
	463 (81.1)	10 (1.8)	11 (1.9)	14 (2.5)	73 (12.8)	30	601	40	検出せず
	468 (81.7)	9 (1.6)	11 (1.9)	11 (1.9)	74 (12.9)	28	601	40	検出せず
	413 (79.7)	8 (1.5)	8 (1.5)	12 (2.3)	77 (14.9)	83	601	40	検出せず
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	464 (81.7)	8 (1.4)	11 (1.9)	7 (1.2)	78 (13.7)	33	601	40	40 未満
	462 (81.5)	6 (1.1)	11 (1.9)	7 (1.2)	81 (14.3)	34	601	40	検出せず
	476 (82.5)	6 (1.0)	9 (1.6)	4 (0.7)	82 (14.2)	24	601	40	検出せず
	432 (81.1)	4 (0.8)	7 (1.3)	4 (0.8)	86 (16.1)	68	601	40	検出せず
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	459 (81.2)	4 (0.7)	12 (2.1)	2 (0.4)	88 (15.6)	36	601	40 未満	検出せず
	463 (80.8)	7 (1.2)	8 (1.4)	6 (1.0)	89 (15.5)	28	601	40 未満	検出せず
	461 (79.9)	7 (1.2)	12 (2.1)	5 (0.9)	92 (15.9)	24	601	40	検出せず
	420 (78.7)	4 (0.7)	13 (2.4)	4 (0.7)	93 (17.4)	67	601	40	検出せず
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	465 (80.9)	1 (0.2)	12 (2.1)	3 (0.5)	94 (16.3)	26	601	40	検出せず
	463 (80.0)	9 (1.6)	6 (1.0)	5 (0.9)	96 (16.6)	22	601	40	検出せず
	466 (80.5)	4 (0.7)	7 (1.2)	4 (0.7)	98 (16.9)	22	601	40	検出せず
	427 (79.2)	6 (1.1)	4 (0.7)	2 (0.4)	100 (18.6)	62	601	40	検出せず

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分									計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成19年度 第1期	74 (12.8)	45 (7.8)	31 (5.3)	267 (46.0)	113 (19.5)	0 (0.0)	50 (8.6)	3	18	601
第2期	75 (13.1)	45 (7.8)	29 (5.1)	259 (45.1)	115 (20.0)	0 (0.0)	51 (8.9)	9	18	601
第3期	71 (12.4)	43 (7.5)	27 (4.7)	262 (45.8)	116 (20.3)	0 (0.0)	53 (9.3)	17	12	601
第4期	69 (12.1)	39 (6.8)	28 (4.9)	267 (46.8)	114 (20.0)	4 (0.7)	49 (8.6)	18	13	601
平成20年度 第1期	67 (11.9)	33 (5.9)	29 (5.1)	269 (47.7)	109 (19.3)	5 (0.9)	52 (9.2)	26	11	601
第2期	66 (11.8)	35 (6.2)	28 (5.0)	264 (47.1)	106 (18.9)	12 (2.1)	50 (8.9)	29	11	601
第3期	61 (10.9)	36 (6.4)	27 (4.8)	257 (45.9)	105 (18.8)	29 (5.2)	45 (8.0)	33	8	601
第4期	60 (10.9)	31 (5.6)	24 (4.4)	247 (45.0)	102 (18.6)	41 (7.5)	44 (8.0)	38	14	601
平成21年度 第1期	62 (11.2)	28 (5.0)	22 (4.0)	241 (43.3)	110 (19.8)	45 (8.1)	48 (8.6)	39	6	601
第2期	61 (11.0)	29 (5.2)	19 (3.4)	231 (41.6)	110 (19.8)	55 (9.9)	50 (9.0)	41	5	601
第3期	60 (10.8)	26 (4.7)	19 (3.4)	220 (39.8)	106 (19.2)	73 (13.2)	49 (8.9)	44	4	601
第4期	56 (10.2)	24 (4.4)	18 (3.3)	218 (39.9)	104 (19.0)	79 (14.4)	48 (8.8)	46	8	601
平成22年度 第1期	53 (9.7)	26 (4.8)	17 (3.1)	211 (38.6)	107 (19.6)	91 (16.7)	41 (7.5)	49	6	601
第2期	52 (9.6)	26 (4.8)	17 (3.1)	204 (37.7)	105 (19.4)	98 (18.1)	39 (7.2)	53	7	601
第3期	49 (9.1)	28 (5.2)	15 (2.8)	196 (36.2)	103 (19.0)	109 (20.1)	41 (7.6)	55	5	601
第4期	49 (9.2)	26 (4.9)	16 (3.0)	183 (34.5)	99 (18.7)	119 (22.5)	38 (7.2)	61	10	601
平成23年度 第1期	45 (8.4)	26 (4.8)	14 (2.6)	185 (34.5)	97 (18.1)	137 (25.5)	33 (6.1)	62	2	601
第2期	43 (8.0)	23 (4.3)	15 (2.8)	183 (34.1)	97 (18.1)	139 (25.9)	36 (6.7)	63	2	601
第3期	42 (7.9)	22 (4.1)	14 (2.6)	175 (32.8)	96 (18.0)	149 (28.0)	35 (6.6)	66	2	601
第4期	40 (7.6)	19 (3.6)	14 (2.7)	174 (33.0)	90 (17.0)	160 (30.3)	31 (5.9)	68	5	601
平成24年度 第1期	37 (7.1)	16 (3.1)	13 (2.5)	162 (31.1)	86 (16.5)	173 (33.2)	34 (6.5)	71	9	601
第2期	36 (6.9)	14 (2.7)	11 (2.1)	152 (29.2)	87 (16.7)	186 (35.8)	34 (6.5)	73	8	601
第3期	35 (6.7)	12 (2.3)	12 (2.3)	142 (27.3)	87 (16.7)	197 (37.9)	35 (6.7)	74	7	601
第4期	32 (6.2)	12 (2.3)	11 (2.1)	137 (26.5)	91 (17.6)	201 (38.9)	33 (6.4)	77	7	601
平成25年度 第1期	29 (5.6)	12 (2.3)	9 (1.7)	127 (24.6)	89 (17.2)	210 (40.6)	41 (7.9)	78	6	601
第2期	26 (5.1)	10 (1.9)	8 (1.6)	121 (23.6)	89 (17.3)	218 (42.5)	41 (8.0)	81	7	601
第3期	25 (4.9)	9 (1.8)	8 (1.6)	115 (22.5)	89 (17.4)	225 (43.9)	41 (8.0)	82	7	601
第4期	24 (4.7)	12 (2.4)	7 (1.4)	112 (22.0)	84 (16.5)	230 (45.2)	40 (7.9)	86	6	601
平成26年度 第1期	23 (4.5)	10 (2.0)	19 (3.7)	116 (22.8)	82 (16.1)	227 (44.7)	31 (6.1)	88	5	601
第2期	23 (4.5)	9 (1.8)	56 (11.0)	96 (18.9)	76 (15.0)	219 (43.1)	29 (5.7)	89	4	601
第3期	23 (4.5)	9 (1.8)	74 (14.6)	88 (17.4)	70 (13.8)	212 (41.8)	31 (6.1)	92	2	601
第4期	23 (4.6)	9 (1.8)	81 (16.1)	78 (15.5)	71 (14.1)	209 (41.6)	32 (6.4)	93	5	601
平成27年度 第1期	21 (4.2)	10 (2.0)	7 (1.4)	68 (13.5)	63 (12.5)	305 (60.5)	30 (6.0)	94	3	601
第2期	19 (3.8)	11 (2.2)	7 (1.4)	64 (12.8)	58 (11.6)	314 (62.7)	28 (5.6)	96	4	601
第3期	18 (3.6)	10 (2.0)	7 (1.4)	58 (11.6)	55 (11.0)	326 (65.1)	27 (5.4)	98	2	601
第4期	15 (3.1)	10 (2.0)	8 (1.6)	55 (11.2)	55 (11.2)	321 (65.4)	27 (5.5)	100	10	601

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	服用状況						投与 なし	投与 不明	AIDS 発病・ 死亡	計
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明				
平成19年度 第1期	421 (92.5)	16 (3.5)	10 (2.2)	4 (0.9)	4 (0.9)	6	119	18	3	601
第2期	420 (93.3)	12 (2.7)	10 (2.2)	3 (0.7)	5 (1.1)	4	120	18	9	601
第3期	422 (93.0)	17 (3.7)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	4	114	12	17	601
第4期	421 (92.7)	17 (3.7)	7 (1.5)	3 (0.7)	6 (1.3)	8	108	13	18	601
平成20年度 第1期	431 (93.7)	16 (3.5)	5 (1.1)	5 (1.1)	3 (0.7)	4	100	11	26	601
第2期	428 (93.9)	16 (3.5)	5 (1.1)	3 (0.7)	4 (0.9)	4	101	11	29	601
第3期	431 (93.7)	15 (3.3)	7 (1.5)	4 (0.9)	3 (0.7)	3	97	8	33	601
第4期	425 (93.6)	15 (3.3)	5 (1.1)	5 (1.1)	4 (0.9)	4	91	14	38	601
平成21年度 第1期	434 (93.7)	14 (3.0)	7 (1.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3	90	6	39	601
第2期	435 (94.2)	13 (2.8)	8 (1.7)	3 (0.6)	3 (0.6)	3	90	5	41	601
第3期	439 (94.6)	12 (2.6)	5 (1.1)	3 (0.6)	5 (1.1)	3	86	4	44	601
第4期	440 (94.8)	13 (2.8)	6 (1.3)	2 (0.4)	3 (0.6)	3	80	8	46	601
平成22年度 第1期	433 (95.0)	15 (3.3)	4 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	79	6	49	601
第2期	430 (95.1)	16 (3.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	11	78	7	53	601
第3期	432 (94.9)	14 (3.1)	3 (0.7)	2 (0.4)	4 (0.9)	9	77	5	55	601
第4期	429 (96.4)	10 (2.2)	2 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.7)	10	75	10	61	601
平成23年度 第1期	447 (96.5)	9 (1.9)	4 (0.9)	0 (0.0)	3 (0.6)	3	71	2	62	601
第2期	448 (95.9)	10 (2.1)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.1)	3	66	2	63	601
第3期	449 (96.4)	8 (1.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	6 (1.3)	3	64	2	66	601
第4期	446 (96.3)	8 (1.7)	4 (0.9)	0 (0.0)	5 (1.1)	6	59	5	68	601
平成24年度 第1期	452 (96.6)	10 (2.1)	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	0	53	9	71	601
第2期	454 (96.6)	11 (2.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	50	8	73	601
第3期	459 (97.0)	9 (1.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	0 (0.0)	0	47	7	74	601
第4期	459 (97.0)	9 (1.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	0	44	7	77	601
平成25年度 第1期	464 (97.5)	4 (0.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	4 (0.8)	0	41	6	78	601
第2期	462 (96.9)	6 (1.3)	4 (0.8)	0 (0.0)	5 (1.0)	0	36	7	81	601
第3期	465 (97.3)	5 (1.0)	3 (0.6)	2 (0.4)	3 (0.6)	0	34	7	82	601
第4期	460 (97.3)	7 (1.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.8)	0	36	6	86	601
平成26年度 第1期	457 (96.4)	16 (3.4)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	33	5	88	601
第2期	459 (96.6)	13 (2.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	32	4	89	601
第3期	457 (96.4)	13 (2.7)	3 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.2)	1	32	2	92	601
第4期	451 (96.6)	14 (3.0)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	32	5	93	601
平成27年度 第1期	461 (97.5)	8 (1.7)	0 (0.0)	2 (0.4)	2 (0.4)	0	31	3	94	601
第2期	459 (97.5)	8 (1.7)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	0	30	4	96	601
第3期	463 (97.9)	7 (1.5)	1 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.4)	0	28	2	98	601
第4期	456 (97.9)	8 (1.7)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.2)	0	25	10	100	601

() : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

		副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
		あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成19年度	第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
	第2期	139 (30.6)	266 (58.6)	49 (10.8)	454	18 (4.0)	36 (7.9)	6 (1.3)	10 (2.2)
	第3期	137 (29.9)	276 (60.3)	45 (9.8)	458	15 (3.3)	39 (8.5)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第4期	131 (28.4)	281 (60.8)	50 (10.8)	462	14 (3.0)	37 (8.0)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成20年度	第1期	145 (31.3)	301 (64.9)	18 (3.9)	464	20 (4.3)	31 (6.7)	5 (1.1)	9 (1.9)
	第2期	148 (32.2)	296 (64.3)	16 (3.5)	460	20 (4.3)	31 (6.7)	4 (0.9)	9 (2.0)
	第3期	145 (31.3)	304 (65.7)	14 (3.0)	463	20 (4.3)	25 (5.4)	6 (1.3)	7 (1.5)
	第4期	134 (29.3)	306 (66.8)	18 (3.9)	458	22 (4.8)	26 (5.7)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成21年度	第1期	128 (27.5)	321 (68.9)	17 (3.6)	466	11 (2.4)	27 (5.8)	3 (0.6)	9 (1.9)
	第2期	123 (26.5)	324 (69.7)	18 (3.9)	465	7 (1.5)	31 (6.7)	5 (1.1)	10 (2.2)
	第3期	125 (26.8)	328 (70.2)	14 (3.0)	467	8 (1.7)	29 (6.2)	4 (0.9)	8 (1.7)
	第4期	115 (24.6)	336 (71.9)	16 (3.4)	467	8 (1.7)	27 (5.8)	5 (1.1)	7 (1.5)
平成22年度	第1期	129 (27.6)	328 (70.2)	10 (2.1)	467	14 (3.0)	25 (5.4)	1 (0.2)	7 (1.5)
	第2期	127 (27.4)	326 (70.4)	10 (2.2)	463	14 (3.0)	26 (5.6)	1 (0.2)	8 (1.7)
	第3期	123 (26.5)	331 (71.3)	10 (2.2)	464	12 (2.6)	23 (5.0)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第4期	116 (25.5)	328 (72.1)	11 (2.4)	455	12 (2.6)	21 (4.6)	2 (0.4)	7 (1.5)
平成23年度	第1期	124 (26.6)	325 (69.7)	17 (3.6)	466	14 (3.0)	18 (3.9)	2 (0.4)	4 (0.9)
	第2期	125 (26.6)	329 (70.0)	16 (3.4)	470	14 (3.0)	18 (3.8)	4 (0.9)	3 (0.6)
	第3期	124 (26.4)	328 (69.9)	17 (3.6)	469	17 (3.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	4 (0.9)
	第4期	124 (26.4)	329 (70.1)	16 (3.4)	469	16 (3.4)	18 (3.8)	4 (0.9)	6 (1.3)
平成24年度	第1期	110 (23.5)	347 (74.1)	11 (2.4)	468	12 (2.6)	17 (3.6)	4 (0.9)	9 (1.9)
	第2期	111 (23.6)	347 (73.8)	12 (2.6)	470	11 (2.3)	17 (3.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
	第3期	106 (22.4)	352 (74.4)	15 (3.2)	473	14 (3.0)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
	第4期	103 (21.8)	356 (75.3)	14 (3.0)	473	13 (2.7)	18 (3.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成25年度	第1期	103 (21.6)	364 (76.5)	9 (1.9)	476	8 (1.7)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
	第2期	101 (21.2)	365 (76.5)	11 (2.3)	477	10 (2.1)	16 (3.4)	2 (0.4)	7 (1.5)
	第3期	104 (21.8)	364 (76.2)	10 (2.1)	478	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.3)
	第4期	104 (22.0)	359 (75.9)	10 (2.1)	473	7 (1.5)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
平成26年度	第1期	75 (15.8)	385 (81.1)	15 (3.2)	475	7 (1.5)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
	第2期	73 (15.3)	390 (81.9)	13 (2.7)	476	7 (1.5)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
	第3期	71 (14.9)	391 (82.3)	13 (2.7)	475	7 (1.5)	15 (3.2)	4 (0.8)	1 (0.2)
	第4期	71 (15.1)	384 (81.5)	16 (3.4)	471	7 (1.5)	14 (3.0)	4 (0.8)	1 (0.2)
平成27年度	第1期	67 (14.2)	399 (84.4)	7 (1.5)	473	7 (1.5)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
	第2期	65 (13.8)	399 (84.7)	7 (1.5)	471	7 (1.5)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
	第3期	66 (14.0)	402 (85.0)	5 (1.1)	473	7 (1.5)	15 (3.2)	4 (0.8)	1 (0.2)
	第4期	64 (13.7)	396 (85.0)	6 (1.3)	466	7 (1.5)	14 (3.0)	4 (0.8)	1 (0.2)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-6-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

		副作用 (項目別)							
		血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成19年度	第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
	第2期	3 (0.7)	6 (1.3)	14 (3.1)	9 (2.0)	18 (4.0)	36 (7.9)	27 (5.9)	20 (4.4)
	第3期	1 (0.2)	6 (1.3)	11 (2.4)	8 (1.7)	17 (3.7)	37 (8.1)	26 (5.7)	17 (3.7)
	第4期	1 (0.2)	5 (1.1)	11 (2.4)	6 (1.3)	15 (3.2)	37 (8.0)	27 (5.8)	17 (3.7)
平成20年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	8 (1.7)	20 (4.3)	43 (9.3)	28 (6.0)	30 (6.5)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	19 (4.1)	42 (9.1)	27 (5.9)	32 (7.0)
	第3期	3 (0.6)	6 (1.3)	7 (1.5)	10 (2.2)	19 (4.1)	43 (9.3)	29 (6.3)	28 (6.0)
	第4期	3 (0.7)	7 (1.5)	5 (1.1)	11 (2.4)	18 (3.9)	42 (9.2)	25 (5.5)	26 (5.7)
平成21年度	第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.6)	27 (5.8)	25 (5.4)
	第2期	1 (0.2)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	12 (2.6)	39 (8.4)	26 (5.6)	22 (4.7)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	9 (1.9)	11 (2.4)	10 (2.1)	39 (8.4)	27 (5.8)	26 (5.6)
	第4期	1 (0.2)	7 (1.5)	8 (1.7)	13 (2.8)	11 (2.4)	38 (8.1)	24 (5.1)	22 (4.7)
平成22年度	第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.5)	28 (6.0)	20 (4.3)
	第2期	1 (0.2)	4 (0.9)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	49 (10.6)	28 (6.0)	16 (3.5)
	第3期	1 (0.2)	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	13 (2.8)	48 (10.3)	27 (5.8)	17 (3.7)
	第4期	2 (0.4)	5 (1.1)	6 (1.3)	9 (2.0)	11 (2.4)	47 (10.3)	26 (5.7)	13 (2.9)
平成23年度	第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.7)	24 (5.2)	18 (3.9)
	第2期	2 (0.4)	10 (2.1)	7 (1.5)	11 (2.3)	19 (4.0)	45 (9.6)	24 (5.1)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	10 (2.1)	8 (1.7)	9 (1.9)	23 (4.9)	46 (9.8)	24 (5.1)	22 (4.7)
	第4期	3 (0.6)	10 (2.1)	11 (2.3)	9 (1.9)	21 (4.5)	45 (9.6)	24 (5.1)	18 (3.8)
平成24年度	第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.3)	15 (3.2)	20 (4.3)
	第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.3)	13 (2.8)	21 (4.5)
	第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.2)	11 (2.3)	19 (4.0)
	第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.3)	5 (1.1)	11 (2.3)	40 (8.5)	11 (2.3)	17 (3.6)
平成25年度	第1期	2 (0.4)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	43 (9.0)	17 (3.6)	17 (3.6)
	第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	42 (8.8)	16 (3.4)	17 (3.6)
	第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	5 (1.0)	7 (1.5)	11 (2.3)	42 (8.8)	16 (3.3)	22 (4.6)
	第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.1)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.9)	14 (3.0)	18 (3.8)
平成26年度	第1期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	4 (0.8)	13 (2.7)	32 (6.7)	8 (1.7)	14 (2.9)
	第2期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	5 (1.1)	13 (2.7)	32 (6.7)	7 (1.5)	13 (2.7)
	第3期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.3)	32 (6.7)	6 (1.3)	13 (2.7)
	第4期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	31 (6.6)	5 (1.1)	14 (3.0)
平成27年度	第1期	3 (0.6)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	13 (2.7)	33 (7.0)	4 (0.8)	13 (2.7)
	第2期	3 (0.6)	5 (1.1)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	31 (6.6)	4 (0.8)	11 (2.3)
	第3期	3 (0.6)	3 (0.6)	7 (1.5)	5 (1.1)	11 (2.3)	31 (6.6)	4 (0.8)	10 (2.1)
	第4期	4 (0.9)	2 (0.4)	6 (1.3)	2 (0.4)	10 (2.1)	31 (6.7)	4 (0.9)	10 (2.1)

() : 抗HIV薬投与ありにしめる%

7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本節では、以下の表を示した。

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用 (平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更（延べ数、平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更 → その時点	平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度																				
	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期																	
投与なし(投与歴なし) →投与なし(投与歴なし) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	-	105	110	107	102	94	94	83	81	87	84	80	67	59	60	59	62	61	61	66	64	62	58	59	60	59											
	-	3	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	-	2	3	2	5	3	1	0	1	2	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0												
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0												
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0											
投与なし(投与歴あり) →投与なし(投与歴あり) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI →INSTI	-	11	11	13	18	23	25	26	22	24	24	24	22	30	30	26	28	28	40	42	46	41	41	47	48	44	42	42	45	39							
	-	3	2	6	2	1	0	1	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0							
	-	1	0	0	3	3	3	6	8	1	1	4	3	0	4	1	8	1	0	2	5	3	1	5	3	1	3	3	1	3	3						
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	2	1	4	1	3	1	3	2	0	2						
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
NRTI 1剤 →NRTI 1剤 →NRTI 2剤 →投与なし(投与歴あり)	-	30	26	22	17	15	12	11	11	12	11	10	6	9	8	7	7	7	6	3	3	4	4	4	2	2	1	1	2	2	2	2	1				
	-	15	6	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	-	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
	-	176	167	154	137	130	116	106	93	98	96	87	79	81	76	71	64	66	61	60	58	60	58	54	54	55	51	48	47	45	45	42	42	39	37		
	-	28	26	17	20	13	13	9	7	2	2	2	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	2	3	2	0	0	1	0	1		
NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI →投与なし(投与歴あり)	-	0	3	1	0	0	0	1	3	1	2	3	3	1	0	2	1	4	3	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1		
	-	1	7	4	7	1	3	2	1	2	1	4	3	1	2	2	2	2	1	0	1	1	0	2	4	0	1	2	1	2	0	1	0	0	0		
	-	85	121	149	158	192	208	216	223	239	232	228	211	210	207	198	192	201	193	172	164	184	181	167	157	163	167	165	160	180	187	182	162	171	172		
	-	67	95	136	123	169	192	198	204	226	223	213	196	198	197	191	175	196	182	164	145	175	171	163	148	160	163	153	132	161	174	175	136	160	166	162	
	-	9	14	7	19	12	9	9	14	5	7	12	10	9	8	6	14	4	5	7	4	6	6	2	4	1	3	6	17	9	8	6	13	5	4	8	
変更薬剤 1剤 →変更薬剤 2剤以上 →NRTI 2剤+NNRTI →INSTI →投与なし(投与歴あり)	-	9	12	6	16	11	7	9	5	8	2	3	5	3	2	1	3	1	6	1	5	3	4	2	5	2	1	6	11	10	5	1	13	2	1	2	
	-	0	1	2	0	0	0	2	1	1	2	2	1	3	3	2	4	7	7	2	6	3	1	4	3	3	0	2	2	0	0	2	6	3	2	1	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	1	1	3	1	2	5	5	1	2	3	1	2	6	1	5	1	3	1	5	5	2	4	3	2	4	1	4	3	2	0	1	4	2	3	4	
	-	0	0	2	1	0	0	0	0	4	3	7	8	25	31	37	41	48	56	64	58	64	62	64	65	74	81	81	78	83	82	79	75	82	84	88	
NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →INSTI →投与なし(投与歴あり)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	46	41	36	36	29	26	30	27	27	38	38	41	43	41	41	45	42	41	41	41	43	44	41	49	46	43	41	41	43	38	37	46	50	46	40	
AIDS 発病・死亡 不明 計	-	9	11	16	19	20	25	29	31	32	34	36	43	47	53	53	56	60	61	62	63	66	70	76	78	81	85	90	90	95	102	106	109	114	117		
	-	64	43	32	45	52	46	53	64	47	44	50	58	32	33	51	68	55	55	76	74	36	35	44	62	49	32	34	34	10	12	19	28	14	9	11	
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581
	-	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581

表4-7-1 (続き). 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更 前の時点 → その時点	平成18年度				平成19年度				平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				
	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第4期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	
投与なし(投与歴なし) →投与なし(投与歴なし) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	53	53	50	47	44	44	44	41	39	41	39	38	37	39	39	37	35	34	32	32	28	27	26	24	22	22	21	19	17	16	15	15	15	15	15		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→NRTI 2剤+NNRTI	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投与なし(投与歴あり) →投与なし(投与歴あり) →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	38	40	42	37	32	35	34	30	23	26	28	24	20	22	19	18	16	20	20	19	13	15	14	13	10	10	9	9	9	9	7	8	7	6	5	6	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	6	2	0	0	3	0	2	5	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	3	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRTI 1剤 →NRTI 1剤 →NRTI 2剤 →投与なし(投与歴あり)	1	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)																																				
NRTI 2剤 →NRTI 2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI	31	32	31	31	25	25	23	22	23	23	22	21	20	17	17	16	13	15	13	13	11	12	12	12	10	10	10	10	8	7	7	6	5	15	41	55	
	1	1	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)																																				
NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+PI 1・2剤 内訳(変更薬剤なし) 変更薬剤 1剤 変更薬剤 2剤以上 →NRTI 2剤+NNRTI	164	175	180	187	183	200	194	197	193	198	189	184	168	170	163	157	148	149	142	129	125	136	130	127	117	111	103	99	91	91	89	87	84	75	66	59	
	148	166	163	178	157	186	186	185	168	193	184	181	151	164	162	155	138	148	142	128	117	131	129	127	111	108	101	99	86	91	89	87	79	75	65	58	
	9	5	6	7	19	7	4	5	19	4	1	1	14	4	1	1	5	1	0	1	6	4	1	0	3	0	2	0	4	0	0	0	4	0	1	1	
	7	4	11	2	7	7	4	7	6	1	4	2	3	2	0	1	5	0	0	0	2	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
→NRTI 2剤+NNRTI →INSTI →投与なし(投与歴あり)	0	1	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	2	8	8	7	4	3	4	7	8	3	1	3	2	6	5	8	3	7	4	1	2	2	3	0	0	
	3	1	0	1	2	1	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	→投与なし(投与歴あり)																																				
NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+NNRTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →INSTI →投与なし(投与歴あり)	85	81	85	85	81	88	87	84	81	80	78	76	76	79	78	77	73	77	75	73	67	70	68	64	61	65	64	66	64	65	65	61	57	52	49	48	
	1	2	1	2	2	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	2	3	0	3	2	3	1	2	0	2	2	1	0	2	0	2	1	0	1	0	2	1	0	0
	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSTI →INSTI →NRTI 2剤+PI 1・2剤 →NRTI 2剤+NNRTI →投与なし(投与歴あり)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	24	27	37	49	62	63	72	76	88	97	110	113	118	124	135	142	151	148	159	167	170	185	161	159	161	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 AIDS発病・死亡 不明 計	48	43	46	43	45	35	37	38	42	40	38	31	38	38	38	36	42	32	32	31	35	27	28	28	34	30	29	28	38	33	31	31	41	51	42	32	
	120	125	125	128	131	136	141	141	149	151	154	158	158	160	162	164	167	170	172	177	178	179	181	183	183	184	185	188	188	189	190	192	193	194	197	198	
	24	18	16	14	20	12	10	12	12	7	8	12	15	5	4	6	8	5	4	7	8	2	2	5	10	6	5	5	7	6	6	5	8	5	3	5	
	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581

表4-7-1 (続き). 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更 前の時点 → その時点	平成27年度				計
	第1期	第2期	第3期	第4期	
投与なし(投与歴なし)	14	12	11	9	3775
→投与なし(投与歴なし)					
→NRTI 2剤	0	0	0	0	16
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	0	0	0	44
→NRTI 2剤+NNRTI	0	0	0	0	25
投与なし(投与歴あり)	5	5	6	8	1804
→投与なし(投与歴あり)					
→NRTI 2剤	0	0	0	0	35
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	0	0	0	138
→NRTI 2剤+NNRTI	0	0	0	0	42
→INSTI	0	3	2	0	28
NRTI 1剤	0	0	0	0	286
→NRTI 1剤	0	0	0	0	32
→NRTI 2剤	0	0	0	0	20
→投与なし(投与歴あり)					
NRTI 2剤	5	6	6	6	3382
→NRTI 2剤	1	0	0	0	175
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	0	0	0	41
→NRTI 2剤+NNRTI	1	0	0	0	71
→投与なし(投与歴あり)					
NRTI 2剤+PI 1・2剤	48	46	41	38	11597
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	45	46	40	38	10894
内訳(変更薬剤なし)	3	0	0	0	435
変更薬剤 1剤	0	0	1	0	268
変更薬剤 2剤以上	2	1	0	0	109
→NRTI 2剤+NNRTI	7	3	4	3	134
→INSTI	0	1	1	0	115
→投与なし(投与歴あり)					
NRTI 2剤+NNRTI	39	41	39	37	4288
→NRTI 2剤+NNRTI	1	0	0	0	68
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	7	2	3	1	51
→INSTI	0	0	0	0	36
→投与なし(投与歴あり)					
INSTI	153	229	238	240	3654
→INSTI	1	0	0	0	12
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	2	0	0	2	13
→NRTI 2剤+NNRTI	2	2	1	0	9
→投与なし(投与歴あり)					
その他	87	26	24	24	2870
AIDS 発病・死亡	199	201	203	205	8927
不明	7	3	2	8	1798
計	581	581	581	581	43575

表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2716	453	447	440	0.000	1563	358	353	347	0.811
→NRTI 2 剤	14	371	422	462	0.026	8	371	340	484	0.039
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	37	272	334	393	0.000	23	193	214	278	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	20	191	194	243	0.068
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1338	352	345	340	0.000	1045	318	313	312	0.190
→NRTI 2 剤	31	313	318	334	0.242	22	307	312	326	0.189
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	120	227	286	294	0.000	99	205	235	271	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	38	212	201	193	0.273	32	181	156	182	0.127
→INSTI	20	281	308	322	0.180	16	255	277	300	0.175
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2858	395	395	395	0.594	1870	339	345	344	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	154	270	299	316	0.000	113	240	274	288	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	213	225	236	0.590	32	211	225	227	0.632
→投与なし(投与歴あり)	61	375	339	310	0.019	43	315	292	285	0.310
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9899	416	420	422	0.000	6068	319	328	332	0.000
内訳 変更薬剤なし	9271	420	425	427	0.000	5622	323	332	336	0.000
変更薬剤 1 剤	385	363	366	393	0.072	266	294	297	313	0.000
変更薬剤 2 剤以上	243	282	278	280	0.013	180	228	231	234	0.006
→NRTI 2 剤+NNRTI	93	394	406	398	0.886	62	338	326	344	0.364
→INSTI	119	413	425	430	0.637	72	311	316	311	0.020
→投与なし(投与歴あり)	85	419	331	311	0.000	50	279	231	234	0.009
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3591	413	417	419	0.024	2283	328	334	336	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	60	313	301	312	0.578	45	242	248	282	0.003
→INSTI	45	360	330	363	0.764	30	231	257	260	0.380
→投与なし(投与歴あり)	28	297	202	219	0.002	23	268	166	203	0.020
INSTI										
→INSTI	3002	413	416	418	0.000	1917	311	316	323	0.000

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1686	408	401	394	0.000	1322	470	460	454	0.000
→NRTI 2 剤	10	375	430	499	0.064	13	374	485	476	0.011
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	244	293	343	0.000	24	333	426	465	0.001
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	191	194	243	0.068	6	244	299	269	0.219
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	983	339	327	326	0.000	368	350	339	340	0.004
→NRTI 2 剤	15	286	318	317	0.330	25	313	318	317	0.538
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	205	235	275	0.000	43	292	331	345	0.016
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	199	166	187	0.187	6	142	220	194	0.438
→INSTI	16	281	308	322	0.252	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1122	355	352	351	0.309	1687	379	380	380	0.841
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	107	255	290	316	0.000	127	260	301	309	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	212	225	219	0.695	26	211	220	213	0.610
→投与なし(投与歴あり)	35	363	339	285	0.009	42	356	353	308	0.257
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1878	270	281	285	0.013	3318	358	368	376	0.000
内訳 変更薬剤なし	1646	279	288	291	0.246	3048	367	378	383	0.000
変更薬剤 1 剤	112	261	278	297	0.001	165	290	300	324	0.001
変更薬剤 2 剤以上	120	188	208	224	0.008	105	191	200	224	0.042
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	225	296	324	0.124	44	388	375	391	0.810
→INSTI	12	131	162	211	0.012	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	37	333	288	285	0.043	39	389	355	324	0.034
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	254	282	284	282	0.969	301	339	342	329	0.246
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	171	215	261	0.019	19	252	243	243	0.424
→INSTI	6	160	174	193	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	366	276	277	0.875	6	256	212	229	0.313
INSTI										
→INSTI	65	222	251	252	0.005	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-2(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	CD4値（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	776	423	411	405	0.000	618	448	447	440	0.001
→NRTI 2 剤	1	217	101	163	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	193	202	259	0.152	4	263	414	416	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	8	199	233	272	0.078	6	169	126	234	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	594	327	315	310	0.000	376	394	385	380	0.152
→NRTI 2 剤	4	366	302	440	0.875	2	226	351	332	0.500
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	56	199	253	286	0.000	21	212	217	212	0.096
→NRTI 2 剤+NNRTI	27	209	164	187	0.179	5	361	338	418	0.625
→INSTI	0	—	—	—	—	20	281	308	322	0.180
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	741	405	401	399	0.126	430	450	452	458	0.854
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	16	259	234	384	0.117	11	585	604	500	0.831
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	289	259	240	0.846	1	505	589	609	1.000
→投与なし(投与歴あり)	14	513	422	377	0.007	5	363	293	267	0.813
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2936	431	431	430	0.327	3645	460	463	465	0.020
内訳 変更薬剤なし	2725	436	438	435	0.389	3498	461	464	467	0.022
変更薬剤 1 剤	123	414	410	415	0.680	97	424	427	433	0.944
変更薬剤 2 剤以上	88	316	327	308	0.227	50	484	466	464	0.323
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	483	516	463	0.819	15	293	294	310	0.690
→INSTI	0	—	—	—	—	119	413	425	430	0.637
→投与なし(投与歴あり)	37	488	325	326	0.000	9	262	271	213	0.074
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1339	392	396	400	0.131	1951	445	443	444	0.174
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	316	295	355	0.512	12	409	432	428	0.470
→INSTI	0	—	—	—	—	45	360	330	363	0.764
→投与なし(投与歴あり)	19	268	194	165	0.045	3	442	361	270	0.250
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	3002	413	416	418	0.000

* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	2538	1600	1700	1550	0.000	1521	3700	3800	3600	0.000
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	7	69000	28000	1500	0.016
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	35	8800	450	200	0.000	23	20000	590	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	22	41700	600	160	0.004
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1311	3100	3400	3000	0.000	1040	4500	5700	4300	0.001
→NRTI 2 剤	23	830	900	420	0.540	21	640	570	210	0.462
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	115	20000	430	200	0.000	99	27000	500	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	18000	390	79	0.000	32	17500	400	108	0.000
→INSTI	20	4700	24	0	0.000	17	9200	44	0	0.001
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2552	200	200	200	0.495	1803	250	320	250	0.469
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	122	3250	200	200	0.000	101	5300	450	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	2900	200	200	0.000	34	5750	200	200	0.001
→投与なし(投与歴あり)	56	1350	2000	2350	0.009	41	1600	3400	3162	0.008
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9415	50	50	25	0.004	5932	160	110	89	0.032
内訳 変更薬剤なし	8824	50	33	25	0.142	5495	120	92	70	0.471
変更薬剤 1 剤	371	200	200	200	0.267	266	200	200	200	0.306
変更薬剤 2 剤以上	220	685	200	200	0.000	171	1400	200	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	90	200	200	200	0.016	60	200	200	200	0.032
→INSTI	118	0	0	0	0.000	72	0	0	0	0.003
→投与なし(投与歴あり)	79	200	7000	3100	0.005	49	770	13000	8000	0.038
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3561	25	25	25	0.000	2260	25	25	25	0.001
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	58	150	130	97	0.129	44	200	275	200	0.041
→INSTI	44	0	0	0	0.446	29	0	0	0	0.349
→投与なし(投与歴あり)	24	25	13100	6500	0.000	20	43	13100	8840	0.000
INSTI										
→INSTI	3009	0	0	0	0.050	1912	0	0	0	0.008

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1627	5500	5800	5500	0.000	1193	2400	2500	2400	0.010
→NRTI 2 剤	9	46000	6600	600	0.004	8	26300	4600	1050	0.008
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	13200	520	200	0.000	22	18500	415	200	0.010
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	41700	600	160	0.004	7	14000	200	200	0.016
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	969	9100	10000	8300	0.006	338	2800	3150	2950	0.005
→NRTI 2 剤	14	3100	3550	1025	0.318	17	1200	920	440	0.492
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	31000	1600	200	0.000	39	18000	1800	200	0.002
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	24000	390	79	0.000	5	28000	210	200	0.313
→INSTI	16	12600	41	0	0.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1084	2200	2300	1900	0.123	1466	425	440	400	0.705
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	95	7000	530	200	0.000	95	5200	420	200	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	6950	200	200	0.000	29	7300	200	200	0.003
→投与なし(投与歴あり)	35	3000	6900	5700	0.042	37	1700	2700	3162	0.074
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1783	3162	2400	2100	0.000	2967	200	200	200	0.486
内訳 変更薬剤なし	1559	2800	2400	2100	0.007	2722	200	200	200	0.368
変更薬剤 1 剤	109	4800	2630	2400	0.047	155	200	200	200	0.414
変更薬剤 2 剤以上	115	10000	1100	1900	0.000	90	8700	1650	2050	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	10000	200	200	0.020	41	200	200	200	0.395
→INSTI	12	13277	35	35	0.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	36	13500	27500	25000	0.345	35	1580	13000	3100	0.435
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	251	1400	960	710	0.000	293	200	200	200	0.975
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	4600	1400	480	0.001	17	3200	1400	1400	0.140
→INSTI	6	4680	74	0	0.094	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	4	5600	14100	18000	0.250	4	200	1850	2200	0.500
INSTI										
→INSTI	65	2500	65	60	0.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-3(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値	対象者数 (延べ数)	HIV-RNA量（中央値）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	722	1950	2050	1800	0.002	623	420	440	421	0.000
→NRTI 2 剤	1	170000	190000	520	1.000	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	6600	1900	25	0.004	4	6300	135	10	0.125
→NRTI 2 剤+NNRTI	8	60500	735	47	0.008	7	43400	4500	284	0.938
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	582	6950	8300	5750	0.047	391	820	910	630	0.059
→NRTI 2 剤	4	155	68	425	0.375	2	129510	54	13	0.500
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	55	19000	400	83	0.000	21	31000	200	25	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	18000	295	25	0.000	4	6013	44710	50	0.375
→INSTI	0	—	—	—	—	20	4700	24	0	0.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	668	200	132	110	0.890	418	25	25	23	0.133
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	16	2150	535	63	0.003	11	25	20	10	0.063
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	1300	25	25	0.195	1	0	0	0	—
→投与なし(投与歴あり)	14	636	1130	1960	0.129	5	123	25	257	0.625
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	2852	25	25	25	0.342	3596	20	20	10	0.000
内訳 変更薬剤なし	2651	25	25	25	0.756	3451	20	20	10	0.000
変更薬剤 1 剤	118	25	25	25	0.521	98	25	25	20	0.543
変更薬剤 2 剤以上	83	110	25	25	0.024	47	25	25	25	0.889
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	200	54	25	0.050	15	25	20	25	0.313
→INSTI	0	—	—	—	—	118	0	0	0	0.000
→投与なし(投与歴あり)	33	75	6300	3500	0.004	11	25	540	2380	0.148
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1343	25	25	25	0.151	1925	0	0	0	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	25	25	25	0.519	12	25	25	25	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	44	0	0	0	0.446
→投与なし(投与歴あり)	17	25	20400	13000	0.000	3	25	25	240	0.250
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	3009	0	0	0	0.050

* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	12	—	91.7	91.7	—	7	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	39	—	84.6	87.2	—	23	—	87.0	91.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	23	—	100.0	82.6	—	20	—	100.0	80.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	29	—	79.3	79.3	—	17	—	88.2	88.2	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	120	—	85.8	83.3	—	92	—	83.7	80.4	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	38	—	89.5	92.1	—	29	—	86.2	89.7	—
→INSTI	26	—	76.9	84.6	—	17	—	64.7	76.5	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	2984	85.2	85.2	85.6	0.394	1842	84.3	84.3	85.2	0.164
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	152	84.2	86.8	85.5	0.703	104	84.6	86.5	83.7	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	34	82.4	97.1	94.1	0.125	29	79.3	96.6	93.1	0.125
→投与なし(投与歴あり)	67	64.2	—	—	—	47	66.0	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10674	90.3	90.3	90.1	0.206	6120	87.9	88.1	87.7	0.499
内訳 変更薬剤なし	10027	90.9	90.6	90.4	0.024	5692	88.6	88.5	88.0	0.123
変更薬剤 1 剤	402	85.8	87.3	88.6	0.062	260	84.2	86.5	87.3	0.088
変更薬剤 2 剤以上	245	75.9	80.4	80.0	0.086	168	72.6	78.0	77.4	0.133
→NRTI 2 剤+NNRTI	92	82.6	89.1	88.0	0.227	59	76.3	83.1	81.4	0.508
→INSTI	128	92.2	96.1	96.9	0.070	73	93.2	95.9	98.6	0.125
→投与なし(投与歴あり)	104	72.1	—	—	—	63	63.5	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	4030	97.7	97.5	97.0	0.004	2379	97.2	97.0	96.5	0.038
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	57	89.5	87.7	91.2	1.000	41	87.8	90.2	95.1	0.375
→INSTI	50	92.0	88.0	88.0	0.625	30	86.7	86.7	86.7	1.000
→投与なし(投与歴あり)	34	79.4	—	—	—	25	76.0	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	3372	96.5	96.7	96.7	0.595	2050	95.5	95.7	95.7	0.615

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合：%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	9	—	100.0	100.0	—	11	—	90.9	90.9	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	31	—	80.6	87.1	—	22	—	77.3	86.4	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	20	—	100.0	80.0	—	6	—	100.0	83.3	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	12	—	83.3	91.7	—	22	—	77.3	77.3	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	89	—	83.1	79.8	—	38	—	78.9	76.3	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	—	85.7	89.3	—	6	—	83.3	83.3	—
→INSTI	16	—	68.8	81.3	—	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1112	81.7	81.1	81.7	1.000	1621	82.6	82.4	83.2	0.447
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	101	83.2	88.1	84.2	1.000	122	82.0	85.2	86.1	0.308
→NRTI 2 剤+NNRTI	27	77.8	96.3	92.6	0.125	23	73.9	95.7	91.3	0.125
→投与なし(投与歴あり)	37	62.2	—	—	—	41	61.0	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1789	70.2	71.2	70.7	0.615	3094	86.2	86.3	86.4	0.813
内訳 変更薬剤なし	1576	70.7	70.7	70.4	0.684	2843	87.2	86.8	86.8	0.525
変更薬剤 1 剤	106	68.9	76.4	76.4	0.039	157	81.5	86.6	88.5	0.007
変更薬剤 2 剤以上	107	63.6	72.0	69.2	0.228	94	66.0	70.2	69.1	0.544
→NRTI 2 剤+NNRTI	21	52.4	61.9	57.1	1.000	41	80.5	87.8	85.4	0.625
→INSTI	12	58.3	91.7	91.7	0.219	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	44	52.3	—	—	—	41	70.7	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	251	86.9	87.3	85.7	0.559	261	94.3	93.1	92.7	0.454
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	19	84.2	78.9	89.5	1.000	14	85.7	78.6	85.7	1.000
→INSTI	6	66.7	83.3	83.3	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	7	42.9	—	—	—	6	100.0	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	67	74.6	80.6	85.1	0.065	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-4(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	服用状況(全部服用の割合:%)			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	1	—	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤	11	—	90.9	90.9	—	6	—	100.0	83.3	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9	—	100.0	100.0	—	8	—	100.0	62.5	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	—	80.0	80.0	—	2	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤	60	—	91.7	90.0	—	22	—	81.8	77.3	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	27	—	88.9	92.6	—	5	—	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	26	—	76.9	84.6	—
→INSTI										
NRTI 2剤	831	86.6	86.9	87.0	0.709	532	90.8	91.0	91.0	0.856
→NRTI 2剤	18	88.9	88.9	72.2	0.250	12	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	9	100.0	100.0	100.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	17	64.7	—	—	—	9	77.8	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2剤+PI 1・2剤	3171	89.2	88.9	88.4	0.048	4409	94.1	94.1	93.8	0.422
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	2951	89.3	88.9	88.4	0.035	4233	94.4	94.4	94.1	0.165
内訳 変更薬剤なし	129	92.2	90.7	90.7	0.625	116	84.5	84.5	86.2	0.804
変更薬剤 1剤	91	80.2	86.8	83.5	0.375	60	85.0	86.7	91.7	0.219
変更薬剤 2剤以上	31	83.9	90.3	93.5	0.375	20	85.0	90.0	85.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	0	—	—	—	—	128	92.2	96.1	96.9	0.070
→INSTI	46	78.3	—	—	—	17	58.8	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
NRTI 2剤+NNRTI	1439	95.7	95.5	95.1	0.220	2330	99.4	99.3	98.7	0.003
→NRTI 2剤+NNRTI	30	86.7	86.7	90.0	1.000	13	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	0	—	—	—	—	50	92.0	88.0	88.0	0.625
→INSTI	23	78.3	—	—	—	5	60.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)										
INSTI	0	—	—	—	—	3372	96.5	96.7	96.7	0.595
→INSTI										

* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	15	—	20.0	33.3	—	8	—	12.5	37.5	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	41	—	48.8	51.2	—	24	—	50.0	54.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	—	36.0	36.0	—	22	—	40.9	36.4	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	33	—	12.1	18.2	—	20	—	10.0	25.0	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	126	—	41.3	42.9	—	95	—	44.2	44.2	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	—	47.5	42.5	—	30	—	53.3	43.3	—
→INSTI	27	—	14.8	11.1	—	18	—	22.2	16.7	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	3258	9.9	10.0	11.9	0.000	2023	9.9	10.6	13.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	171	17.5	45.0	35.7	0.000	118	16.9	45.8	39.8	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	22.5	52.5	50.0	0.007	35	20.0	51.4	48.6	0.013
→投与なし(投与歴あり)	71	12.7	—	—	—	50	16.0	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	11312	34.2	33.9	34.1	0.816	6535	34.6	33.9	34.6	0.929
内訳 変更薬剤なし	10621	33.6	33.3	33.6	0.980	6072	33.9	33.1	34.0	0.777
変更薬剤 1 剤	428	42.8	43.2	42.5	0.924	279	45.5	45.5	44.8	0.818
変更薬剤 2 剤以上	263	42.2	43.0	39.2	0.356	184	40.8	41.8	38.6	0.577
→NRTI 2 剤+NNRTI	107	43.0	45.8	41.1	0.722	68	38.2	45.6	36.8	0.833
→INSTI	130	44.6	38.5	30.8	0.001	75	50.7	44.0	36.0	0.019
→投与なし(投与歴あり)	115	47.8	—	—	—	69	49.3	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	4160	32.5	32.2	32.4	0.860	2460	33.5	33.2	33.4	0.874
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	67	46.3	53.7	55.2	0.263	47	44.7	57.4	61.7	0.077
→INSTI	50	36.0	36.0	28.0	0.219	30	36.7	36.7	30.0	0.625
→投与なし(投与歴あり)	36	52.8	—	—	—	27	48.1	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	3394	22.7	21.4	20.8	0.000	2067	26.2	24.8	24.0	0.000

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	10	—	10.0	30.0	—	14	—	21.4	28.6	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	—	50.0	50.0	—	24	—	33.3	37.5	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	—	40.9	36.4	—	7	—	28.6	28.6	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	14	—	14.3	28.6	—	26	—	15.4	23.1	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	91	—	42.9	41.8	—	43	—	41.9	41.9	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	—	55.2	44.8	—	7	—	28.6	28.6	—
→INSTI	17	—	23.5	17.6	—	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	1213	10.5	11.3	15.0	0.000	1836	10.5	10.2	12.3	0.020
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	112	16.1	42.9	37.5	0.000	140	15.7	42.9	33.6	0.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	32	25.0	53.1	53.1	0.022	29	27.6	58.6	51.7	0.065
→投与なし(投与歴あり)	39	15.4	—	—	—	45	8.9	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1979	34.6	34.7	35.6	0.328	3515	34.1	33.5	33.7	0.566
内訳 変更薬剤なし	1739	33.4	32.8	34.4	0.339	3232	33.5	32.8	33.1	0.572
変更薬剤 1 剤	118	51.7	54.2	50.8	0.865	176	43.8	46.0	44.9	0.762
変更薬剤 2 剤以上	122	35.2	42.6	37.7	0.586	107	34.6	35.5	31.8	0.574
→NRTI 2 剤+NNRTI	28	42.9	42.9	39.3	1.000	48	35.4	35.4	31.3	0.804
→INSTI	12	41.7	41.7	33.3	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	50	50.0	—	—	—	49	49.0	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	279	37.3	35.1	34.8	0.341	313	36.7	35.5	36.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	43.5	56.5	65.2	0.180	21	47.6	47.6	57.1	0.688
→INSTI	6	33.3	66.7	50.0	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	7	28.6	—	—	—	7	28.6	—	—	—
INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→INSTI	68	22.1	23.5	17.6	0.508	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-5(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	副作用（ありの者の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴なし)	1	—	0.0	100.0	—	—	—	—	—	—
→NRTI 2 剤	11	—	72.7	72.7	—	6	—	66.7	66.7	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10	—	60.0	30.0	—	8	—	12.5	50.0	—
投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	—	0.0	0.0	—	2	—	0.0	0.0	—
→NRTI 2 剤	60	—	41.7	50.0	—	23	—	39.1	26.1	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	28	—	50.0	39.3	—	5	—	60.0	80.0	—
→NRTI 2 剤+NNRTI	0	—	—	—	—	27	—	14.8	11.1	—
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2 剤	878	9.9	10.5	12.9	0.002	544	7.9	8.3	9.2	0.242
→NRTI 2 剤	19	21.1	68.4	57.9	0.016	12	33.3	33.3	25.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	9	11.1	44.4	55.6	0.125	2	0.0	0.0	0.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	17	17.6	—	—	—	9	22.2	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3337	38.9	39.1	39.0	0.866	4460	30.7	30.2	30.7	0.967
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3105	37.8	38.1	38.0	0.754	4284	30.6	30.1	30.8	0.797
内訳 変更薬剤なし	136	50.7	50.0	51.5	0.869	116	31.9	31.0	28.4	0.488
変更薬剤 1 剤	96	57.3	57.3	53.1	0.460	60	31.7	33.3	30.0	1.000
変更薬剤 2 剤以上	39	59.0	61.5	56.4	1.000	20	30.0	40.0	35.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	0	—	—	—	—	130	44.6	38.5	30.8	0.001
→INSTI	49	49.0	—	—	—	17	41.2	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NRTI 2 剤+NNRTI	1496	39.8	39.7	40.0	0.852	2351	27.3	27.0	27.0	0.610
→NRTI 2 剤+NNRTI	33	51.5	60.6	60.6	0.549	13	30.8	46.2	38.5	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	0	—	—	—	—	50	36.0	36.0	28.0	0.219
→INSTI	24	62.5	—	—	—	5	40.0	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INSTI	0	—	—	—	—	3394	22.7	21.4	20.8	0.000
→INSTI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3515	81.0	80.6	79.9	0.030	1744	77.6	76.8	75.2	0.003
→NRTI 2 剤	12	58.3	58.3	58.3	1.000	6	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	42	73.8	66.7	69.0	0.688	23	69.6	56.5	56.5	0.250
→NRTI 2 剤+NNRTI	21	66.7	61.9	71.4	1.000	18	66.7	66.7	77.8	0.625
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1635	70.3	69.6	68.9	0.134	1139	67.8	67.4	66.4	0.234
→NRTI 2 剤	33	72.7	66.7	69.7	1.000	20	80.0	75.0	75.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	122	54.1	54.1	54.1	1.000	92	54.3	52.2	55.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	40	55.0	55.0	50.0	0.625	30	63.3	63.3	56.7	0.625
→INSTI	24	79.2	66.7	79.2	1.000	14	71.4	50.0	71.4	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	3163	69.1	67.8	66.3	0.000	1980	69.1	67.5	66.6	0.005
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	167	72.5	67.7	67.1	0.162	118	74.6	71.2	68.6	0.183
→NRTI 2 剤+NNRTI	39	56.4	56.4	61.5	0.625	33	54.5	54.5	60.6	0.625
→投与なし(投与歴あり)	67	70.1	68.7	65.7	0.549	47	74.5	68.1	66.0	0.344
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10840	64.5	64.3	63.8	0.047	6271	63.5	63.5	62.8	0.124
内訳 変更薬剤なし	10187	64.5	64.3	63.8	0.079	5835	63.4	63.3	62.7	0.206
変更薬剤 1 剤	402	63.7	64.7	62.9	0.820	260	64.2	65.0	63.5	0.772
変更薬剤 2 剤以上	251	65.7	64.5	62.5	0.302	176	67.6	65.3	63.1	0.161
→NRTI 2 剤+NNRTI	96	68.8	72.9	75.0	0.180	60	73.3	81.7	76.7	0.688
→INSTI	124	63.7	65.3	64.5	1.000	71	56.3	60.6	57.7	1.000
→投与なし(投与歴あり)	104	51.0	50.0	52.9	0.804	65	52.3	47.7	49.2	0.727
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3992	67.3	67.4	67.3	0.930	2358	68.3	68.6	67.9	0.511
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	63	65.1	66.7	68.3	0.754	46	60.9	60.9	60.9	1.000
→INSTI	47	66.0	57.4	61.7	0.727	27	59.3	51.9	59.3	1.000
→投与なし(投与歴あり)	31	58.1	38.7	51.6	0.688	24	66.7	41.7	58.3	0.688
INSTI										
→INSTI	3233	66.1	65.9	65.7	0.486	1964	62.7	62.7	62.3	0.623

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1864	76.9	77.1	75.5	0.066	1502	81.8	81.3	80.5	0.103
→NRTI 2 剤	8	62.5	62.5	62.5	1.000	11	54.5	54.5	54.5	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	32	78.1	65.6	65.6	0.125	27	70.4	70.4	70.4	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	18	66.7	66.7	77.8	0.625	6	50.0	16.7	66.7	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1057	67.4	66.7	65.6	0.140	379	66.8	65.4	64.4	0.211
→NRTI 2 剤	14	78.6	78.6	71.4	1.000	26	73.1	65.4	69.2	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	88	54.5	53.4	55.7	1.000	42	50.0	47.6	50.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	29	58.6	58.6	51.7	0.625	7	57.1	42.9	42.9	1.000
→INSTI	13	69.2	46.2	69.2	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1217	72.1	69.9	68.2	0.001	1811	77.9	76.0	74.2	0.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	111	75.7	72.1	70.3	0.247	138	73.2	67.4	68.1	0.214
→NRTI 2 剤+NNRTI	31	58.1	61.3	61.3	1.000	27	59.3	59.3	63.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	36	58.3	55.6	52.8	0.688	42	69.0	71.4	69.0	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1935	70.6	70.6	69.1	0.090	3427	70.6	70.3	69.8	0.242
内訳 変更薬剤なし	1707	71.4	71.3	69.7	0.077	3160	70.8	70.4	70.1	0.322
変更薬剤 1 剤	107	60.7	61.7	60.7	1.000	163	64.4	67.5	64.4	1.000
変更薬剤 2 剤以上	121	68.6	68.6	67.8	0.840	104	73.1	73.1	69.2	0.424
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	76.0	84.0	88.0	0.250	47	72.3	72.3	70.2	1.000
→INSTI	12	58.3	58.3	58.3	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	45	44.4	48.9	46.7	1.000	46	43.5	47.8	47.8	0.688
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	281	61.9	63.0	62.6	0.756	311	65.0	65.6	65.9	0.690
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	23	69.6	69.6	73.9	1.000	21	71.4	81.0	81.0	0.500
→INSTI	6	66.7	66.7	66.7	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	6	66.7	50.0	50.0	1.000	6	50.0	16.7	66.7	1.000
INSTI										
→INSTI	62	64.5	66.1	66.1	1.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-6(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況(平成9年度第1期事業対象者)

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値	対象者数 (延べ数)	身体状況の総合スコア(1～3未満の割合:%)			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1105	78.6	78.1	77.4	0.219	908	82.7	82.6	81.9	0.434
→NRTI 2剤	1	100.0	100.0	100.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	11	81.8	63.6	63.6	0.500	4	75.0	50.0	75.0	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	10	60.0	80.0	80.0	0.500	5	100.0	80.0	60.0	0.500
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	746	67.6	66.6	66.4	0.408	510	76.9	77.1	75.9	0.545
→NRTI 2剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	1	100.0	100.0	100.0	—
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	55	56.4	56.4	60.0	0.774	25	56.0	60.0	48.0	0.625
→NRTI 2剤+NNRTI	28	64.3	67.9	60.7	1.000	5	0.0	0.0	0.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	24	79.2	66.7	79.2	1.000
NRTI 2剤										
→NRTI 2剤	851	62.9	62.2	61.1	0.244	501	47.9	47.9	46.7	0.521
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	18	72.2	66.7	61.1	0.688	11	63.6	72.7	63.6	1.000
→NRTI 2剤+NNRTI	10	40.0	40.0	50.0	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	68.8	62.5	56.3	0.500	9	77.8	66.7	66.7	1.000
NRTI 2剤+PI 1・2剤										
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	3190	64.3	64.4	63.8	0.461	4223	59.7	59.3	58.8	0.139
内訳 変更薬剤なし	2973	64.7	64.8	64.1	0.464	4054	59.5	59.1	58.7	0.232
変更薬剤 1剤	128	60.2	61.7	60.2	1.000	111	66.7	64.0	64.0	0.664
変更薬剤 2剤以上	89	58.4	53.9	58.4	1.000	58	63.8	65.5	56.9	0.289
→NRTI 2剤+NNRTI	33	63.6	75.8	81.8	0.070	16	68.8	68.8	75.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	124	63.7	65.3	64.5	1.000
→投与なし(投与歴あり)	42	54.8	52.4	57.1	1.000	16	62.5	50.0	56.3	1.000
NRTI 2剤+NNRTI										
→NRTI 2剤+NNRTI	1431	66.7	66.6	66.6	0.941	2250	68.0	68.1	68.0	1.000
→NRTI 2剤+PI 1・2剤	31	61.3	64.5	61.3	1.000	11	63.6	45.5	63.6	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	47	66.0	57.4	61.7	0.727
→投与なし(投与歴あり)	20	65.0	45.0	50.0	0.375	5	40.0	40.0	40.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	3233	66.1	65.9	65.7	0.486

* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	A. 全対象者					B. 前の時点のCD4値が500未満 かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	3406	74.8	74.0	73.0	0.000	1700	72.0	70.8	69.3	0.000
→NRTI 2 剤	13	53.8	53.8	46.2	1.000	7	71.4	71.4	71.4	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	35	71.4	62.9	65.7	0.625	24	62.5	54.2	54.2	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	25	68.0	60.0	56.0	0.375	22	68.2	59.1	54.5	0.375
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1596	59.0	58.2	57.1	0.021	1114	54.9	54.8	53.1	0.060
→NRTI 2 剤	29	65.5	65.5	65.5	1.000	20	70.0	70.0	65.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	119	46.2	43.7	44.5	0.824	91	44.0	40.7	41.8	0.791
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	54.3	57.1	42.9	0.289	27	44.4	51.9	40.7	1.000
→INSTI	26	50.0	53.8	53.8	1.000	17	41.2	47.1	47.1	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	2943	67.7	67.1	66.3	0.007	1839	68.1	67.8	67.3	0.180
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	150	68.0	64.7	66.0	0.607	104	72.1	69.2	71.2	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	37	56.8	54.1	51.4	0.625	33	57.6	54.5	51.5	0.625
→投与なし(投与歴あり)	61	65.6	63.9	57.4	0.063	44	63.6	61.4	54.5	0.125
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10478	59.3	58.7	57.9	0.000	6028	58.1	57.5	56.7	0.000
内訳 変更薬剤なし	9852	59.3	58.7	57.9	0.000	5605	58.0	57.4	56.7	0.001
変更薬剤 1 剤	389	57.1	58.1	54.8	0.183	256	57.4	57.0	53.9	0.107
変更薬剤 2 剤以上	237	63.7	59.1	59.5	0.048	167	65.3	59.3	60.5	0.115
→NRTI 2 剤+NNRTI	94	56.4	52.1	56.4	1.000	60	56.7	55.0	58.3	1.000
→INSTI	124	47.6	46.0	47.6	1.000	71	46.5	46.5	47.9	1.000
→投与なし(投与歴あり)	97	45.4	44.3	46.4	1.000	59	44.1	42.4	44.1	1.000
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	3908	55.6	55.4	55.2	0.431	2321	57.9	57.8	57.7	0.804
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	60	65.0	65.0	58.3	0.289	44	61.4	65.9	63.6	1.000
→INSTI	48	47.9	41.7	41.7	0.453	28	42.9	39.3	32.1	0.250
→投与なし(投与歴あり)	32	34.4	31.3	31.3	1.000	25	36.0	32.0	36.0	1.000
INSTI										
→INSTI	3274	49.5	49.2	49.0	0.276	1991	45.4	45.0	44.5	0.140

抗HIV薬の併用区分の変更	C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上 かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者					D. 平成9年度～平成13年度				
	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
前の時点 →その時点		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1835	73.0	72.1	71.0	0.002	1417	78.1	77.3	76.4	0.011
→NRTI 2 剤	9	66.7	66.7	55.6	1.000	12	58.3	58.3	50.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	69.0	62.1	62.1	0.625	20	75.0	65.0	70.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	22	68.2	59.1	54.5	0.375	7	57.1	57.1	57.1	1.000
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	1034	55.5	55.0	53.5	0.052	332	63.6	63.0	62.3	0.513
→NRTI 2 剤	12	58.3	58.3	50.0	1.000	21	61.9	61.9	61.9	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	88	44.3	39.8	40.9	0.581	38	57.9	55.3	52.6	0.727
→NRTI 2 剤+NNRTI	26	53.8	53.8	38.5	0.219	6	83.3	83.3	50.0	0.500
→INSTI	16	37.5	43.8	43.8	1.000	0	—	—	—	—
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	1112	69.1	68.1	67.4	0.060	1666	72.3	71.4	70.5	0.005
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	101	70.3	68.3	70.3	1.000	120	69.2	65.8	68.3	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	30	63.3	60.0	53.3	0.250	26	61.5	57.7	50.0	0.250
→投与なし(投与歴あり)	33	54.5	51.5	45.5	0.250	36	66.7	66.7	63.9	1.000
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	1774	65.2	64.0	63.1	0.003	3087	67.8	67.4	66.5	0.039
内訳 変更薬剤なし	1551	65.8	64.6	63.6	0.003	2835	68.0	67.7	66.8	0.071
変更薬剤 1 剤	109	53.2	53.2	51.4	0.804	157	62.4	64.3	59.9	0.481
変更薬剤 2 剤以上	114	68.4	65.8	67.5	1.000	95	70.5	63.2	68.4	0.727
→NRTI 2 剤+NNRTI	24	66.7	62.5	62.5	1.000	42	61.9	54.8	61.9	1.000
→INSTI	11	45.5	45.5	45.5	1.000	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	39	38.5	41.0	38.5	1.000	38	44.7	44.7	52.6	0.453
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	258	61.6	61.2	61.6	1.000	276	55.8	56.5	57.6	0.327
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	21	61.9	66.7	66.7	1.000	18	66.7	77.8	72.2	1.000
→INSTI	6	83.3	66.7	33.3	0.250	0	—	—	—	—
→投与なし(投与歴あり)	5	20.0	20.0	20.0	1.000	6	50.0	33.3	33.3	1.000
INSTI										
→INSTI	61	47.5	47.5	47.5	1.000	0	—	—	—	—

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

表4-7-7(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

抗HIV薬の併用区分の変更	E. 平成14年度～平成18年度					F. 平成19年度～平成27年度				
前の時点 →その時点	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値	対象者数 (延べ数)	日常生活動作（1および2の割合：％）			p値
		前の時点	その時点	後の時点			前の時点	その時点	後の時点	
投与なし(投与歴なし)										
→投与なし(投与歴なし)	1085	73.3	72.4	72.1	0.134	904	71.5	70.5	69.0	0.013
→NRTI 2 剤	1	0.0	0.0	0.0	—	0	—	—	—	—
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	10	60.0	50.0	50.0	1.000	5	80.0	80.0	80.0	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	10	70.0	70.0	70.0	1.000	8	75.0	50.0	37.5	0.250
投与なし(投与歴あり)										
→投与なし(投与歴あり)	736	55.7	54.5	53.0	0.034	528	60.6	60.4	59.7	0.392
→NRTI 2 剤	6	66.7	66.7	66.7	1.000	2	100.0	100.0	100.0	1.000
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	56	42.9	41.1	46.4	0.727	25	36.0	32.0	28.0	0.625
→NRTI 2 剤+NNRTI	24	50.0	54.2	45.8	1.000	5	40.0	40.0	20.0	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	26	50.0	53.8	53.8	1.000
NRTI 2 剤										
→NRTI 2 剤	777	65.0	65.0	64.5	0.641	500	56.6	55.8	55.4	0.311
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	18	61.1	55.6	50.0	0.625	12	66.7	66.7	66.7	1.000
→NRTI 2 剤+NNRTI	9	44.4	44.4	55.6	1.000	2	50.0	50.0	50.0	1.000
→投与なし(投与歴あり)	16	56.3	56.3	43.8	0.500	9	77.8	66.7	55.6	0.500
NRTI 2 剤+PI 1・2 剤										
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	3140	59.7	58.9	57.9	0.001	4251	52.8	52.2	51.5	0.002
内訳 変更薬剤なし	2924	60.1	59.3	58.5	0.003	4093	52.7	52.0	51.4	0.003
変更薬剤 1 剤	127	52.0	51.2	48.0	0.302	105	55.2	57.1	55.2	1.000
変更薬剤 2 剤以上	89	58.4	55.1	53.9	0.388	53	60.4	58.5	52.8	0.219
→NRTI 2 剤+NNRTI	35	54.3	54.3	57.1	1.000	17	47.1	41.2	41.2	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	124	47.6	46.0	47.6	1.000
→投与なし(投与歴あり)	45	46.7	44.4	42.2	0.688	14	42.9	42.9	42.9	—
NRTI 2 剤+NNRTI										
→NRTI 2 剤+NNRTI	1397	57.1	57.1	56.8	0.707	2235	54.6	54.2	54.0	0.228
→NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	29	75.9	69.0	58.6	0.063	13	38.5	38.5	38.5	1.000
→INSTI	0	—	—	—	—	48	47.9	41.7	41.7	0.453
→投与なし(投与歴あり)	21	28.6	28.6	28.6	1.000	5	40.0	40.0	40.0	1.000
INSTI										
→INSTI	0	—	—	—	—	3274	49.5	49.2	49.0	0.276

* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

8. 生活状況

本節では、以下の表を示した。

表4-8-1. 住居の種類	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-2. 世帯人員数	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-3. 就業状況	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-4. 日常生活への影響	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-5. 健康意識	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-6. こころの状態	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-7. 通院頻度	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-8. 通院に掛かる時間	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-9. 障害者手帳の取得状況	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-10. 障害者手帳を取得していない理由	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-11. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-12. 障害福祉サービスの利用状況	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-13. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-14. 生活意識	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-15. 所得金額	(「生活状況報告書」提出者)
表4-8-16. 自由記載欄の記入の有無	(「生活状況報告書」提出者)

表4-8-1. 住居の種類（「生活状況報告書」提出者）

現在の住まい (問1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等）	98 (100.0)	176 (97.2)	78 (100.0)	32 (100.0)	384 (98.7)
病院・診療所に入院中	0 (0.0)	3 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.8)
社会福祉施設等に入所中	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)
その他	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)
不明	1 -	1 -	0 -	0 -	2 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-2. 世帯人員数（「生活状況報告書」提出者）

世帯人員数 (問2)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 人	20 (20.2)	28 (15.5)	16 (20.8)	7 (21.9)	71 (18.3)
2 人	22 (22.2)	53 (29.3)	28 (36.4)	17 (53.1)	120 (30.8)
3 人	33 (33.3)	60 (33.1)	20 (26.0)	6 (18.8)	119 (30.6)
4 人	14 (14.1)	31 (17.1)	9 (11.7)	2 (6.3)	56 (14.4)
5 人	7 (7.1)	5 (2.8)	4 (5.2)	0 (0.0)	16 (4.1)
不明	3 (3.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.3)
計	0 (0.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.5)

表4-8-3. 就業状況（「生活状況報告書」提出者）

過去1か月間の仕事の状況 (問3)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
仕事あり	66 (66.7)	123 (68.3)	56 (71.8)	9 (28.1)	254 (65.3)
主に仕事をしている	57 [57.6]	101 [56.1]	46 [59.0]	4 [12.5]	208 [53.5]
主に家事で仕事あり	3 [3.0]	9 [5.0]	4 [5.1]	0 [0.0]	16 [4.1]
主に通学で仕事あり	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
仕事あり（上記以外）	6 [6.1]	13 [7.2]	6 [7.7]	5 [15.6]	30 [7.7]
仕事なし	33 (33.3)	57 (31.7)	22 (28.2)	23 (71.9)	135 (34.7)
失業・求職中	15 [15.2]	31 [17.2]	9 [11.5]	3 [9.4]	58 [14.9]
家事（専業）	4 [4.0]	11 [6.1]	1 [1.3]	6 [18.8]	22 [5.7]
その他	14 [14.1]	15 [8.3]	12 [15.4]	14 [43.8]	55 [14.1]
不明	0 -	2 -	0 -	0 -	2 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-4. 日常生活への影響（「生活状況報告書」提出者）

日常生活への影響 (問4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
ある	58 (61.1)	140 (78.2)	59 (77.6)	24 (82.8)	281 (74.1)
通常時に影響がある	25 [43.1]	73 [52.1]	33 [55.9]	18 [75.0]	149 [53.0]
血友病による出血時に影響がある	47 [81.0]	115 [82.1]	51 [86.4]	15 [62.5]	228 [81.1]
それ以外の時に影響がある	8 [13.8]	22 [15.7]	12 [20.3]	6 [25.0]	48 [17.1]
ない	37 (38.9)	39 (21.8)	17 (22.4)	5 (17.2)	98 (25.9)
不明	4 —	3 —	2 —	3 —	12 —
計	99	182	78	32	391

表4-8-5. 健康意識（「生活状況報告書」提出者）

現在の健康状態 (問5)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
よい	15 (15.3)	12 (6.7)	5 (6.6)	1 (3.2)	33 (8.6)
まあよい	14 (14.3)	32 (17.9)	12 (15.8)	5 (16.1)	63 (16.4)
ふつう	37 (37.8)	75 (41.9)	21 (27.6)	8 (25.8)	141 (36.7)
あまりよくない	29 (29.6)	49 (27.4)	35 (46.1)	13 (41.9)	126 (32.8)
よくない	3 (3.1)	11 (6.1)	3 (3.9)	4 (12.9)	21 (5.5)
不明	1 —	3 —	2 —	1 —	7 —
計	99	182	78	32	391

表4-8-6. こころの状態（「生活状況報告書」提出者）

こころの状態 (K6 の合計点数) (問6)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
0～4 点	47 (48.0)	72 (40.2)	30 (39.5)	13 (43.3)	162 (42.3)
5～9 点	25 (25.5)	49 (27.4)	21 (27.6)	6 (20.0)	101 (26.4)
10～14 点	17 (17.3)	31 (17.3)	16 (21.1)	7 (23.3)	71 (18.5)
15 点～	9 (9.2)	27 (15.1)	9 (11.8)	4 (13.3)	49 (12.8)
不明	1 —	3 —	2 —	2 —	8 —
計	99	182	78	32	391

表4-8-7. 通院頻度（「生活状況報告書」提出者）

通院頻度 (問7-1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 週間に 1 回以上	2 (2.0)	5 (2.8)	0 (0.0)	2 (6.3)	9 (2.3)
2 週間に 1 回以上	2 (2.0)	4 (2.2)	3 (3.9)	0 (0.0)	9 (2.3)
1 か月に 1 回以上	43 (43.4)	72 (39.8)	38 (50.0)	19 (59.4)	172 (44.3)
3 か月に 1 回以上	50 (50.5)	97 (53.6)	35 (46.1)	9 (28.1)	191 (49.2)
6 か月に 1 回以上	1 (1.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.5)
それ以下	1 (1.0)	2 (1.1)	0 (0.0)	2 (6.3)	5 (1.3)
不明	0 —	1 —	2 —	0 —	3 —
計	99	182	78	32	391

表4-8-8. 通院に掛かる時間（「生活状況報告書」提出者）

通院に掛かる時間（片道） （問7-2）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
30分未満	19 (19.2)	23 (12.7)	17 (22.4)	7 (21.9)	66 (17.0)
1時間未満	43 (43.4)	71 (39.2)	27 (35.5)	9 (28.1)	150 (38.7)
2時間未満	31 (31.3)	63 (34.8)	27 (35.5)	15 (46.9)	136 (35.1)
3時間未満	3 (3.0)	13 (7.2)	2 (2.6)	1 (3.1)	19 (4.9)
不明	3 (3.0)	11 (6.1)	4 (5.3)	0 (0.0)	18 (4.6)
7計	0 -	1 -	1 -	0 -	2 -

表4-8-9. 障害者手帳の取得状況（「生活状況報告書」提出者）

障害者手帳の取得状況 （問8）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
取得している	44 (51.2)	112 (70.4)	52 (76.5)	18 (85.7)	226 (68.1)
身体障害者手帳	42 [48.8]	112 [70.4]	52 [76.5]	18 [85.7]	224 [67.5]
療育手帳 （愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）	2 [2.3]	0 [0.0]	1 [1.5]	0 [0.0]	3 [0.9]
精神障害者保健福祉手帳	1 [1.2]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.3]
取得していない	42 (48.8)	47 (29.6)	16 (23.5)	3 (14.3)	106 (31.9)
不明	13 -	23 -	10 -	11 -	59 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-10. 障害者手帳を取得していない理由（「生活状況報告書」提出者）

障害者手帳を取得していない理由 （問8-1）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない	2 (4.8)	3 (6.4)	5 (31.3)	2 (66.7)	12 (11.3)
手帳の制度や取得の手続きが わからない	11 (26.2)	16 (34.0)	5 (31.3)	1 (33.3)	33 (31.1)
とくに手帳がなくても困らない	13 (31.0)	18 (38.3)	7 (43.8)	3 (100.0)	41 (38.7)
手帳を持ちたくない	9 (21.4)	9 (19.1)	3 (18.8)	0 (0.0)	21 (19.8)
その他	8 (19.0)	8 (17.0)	3 (18.8)	0 (0.0)	19 (17.9)
不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
計	42	47	16	3	106

表4-8-11. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（「生活状況報告書」提出者）

障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（問 9）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	2 (2.0)	1 (0.6)	4 (5.1)	1 (3.2)	8 (2.1)
認定調査は受けたが、非該当だった	1 (1.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.5)
認定は受けていない	49 (49.5)	102 (56.7)	51 (65.4)	21 (67.7)	223 (57.5)
わからない	47 (47.5)	76 (42.2)	23 (29.5)	9 (29.0)	155 (39.9)
不明（無回答）	0 -	2 -	0 -	1 -	3 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-12. 障害福祉サービスの利用状況（「生活状況報告書」提出者）

障害福祉サービスの利用（問 10）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
利用している	4 (4.1)	5 (2.8)	6 (7.7)	2 (6.5)	17 (4.4)
訪問系サービス （居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援）	1 [1.0]	2 [1.1]	5 [6.4]	1 [3.2]	9 [2.3]
就労支援系サービス	2 [2.0]	1 [0.6]	0 [0.0]	0 [0.0]	3 [0.8]
訓練系サービス	0 [0.0]	1 [0.6]	1 [1.3]	0 [0.0]	2 [0.5]
その他日中活動サービス	0 [0.0]	1 [0.6]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.3]
障害者のグループホーム・ケアホーム	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
入所施設	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
指定相談支援	0 [0.0]	1 [0.6]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.3]
その他	2 [2.0]	1 [0.6]	2 [2.6]	1 [3.2]	6 [1.6]
わからない	0 [0.0]	1 [0.6]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.3]
利用していない	94 (95.9)	174 (97.2)	72 (92.3)	29 (93.5)	369 (95.6)
不明	1 -	3 -	0 -	1 -	5 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-13. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（「生活状況報告書」提出者）

介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（問 11）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	0 (0.0)	6 (3.3)	1 (1.3)	3 (9.7)	10 (2.6)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)
認定は受けていない	85 (86.7)	149 (82.3)	69 (89.6)	28 (90.3)	331 (85.5)
わからない	13 (13.3)	25 (13.8)	7 (9.1)	0 (0.0)	45 (11.6)
不明（無回答）	1 -	1 -	1 -	1 -	4 -
計	99	182	78	32	391

表4-8-14. 生活意識（「生活状況報告書」提出者）

現在の暮らしの状況 (問 12)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
苦しい	44 (44.4)	94 (52.5)	32 (41.0)	19 (61.3)	189 (48.8)
大変苦しい	7 [7.1]	31 [17.3]	14 [17.9]	5 [16.1]	57 [14.7]
やや苦しい	37 [37.4]	63 [35.2]	18 [23.1]	14 [45.2]	132 [34.1]
普通	47 (47.5)	77 (43.0)	37 (47.4)	11 (35.5)	172 (44.4)
ゆとりがある	8 (8.1)	8 (4.5)	9 (11.5)	1 (3.2)	26 (6.7)
ややゆとりがある	5 [5.1]	7 [3.9]	5 [6.4]	1 [3.2]	18 [4.7]
大変ゆとりがある	3 [3.0]	1 [0.6]	4 [5.1]	0 [0.0]	8 [2.1]
不明	0 —	3 —	0 —	1 —	4 —
計	99	182	78	32	391

表4-8-15. 所得金額（「生活状況報告書」提出者）

昨年のおおよその年間所得総額 (問 13)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
200 万円未満	15 (19.2)	41 (29.3)	15 (24.6)	11 (40.7)	82 (26.8)
200～400 万円未満	32 (41.0)	54 (38.6)	20 (32.8)	10 (37.0)	116 (37.9)
400～600 万円未満	21 (26.9)	25 (17.9)	13 (21.3)	2 (7.4)	61 (19.9)
600～800 万円未満	5 (6.4)	10 (7.1)	8 (13.1)	3 (11.1)	26 (8.5)
800～1000 万円未満	5 (6.4)	6 (4.3)	1 (1.6)	1 (3.7)	13 (4.2)
1000 万円以上	0 (0.0)	4 (2.9)	4 (6.6)	0 (0.0)	8 (2.6)
わからない	10 —	25 —	6 —	4 —	45 —
不明（未回答）	11 —	17 —	11 —	1 —	40 —
計	99	182	78	32	391

表 4-8-16. 自由記載欄の記入の有無（「生活状況報告書」提出者）

自由記載欄の記入の有無 (問 1 4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
記載あり	63 (63.6)	122 (67.0)	61 (78.2)	26 (81.3)	272 (69.6)
健康、医療、福祉に関すること	52 (52.5)	108 (59.3)	57 (73.1)	21 (65.6)	238 (60.9)
日常生活、仕事、収入に関すること	53 (53.5)	101 (55.5)	45 (57.7)	18 (56.3)	217 (55.5)
その他のこと	23 (23.2)	53 (29.1)	26 (33.3)	10 (31.3)	112 (28.6)
記載なし	36 (36.4)	60 (33.0)	17 (21.8)	6 (18.8)	119 (30.4)
計	99	182	78	32	391

第Ⅲ部 エイズ発症者調査

第5章 目的と方法、結果の概要

第6章 集計方法

第7章 結果表

1. 臨床・治療状況
2. 生活状況

第5章 目的と方法、結果の概要

HIV感染者における治療の長期化に伴う生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために、前年度に続いて、平成28年度に「エイズ発症者調査」が実施された。平成28年度に発症者健康管理手当を受給されたエイズ発症者110人に対して、同年7月に調査への協力が依頼され、健康状態報告書は72人（回収率65%）から、生活状況報告書は71人（65%）から回収された。健康状態報告書の回収者は男性が66人と女性が6人で、30～39歳が14人、40～49歳が17人、50～59歳が29人、60歳以上が12人であった。

臨床・治療状況の結果をみると、CD4値は500／ μ l以上が46%、350～500未満が29%、200～350未満が14%、200未満が11%であった。HIV-RNA量は50未満（検出限界50以下）が96%であり、一方、10,000以上が1%であった。抗HIV薬の併用区分は「INSTI」（インテグラーゼ阻害薬を含む薬剤の組み合わせ）が74%と多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が11%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が7%、それ以外の投与状況が3%であった。

生活状況の結果をみると、日常生活への影響ありが75%、こころの状態に重い問題の可能性ありが22%であった。就業状況は仕事ありが44%、失業・求職中が32%であった。所得金額は400万円以上が21%、生活意識は苦しいが56%であった。障害者手帳は取得ありが89%、障害福祉サービスは利用ありが15%であった。現在の困り事・将来の不安・支援の希望等の自由回答において、健康・医療・福祉に関する記載ありが63%、日常生活・仕事・収入に関する記載ありが63%、その他の記載ありが30%であった。本調査結果では日常生活への影響ありとこころの状態に重い問題の可能性ありが著しく多く、一方、仕事ありと所得金額400万円以上が著しく少なかった。

上記の結果からみると、エイズ発症者では、適切な抗HIV治療を受け、CD4値とHIV-RNA量が良好に管理されている者が比較的多い傾向であった。一方、健康・医療・福祉、日常生活・仕事・収入などの多くの面で、問題を有する者が少なくない傾向であった。今後、本調査結果の詳細な分析を行うとともに、エイズ発症者の臨床・治療と生活の状況を継続的に把握することが重要と考えられる。

第6章 集計方法

集計の対象者としては、調査票の回収者全員であり、健康状態報告書が72人、生活状況報告書が71人であった。

集計の基礎資料としては、回収された調査票を用いた。調査票には「健康状態報告書」と「生活状況報告書」がある。健康状態報告書は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究 健康状態報告書」と同一の内容であり、過去1年間の四半期ごとの臨床・治療状況を医師が記載する。生活状況報告書は生活状況を調査対象者本人が記載する。両調査票を「第Ⅳ部 資料」に添付した。

集計方法としては、各調査項目の回答状況を記述するため、単純集計を基本とした。健康状態報告書では、より新しい時期の記載内容を用いた。集計項目としては、臨床・治療状況ではCD4値、HIV-RNA、抗HIV治療などを、生活状況では日常生活への影響、こころの状態、就業状況、所得金額、生活意識、障害者手帳の取得、障害福祉サービスの利用などの全調査項目を用いた。集計表の形式としては、「第Ⅱ部 集計方法、結果表」に準じたものとした。

第7章 結果表

1. 臨床・治療状況

本節では、以下の表を示した。

表7-1-1. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-2. CD4値別、HIV-RNA量 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-3. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-4. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-5. 抗HIV薬の併用区分別、副作用 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-6. 抗HIV薬の併用薬剤 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-7. 疾患の有無 (「エイズ発症者調査」)

表7-1-1. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（「エイズ発症者調査」）

		人数	(%)			人数	(%)
性別	男	66	(91.7)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	1	(1.5)
	女	6	(8.3)		0.10～0.50 未満	13	(19.1)
	計	72			0.50～1.00 未満	42	(61.8)
年齢	0～10 歳未満	0	(0.0)		1.00～1.50 未満	9	(13.2)
	10～20 歳未満	0	(0.0)		1.50 以上	3	(4.4)
	20～30 歳未満	0	(0.0)		不明	4	—
	30～40 歳未満	14	(19.4)		計	72	
	40～50 歳未満	17	(23.6)		平均値 0.737 (標準偏差 0.341)		
	50～60 歳未満	29	(40.3)		中央値 0.670		
	60 歳以上	12	(16.7)	HIV-RNA 量	検出せず	40	(56.3)
	計	72			50 未満*	28	(39.4)
	平均値 50.1 歳 (標準偏差 9.9 歳)				50～400 未満	2	(2.8)
中央値 50.0 歳			400～1000 未満		0	(0.0)	
CD4 値	～200 未満	8	(11.4)		1000～5000 未満	0	(0.0)
	200～350 未満	10	(14.3)		5000～10000 未満	0	(0.0)
	350～500 未満	20	(28.6)		10000～50000 未満	1	(1.4)
	500 以上	32	(45.7)		50000 以上	0	(0.0)
	不明	2	—		不明	1	—
	計	72			計	72	
	平均値 486.4 (標準偏差 257.9)				中央値 検出せず		
中央値 470.0							

(): 計より不明を除いた数を分母とする％
 * : 検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表7-1-2. CD4値別、HIV-RNA量（「エイズ発症者調査」）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満†	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	7 (87.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0	8
200～350未満	9 (90.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	10
350～500未満	20 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	20
500以上	31 (96.9)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	32
不明	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1	2
計	68 (95.8)	2 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	1	72

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％
 * : 検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む
 † : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表7-1-3. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（「エイズ発症者調査」）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分							計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	INSTI	その他	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	6 (85.7)	0 (0.0)	0	7
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	7 (87.5)	0 (0.0)	0	8
200 ～350未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (33.3)	0 (0.0)	6 (66.7)	0 (0.0)	0	9
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	7 (70.0)	0 (0.0)	0	10
350 ～500未満	50 未満*	1 (5.0)	0 (0.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	14 (70.0)	1 (5.0)	0	20
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	1 (5.0)	0 (0.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	14 (70.0)	1 (5.0)	0	20
500以上	50 未満*	3 (9.7)	0 (0.0)	2 (6.5)	2 (6.5)	23 (74.2)	1 (3.2)	0	31
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	3 (9.4)	0 (0.0)	2 (6.3)	2 (6.3)	24 (75.0)	1 (3.1)	0	32
不明	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2	4
計	50 未満*	4 (5.9)	0 (0.0)	8 (11.8)	5 (7.4)	49 (72.1)	2 (2.9)	0	68
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	2 —	0 —	0	2
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	計	4 (5.6)	0 (0.0)	8 (11.1)	5 (6.9)	53 (73.6)	2 (2.8)	0	72

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表7-1-4. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（「エイズ発症者調査」）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
NRTI 2剤+NNRTI	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
INSTI	48 (92.3)	2 (3.8)	0 (0.0)	1 (1.9)	1 (1.9)	1	53
その他	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
計	63 (94.0)	2 (3.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	1	68

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表7-1-5. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（「エイズ発症者調査」）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	2 (25.0)	6 (75.0)	0	8
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	5 (100.0)	0	5
INSTI	10 (20.0)	40 (80.0)	3	53
その他	0 (0.0)	1 (100.0)	1	2
計	12 (18.8)	52 (81.3)	4	68

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	3 (6.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	4 (6.3)	2 (3.1)	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
INSTI	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	6 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	6 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)

(): 投与者数より不明を除いた数にしめる%

表7-1-6. 抗HIV薬の併用薬剤（「エイズ発症者調査」）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	INSTI (続き)	件数
3TC+ABC +RTV+DRV (エブジコム服用 2 例)	2 (25.0)	RTV+DRV +DTG	2 (3.8)
3TC+ABC +RTV+LPV (エブジコム服用 1 例)	2 (25.0)	RTV+DRV +RAL	2 (3.8)
TDF+FTC +RTV+ATV (ツルバダ服用 2 例)	2 (25.0)	TDF+FTC +EVG+COBI (スタリビルド)	2 (3.8)
3TC+ABC +RTV+ATV (エブジコム服用 1 例)	1 (12.5)	TDF+FTC +RTV+DRV +DTG (ツルバダ服用 2 例)	2 (3.8)
TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 1 例)	1 (12.5)	3TC+ABC +DTG +MVC (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
計 (5 通り)	8 (100.0)	3TC+ABC +RPV +RAL (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
NRTI 2 剤+NNRTI	件数	ABC +RTV+FPV +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +EFV	2 (40.0)	ABC+TDF +DTG	1 (1.9)
3TC+ABC +NVP		AZT+3TC+ABC +EFV +DTG (エブジコム服用 1 例)	1 (1.9)
3TC+TDF +EFV	1 (20.0)	ETR +RAL	1 (1.9)
TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 1 例)	1 (20.0)	RTV+DRV +ETR +DTG	1 (1.9)
TDF+FTC +ETR (ツルバダ服用 1 例)	1 (20.0)	RTV+DRV +ETR +RAL	1 (1.9)
計 (5 通り)	5 (100.0)	RTV+DRV +RAL +MVC	1 (1.9)
INSTI	件数	RTV+DRV +RPV +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +RAL (エブジコム服用 7 例)	8 (15.1)	RTV+LPV +RAL	1 (1.9)
TDF+FTC +RAL (ツルバダ服用 6 例)	6 (11.3)	TDF+FTC +ETR +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.9)
3TC+ABC +DTG (エブジコム服用 5 例)	5 (9.4)	TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.9)
TDF+FTC +DTG (ツルバダ服用 4 例)	4 (7.5)	TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.9)
RPV +DTG	3 (5.7)	d4T+ABC +RAL	1 (1.9)
3TC+ABC +ETR +RAL (エブジコム服用 2 例)	2 (3.8)	計 (26 通り)	53 (100.0)
ABC +EFV +RAL	2 (3.8)	その他	件数
(右上へ続く)		AZT+3TC+ABC +EFV (コンビビル服用 1 例)	1 (50.0)
		AZT+TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 1 例)	1 (50.0)
		計 (2 通り)	2 (100.0)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表7-1-7. 疾患の有無（「エイズ発症者調査」）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	7 (10.0)	63 (90.0)	2	72
（内訳） 脳出血	5 (7.1)			
脳梗塞	0 (0.0)			
その他の脳血管疾患	2 (2.9)			
虚血性心疾患	1 (1.4)	70 (98.6)	1	72
（内訳） 心筋梗塞	0 (0.0)			
その他の虚血性心疾患	1 (1.4)			
肝以外の悪性新生物	7 (9.9)	64 (90.1)	1	72
高血圧・糖尿病	23 (33.3)	46 (66.7)	3	72
（内訳） 高血圧	20 (29.0)			
糖尿病	5 (7.2)			

2. 生活状況

本節では、以下の表を示した。

表7-2-1.	住居の種類	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-2.	世帯人員数	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-3.	就業状況	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-4.	日常生活への影響	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-5.	健康意識	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-6.	こころの状態	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-7.	通院頻度	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-8.	通院に掛かる時間	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-9.	障害者手帳の取得状況	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-10.	障害者手帳を取得していない理由	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-11.	障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-12.	障害福祉サービスの利用状況	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-13.	介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-14.	生活意識	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-15.	所得金額	(「エイズ発症者調査」)
表7-2-16.	自由記載欄の記入の有無	(「エイズ発症者調査」)

表7-2-1. 住居の種類（「エイズ発症者調査」）

現在の住まい (問1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等）	14 (100.0)	15 (88.2)	28 (100.0)	12 (100.0)	69 (97.2)
病院・診療所に入院中	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)
社会福祉施設等に入所中	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-2. 世帯人員数（「エイズ発症者調査」）

世帯人員数 (問2)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 人	5 (35.7)	1 (6.7)	9 (34.6)	5 (41.7)	20 (29.9)
2 人	3 (21.4)	3 (20.0)	10 (38.5)	6 (50.0)	22 (32.8)
3 人	3 (21.4)	5 (33.3)	5 (19.2)	1 (8.3)	14 (20.9)
4 人	2 (14.3)	5 (33.3)	2 (7.7)	0 (0.0)	9 (13.4)
5 人	1 (7.1)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.0)
不明	0 —	2 —	2 —	0 —	4 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-3. 就業状況（「エイズ発症者調査」）

過去 1 か月間の仕事の状況 (問3)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
仕事あり	8 (57.1)	7 (41.2)	12 (42.9)	4 (33.3)	31 (43.7)
主に仕事をしている	7 [50.0]	7 [41.2]	5 [17.9]	2 [16.7]	21 [29.6]
主に家事で仕事あり	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [3.6]	0 [0.0]	1 [1.4]
主に通学で仕事あり	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
仕事あり（上記以外）	1 [7.1]	0 [0.0]	6 [21.4]	2 [16.7]	9 [12.7]
仕事なし	6 (42.9)	10 (58.8)	16 (57.1)	8 (66.7)	40 (56.3)
失業・求職中	6 [42.9]	6 [35.3]	10 [35.7]	1 [8.3]	23 [32.4]
家事（専業）	0 [0.0]	0 [0.0]	2 [7.1]	3 [25.0]	5 [7.0]
その他	0 [0.0]	4 [23.5]	4 [14.3]	4 [33.3]	12 [16.9]
不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-4. 日常生活への影響（「エイズ発症者調査」）

日常生活への影響 (問4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
ある	10 (76.9)	13 (81.3)	20 (74.1)	7 (63.6)	50 (74.6)
通常時に影響がある	6 [46.2]	8 [61.5]	15 [55.6]	6 [54.5]	35 [52.2]
血友病による出血時に影響がある	9 [69.2]	10 [76.9]	18 [66.7]	7 [63.6]	44 [65.7]
それ以外の時に影響がある	0 [0.0]	1 [7.7]	6 [22.2]	0 [0.0]	7 [10.4]
ない	3 (23.1)	3 (18.8)	7 (25.9)	4 (36.4)	17 (25.4)
不明	1 —	1 —	1 —	1 —	4 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-5. 健康意識（「エイズ発症者調査」）

現在の健康状態 (問5)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
よい	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)
まあよい	1 (7.1)	1 (5.9)	3 (11.1)	3 (27.3)	8 (11.6)
ふつう	8 (57.1)	6 (35.3)	12 (44.4)	3 (27.3)	29 (42.0)
あまりよくない	4 (28.6)	5 (29.4)	9 (33.3)	2 (18.2)	20 (29.0)
よくない	1 (7.1)	4 (23.5)	3 (11.1)	3 (27.3)	11 (15.9)
不明	0 —	0 —	1 —	1 —	2 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-6. こころの状態（「エイズ発症者調査」）

こころの状態 (K6 の合計点数) (問6)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
0～4 点	5 (35.7)	6 (35.3)	6 (23.1)	2 (18.2)	19 (27.9)
5～9 点	3 (21.4)	4 (23.5)	8 (30.8)	5 (45.5)	20 (29.4)
10～14 点	4 (28.6)	2 (11.8)	7 (26.9)	1 (9.1)	14 (20.6)
15 点～	2 (14.3)	5 (29.4)	5 (19.2)	3 (27.3)	15 (22.1)
不明	0 —	0 —	2 —	1 —	3 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-7. 通院頻度（「エイズ発症者調査」）

通院頻度 (問7-1)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 週間に 1 回以上	0 (0.0)	1 (5.9)	2 (7.4)	0 (0.0)	3 (4.3)
2 週間に 1 回以上	1 (7.1)	0 (0.0)	2 (7.4)	0 (0.0)	3 (4.3)
1 か月に 1 回以上	13 (92.9)	12 (70.6)	16 (59.3)	9 (75.0)	50 (71.4)
3 か月に 1 回以上	0 (0.0)	3 (17.6)	7 (25.9)	3 (25.0)	13 (18.6)
6 か月に 1 回以上	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)
それ以下	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
不明	0 —	0 —	1 —	0 —	1 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-8. 通院に掛かる時間（「エイズ発症者調査」）

通院に掛かる時間（片道） （問7-2）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
30分未満	3 (21.4)	7 (41.2)	5 (18.5)	1 (8.3)	16 (22.9)
1時間未満	6 (42.9)	2 (11.8)	13 (48.1)	3 (25.0)	24 (34.3)
2時間未満	4 (28.6)	8 (47.1)	4 (14.8)	7 (58.3)	23 (32.9)
3時間未満	1 (7.1)	0 (0.0)	3 (11.1)	0 (0.0)	4 (5.7)
3時間以上	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (7.4)	1 (8.3)	3 (4.3)
不明	0 —	0 —	1 —	0 —	1 —
7計	14	17	28	12	71

表7-2-9. 障害者手帳の取得状況（「エイズ発症者調査」）

障害者手帳の取得状況 （問8）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
取得している	11 (84.6)	9 (90.0)	20 (95.2)	10 (83.3)	50 (89.3)
身体障害者手帳	11 [84.6]	9 [90.0]	20 [95.2]	10 [83.3]	50 [89.3]
療育手帳 （愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）	0 [0.0]	1 [10.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [1.8]
精神障害者保健福祉手帳	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
取得していない	2 (15.4)	1 (10.0)	1 (4.8)	2 (16.7)	6 (10.7)
不明	1 —	7 —	7 —	0 —	15 —
計	14	17	28	12	71

表7-2-10. 障害者手帳を取得していない理由（「エイズ発症者調査」）

障害者手帳を取得していない理由 （問8-1）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)
手帳の制度や取得の手続きが わからない	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	2 (33.3)
とくに手帳がなくても困らない	2 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	4 (66.7)
手帳を持ちたくない	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
不明	0 —	0 —	0 —	1 —	0 —
計	2	1	1	2	6

表7-2-11. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（「エイズ発症者調査」）

障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（問9）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	0 (0.0)	5 (29.4)	2 (7.4)	1 (12.5)	8 (12.1)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
認定は受けていない	5 (35.7)	5 (29.4)	14 (51.9)	3 (37.5)	27 (40.9)
わからない	9 (64.3)	7 (41.2)	11 (40.7)	4 (50.0)	31 (47.0)
不明（無回答）	0 -	0 -	1 -	4 -	5 -
計	14	17	28	12	71

表7-2-12. 障害福祉サービスの利用状況（「エイズ発症者調査」）

障害福祉サービスの利用（問10）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
利用している	1 (7.1)	5 (29.4)	2 (7.4)	2 (18.2)	10 (14.5)
訪問系サービス （居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援）	0 [0.0]	3 [17.6]	2 [7.4]	0 [0.0]	5 [7.2]
就労支援系サービス	1 [7.1]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [1.4]
訓練系サービス	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
その他日中活動サービス	0 [0.0]	1 [5.9]	0 [0.0]	1 [9.1]	2 [2.9]
障害者のグループホーム・ケアホーム	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
入所施設	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
指定相談支援	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
その他	0 [0.0]	1 [5.9]	0 [0.0]	1 [9.1]	2 [2.9]
わからない	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [3.7]	1 [9.1]	2 [2.9]
利用していない	13 (92.9)	12 (70.6)	25 (92.6)	9 (81.8)	59 (85.5)
不明	0 -	0 -	1 -	1 -	2 -
計	14	17	28	12	71

表7-2-13. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（「エイズ発症者調査」）

介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（問11）	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	0 (0.0)	4 (23.5)	1 (3.7)	2 (16.7)	7 (10.0)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
認定は受けていない	10 (71.4)	11 (64.7)	22 (81.5)	9 (75.0)	52 (74.3)
わからない	4 (28.6)	2 (11.8)	4 (14.8)	1 (8.3)	11 (15.7)
不明（無回答）	0 -	0 -	1 -	0 -	1 -
計	14	17	28	12	71

表7-2-14. 生活意識（「エイズ発症者調査」）

現在の暮らしの状況 (問 12)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
苦しい	7 (50.0)	10 (71.4)	16 (57.1)	7 (58.3)	40 (56.3)
大変苦しい	3 [21.4]	3 [21.4]	6 [21.4]	3 [25.0]	15 [21.1]
やや苦しい	4 [28.6]	7 [50.0]	10 [35.7]	4 [33.3]	25 [35.2]
普通	7 (50.0)	7 (50.0)	11 (39.3)	4 (33.3)	29 (40.8)
ゆとりがある	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.6)	1 (8.3)	2 (2.8)
ややゆとりがある	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [3.6]	1 [8.3]	2 [2.8]
大変ゆとりがある	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
不明	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
計	14	14	28	12	71

表7-2-15. 所得金額（「エイズ発症者調査」）

昨年のおおよその年間所得総額 (問 13)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
200 万円未満	3 (30.0)	5 (35.7)	12 (48.0)	5 (55.6)	25 (43.1)
200～400 万円未満	4 (40.0)	4 (28.6)	10 (40.0)	3 (33.3)	21 (36.2)
400～600 万円未満	3 (30.0)	3 (21.4)	2 (8.0)	1 (11.1)	9 (15.5)
600～800 万円未満	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)
800～1000 万円未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1000 万円以上	0 (0.0)	1 (7.1)	1 (4.0)	0 (0.0)	2 (3.4)
わからない	4 -	2 -	1 -	1 -	8 -
不明（未回答）	0 -	1 -	2 -	2 -	5 -
計	14	17	28	12	71

表 7-2-16. 自由記載欄の記入の有無（「エイズ発症者調査」）

自由記載欄の記入の有無 (問 1 4)	年齢				合計
	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
記載あり	9 (64.3)	12 (70.6)	22 (78.6)	9 (75.0)	52 (73.2)
健康、医療、福祉に関すること	7 [50.0]	11 [64.7]	18 [64.3]	9 [75.0]	45 [63.4]
日常生活、仕事、収入に関すること	8 [57.1]	8 [47.1]	22 [78.6]	7 [58.3]	45 [63.4]
その他のこと	3 [21.4]	6 [35.3]	9 [32.1]	3 [25.0]	21 [29.6]
記載なし	5 (35.7)	5 (29.4)	6 (21.4)	3 (25.0)	19 (26.8)
計	14	17	28	12	71

第Ⅳ部 資料

1. 健康状態報告書
2. 日常報告書
3. 生活状況報告書
4. 健康状態報告書（エイズ発症者調査）
5. 生活状況報告書（エイズ発症者調査）

1. 健康状態報告書

2015年

様式2-2

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が担当医師に当該年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の報告書（様式3）**とともに3月1日から10日までの間に提出して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願い致します。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分（Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月）、Ⅲ期（10～12月）、Ⅳ期（1～3月））記入して下さい。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック（✓）を入れ、（ ）には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載して下さい。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称						
住 所（〒 - ）						
電話番号 （ - - ）						
医師氏名 （診療科名						印 ）
備 考						

{ 1/4 }

A. 基礎疾患と肝炎等の状況				
基 礎 疾 患	☐ 血友病A ☐ 血友病B ☐ von Willebrand病 ☐ 二次感染 ☐ 三次感染 ☐ その他 ()			
肝炎等の有無	☐ 無し ☐ 慢性肝炎 ☐ 肝硬変 ☐ 肝臓 ☐ その他 ()			
HBs- 抗 原	☐ + ☐ - ☐ 不明	HCV-抗体	☐ + ☐ - ☐ 不明	
H C V - R N A	定量: ☐ TaqMan法 [() Log IU/mL ☐ 検出せず] ☐ RT-PCR法() $\times 10^3$ IU/mL ☐ 未検査			
血 小 板 数	() $\times 10^4$ /mm ³ ☐ 未検査	A F P	()ng-mL ☐ 未検査	
T.bil	()mg/dL ☐ 未検査	クレアチニン	()mg/dL ☐ 未検査	
ALT (GPT)	()IU/L ☐ 未検査	インターフェロン製剤 での治療歴 (リバビリンの併用の有無)	☐ 有 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 無	
アルブミン	()g/dL ☐ 未検査			
プロトロンビン	PT活性%()% ☐ 未検査	肝 移 植 歴	☐ 有 ☐ 無	
脳 血 管 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 脳出血 ☐ 脳梗塞 ☐ その他の脳血管疾患			
虚 血 性 心 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 心筋梗塞 ☐ その他の虚血性心疾患			
悪性新生物(肝以外)の有無	☐ 無し ☐ 肝臓以外の悪性新生物 (部位:)			
そ の 他 の 疾 患 の 有 無	☐ 無し ☐ 高血圧 ☐ 糖尿病 ☐ その他 ()			

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・AFP値・クレアチニン値については、単位にご注意のうえ () に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

B. 検査の実施状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
検査実施年月日	(2015/ /)	(2015/ /)	(2015/ /)	(2016/ /)
期間中の診察の有無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無
期間中のCD4値検査の有無	☐ 未検査	☐ 未検査	☐ 未検査	☐ 未検査
CD4値 (/μL)	()	()	()	()
CD4/CD8比	()	()	()	()
期間中のHIV-RNA量検査の有無	☐ 未検査	☐ 未検査	☐ 未検査	☐ 未検査
HIV-RNA量の検査法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法	☐ RT-PCR法 ☐ TaqMan法
HIV-RNA量	()	()	()	()
*単位は「コピー/mL」でご記入下さい (例: $4.3 \times 10^3 \rightarrow 4300$ コピー/mL)。	コピー/mL	コピー/mL	コピー/mL	コピー/mL
*検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入下さい。	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)	☐ 検出限界未満 ()コピー/mL未満 ☐ 検出せず (TaqMan法のみ)

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. ジドブジン・ラミブジン[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. テノホビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. アバカビル・ラミブジン[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. テノホビル・エムトリシタビン[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. デラビルジン [DLV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. リルピビルン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. インジナビル [IDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. ロピナビル・リトナビル[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・ テノホビル [EVG・COBI・FTC・TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
27. ドルテグラビル [DTG]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（✓）をし、記入例のように服薬状況を **5段階** から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、1～27以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の（ ）に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	☒	(1)	(②)	(3)
				(4)
				(5)

D. インターフェロン製剤等の投与状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
2. リバビリン	☐	☐	☐	☐
3. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
4. シメプレビル	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（✓）をし、インターフェロン製剤等の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

E. 副作用の発現状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他1 ()	☐	☐	☐	☐
その他2 ()	☐	☐	☐	☐
その他3 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（✓）して下さい。副作用の無かった場合は、「0.なし」にチェック（✓）して下さい。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入下さい。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. アトパコン	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（✓）して下さい。投与が無かった場合は、「0.実施していない」をチェック（✓）して下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

G. 眼底検査実施の有無	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（✓）して下さい。

2. 日常報告書

2015年

様式3

日常報告書

(本人記入用)

					個人番号	-0
氏名		男・女	身長	cm	生年月日	年 月 日
I 期	4月～6月分	平成 27 年 6 月 末日現在			体 重	kg

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1 2 3 4 5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1 2 3 4 5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1 2 3 4 5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

〔1/4〕

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ○で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅱ期	7月～9月分	平成 27 年 9月 末日現在	体 重	kg
----	--------	-----------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1	どちらとも言えない 2	全くない 3	4	5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても乾きやすい 3	4	5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1	どちらとも言えない 2	とても減りやすい 3	4	5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても息切れしやすい 3	4	5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1	どちらとも言えない 2	とても疲れやすい 3	4	5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものがでることがありますか。	全くない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1	どちらとも言えない 2	とてもある 3	4	5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1	どちらとも言えない 2	全く眠れない 3	4	5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

{2/4}

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ〇で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

Ⅲ期	10月～12月分	平成 27 年 12月 末日現在	体 重	kg
----	----------	------------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ〇で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても乾きやすい 1 2 3 4 5
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
5) 下痢をすることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない どちらとも言えない とても減りやすい 1 2 3 4 5
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても息切れしやすい 1 2 3 4 5
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない どちらとも言えない とても疲れやすい 1 2 3 4 5
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない どちらとも言えない とてもある 1 2 3 4 5
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる どちらとも言えない 全く眠れない 1 2 3 4 5

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ〇で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

[3/4]

Ⅳ期	1月～3月分	平成 28 年 月 日現在	体 重	kg
----	--------	---------------	-----	----

A. 身体状況 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

1) 食欲はありますか。	とてもある 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全くない
2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
3) 口が乾きやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても乾きやすい
4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
5) 下痢をすることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
6) 体重が減りやすいですか。	全く減らない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても減りやすい
7) 息切れしやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても息切れしやすい
8) 疲れやすいですか。	全くそうでない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とても疲れやすい
9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
10) 37℃以上の熱がでることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。	全くない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。	全くしない 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	とてもある
13) よく眠れますか。	とてもよく眠れる 1 2 3 4 5	どちらとも言えない	全く眠れない

B. 日常生活動作 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

備 考（日常生活で特に不自由な点、健康上留意しておられることなど有りましたらご記入下さい。）

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）：TEL — —

※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式5）を速やかに提出して下さいようお願い致します。

[4/4]

3. 生活状況報告書

2015年－調

生 活 状 況 報 告 書

(本人記入用)

		個人番号	-0
氏名		記入日	年 月 日現在

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が今年度の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書（様式2－2）と本人記入の日常報告書（様式3）とともに3月1日から10日までの間に提出してください。**
2. 今年度は本報告書以外の医師記入の健康状態報告書と本人記入の日常報告書のご提出があれば、次年度事業は継続認定されます。次々年度以降は本報告書の提出がなければ継続認定されません。今年度は本報告書の提出にご協力くださいますようよろしくお願いします。
3. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には、その時点での提出をお願いします。
4. あなたの日常生活の状態について、問1～問14の回答方法に応じて、最も良く当てはまるとと思われる状態の数字を○で囲むか、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなた現在の住まいはどこですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等） | 3. 社会福祉施設等に入居中 |
| 2. 病院・診療所に入院中 | 4. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、**あなたを含めて**何人ですか。（一時的に不在の方を含みます。）

人 ➡ 2人以上 と答えた方に伺います。

問2－1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|------------|---------|
| 1. 配偶者 | 3. 子ども（成人） | 5. 兄弟姉妹 |
| 2. 子ども（未成年） | 4. 父母 | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 失業・求職中 |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 家事（専業） |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. その他（ ） |
| 4. 仕事あり（1～3以外） | |

※収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4（仕事あり）、まったく仕事をしなかった方は5～7（仕事なし）の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4（仕事あり）とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7（仕事なし）とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

〔1/4〕

問4 あなたは**現在**、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。

1. ある 2. ない → 問5へ

1. ある と答えた方に伺います。

問4-1 それはどのようなことに影響がありますか。**あてはまるすべての番号**に○をつけてください。

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. 日常生活動作（起床、衣服着脱、食事、入浴など） | 4. 運動（スポーツを含む） |
| 2. 外出（時間や作業量などが制限される） | 5. その他 |
| 3. 仕事、家事、学業（時間や作業量などが制限される） | |

問4-2 日常生活に影響があるのはどのようなときですか。**あてはまるすべての番号**に○をつけてください。

- | |
|------------------------------|
| 1. 通常時に影響がある |
| 2. 血友病による出血時に影響がある |
| 3. それ以外のときに影響がある（具体的に：_____） |

問5 あなたの現在の健康状態はいかがですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | | | |
|-------|---------|--------|------------|---------|
| 1. よい | 2. まあよい | 3. ふつう | 4. あまりよくない | 5. よくない |
|-------|---------|--------|------------|---------|

問6 次の（ア）から（カ）の質問について、**過去1か月**の間はどのようであったか、6つの項目それぞれの**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない
（ア）神経過敏に感じましたか	1	2	3	4	5
（イ）絶望的だと感じましたか	1	2	3	4	5
（ウ）そわそわ、落ち着かなく感じましたか	1	2	3	4	5
（エ）気分が沈み込んで、何が起ころうとも気が 晴れないように感じましたか	1	2	3	4	5
（オ）何をするのも骨折りだと感じましたか	1	2	3	4	5
（カ）自分は価値のない人間だと感じましたか	1	2	3	4	5

問7 主としてHIV感染に関する治療を受けるために通院している病院・診療所について伺います。

問7-1 通院頻度はどのくらいですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. 1週間に1回以上 | 3. 1か月に1回以上 | 5. 6か月に1回以上 |
| 2. 2週間に1回以上 | 4. 3か月に1回以上 | 6. それ以下 |

問7-2 通院にかかる時間（片道）はどのくらいですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. 30分未満 | 3. 2時間未満 | 5. 3時間以上 |
| 2. 1時間未満 | 4. 3時間未満 | |

問8 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 身体障害者手帳
2. 療育手帳（愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）
3. 精神障害者保健福祉手帳
4. 取得していない

等級に○をつけてください。

- | | |
|-------|-------|
| ア. 1級 | エ. 4級 |
| イ. 2級 | オ. 5級 |
| ウ. 3級 | カ. 6級 |

種別に○をつけてください。

- | |
|-----------|
| ア. 肢体不自由 |
| イ. 免疫機能障害 |
| ウ. その他 |

4. 取得していない と答えた方に伺います。

問8-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない
2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない
3. とくに手帳がなくても困らない
4. 手帳を持ちたくない
5. その他

問9 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 認定を受けている
2. 認定調査は受けたが、非該当だった
3. 認定を受けていない
4. わからない

区分に○をつけてください。

- | | |
|--------|--------|
| ア. 区分1 | エ. 区分4 |
| イ. 区分2 | オ. 区分5 |
| ウ. 区分3 | カ. 区分6 |

問10 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 利用している

2. 利用していない

問11へ

1. 利用している と答えた方に伺います。

問10-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援）
2. 就労支援系サービス
3. 訓練系サービス
4. その他日中活動サービス
5. 障害者のグループホーム・ケアホーム
6. 入所施設
7. 指定相談支援
8. その他
9. わからない

問11 あなたは介護保険法に基づく要介護（支援）認定を受けていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 認定を受けている | 3. 認定を受けていない |
| 2. 認定調査は受けたが、非該当だった | 4. わからない |

1. 認定を受けている と答えた方に伺います。

区分に○をつけてください。

- | | | |
|---------|---------|----------|
| ア. 要支援1 | ウ. 要介護1 | カ. 要介護4 |
| イ. 要支援2 | エ. 要介護2 | キ. 要介護5 |
| | オ. 要介護3 | ク. わからない |

現在、介護（予防）サービスを利用していますか。

- | |
|------------|
| 1. 利用している |
| 2. 利用していない |

問12 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 2. やや苦しい | 3. 普通 | 4. ややゆとりがある | 5. 大変ゆとりがある |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|

問13 差し支えなければ、あなたの世帯の昨年のおおよその年間所得総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 200万円未満 | 5. 800～1000万円未満 |
| 2. 200～400万円未満 | 6. 1000万円以上 |
| 3. 400～600万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800万円未満 | |

問14 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。

以下の項目に分けて、自由にお書きください。

あなたの健康、医療、福祉に関すること

日常生活、仕事、収入に関すること

その他のこと

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）TEL. _____
 ※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式第5号）を速やかに提出して下さい。お願い致します。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

〔4/4〕

4. 健康状態報告書（エイズ発症者調査）

2016年－健1

健康状態報告書

（医師記入用）

記入要領

- この報告書は、発症者健康管理手当の費用の受給者が担当医師に今年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の生活状況報告書とともに8月1日から31日までの間に提出してください。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出ください。**
- 現況届（様式第3号）のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら、治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかんがみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
- 担当医師が以下の4期分の調査対象期間の健康状態を記入してください。
2015年度調査対象期間〔Ⅲ期（10～12月／2015）、Ⅳ期（1～3月／2016）〕
2016年度調査対象期間〔Ⅰ期（4～6月／2016）、Ⅱ期（7～9月／2016）〕
- 各項目のあてはまる全ての口にチェック（✓）を入れ、（ ）には該当する事項を記入してください。
- その他参考になることがあれば、備考欄に記入してください。
- 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載してください。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称						
住 所（〒 ）						
電話番号 （ ）						
医師氏名 （診療科名						印 ）
備 考						

〔1/4〕

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・A F P値・P I V K A - II 値・クレアチニン値については、単位にご注意のうえ（ ）に測定値をご記入ください。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入ください。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	2015年度		2016年度	
	Ⅲ期（10～12月）	Ⅳ期（1～3月）	I 期（4～6月）	Ⅱ期（7～9月）
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. ジドブジン・ラミブジン配合剤[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. テノホビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. アバカビル・ラミブジン配合剤[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. テノホビル・エムトリシタビン配合剤[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. リルピビルン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. リルピビルン・テノホビル エムトリシタビン配合剤 [RPV・TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. ロピナビル・リトナビル配合剤[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・ テノホビル [EVG・COBI・FTC・TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. ドルテグラビル [DTG]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
27. ドルテグラビル・アバカビル・ ラミブジン配合剤[DTG・ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した薬剤の□にチェック（✓）をし、記入例のように服薬状況を5段階から選択してください。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をしてください。また、1～27以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の（ ）に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入ください。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	☒	(1)	(②)	(3)
				(4)
				(5)

[3/4]

D. C型肝炎治療薬の投与状況	2015年度		2016年度	
	Ⅲ期（10～12月）	Ⅳ期（1～3月）	Ⅰ期（4～6月）	Ⅱ期（7～9月）
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ソホスビル／レジパスビル配合剤	☐	☐	☐	☐
2. オムビタスビル／パリタプレビル／リトナビル配合剤	☐	☐	☐	☐
3. ダクラタスビル／アスナプレビル併用	☐	☐	☐	☐
4. ソホスビル／リバビリン併用	☐	☐	☐	☐
5. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
6. リバビリン	☐	☐	☐	☐
7. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
8. シメプレビル	☐	☐	☐	☐
9. パニプレビル				
その他（ ）	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与したC型肝炎治療薬の口をチェック（✓）をし、C型肝炎治療薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をしてください。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入ください。

E. 副作用の発現状況	2015年度		2016年度	
	Ⅲ期（10～12月）	Ⅳ期（1～3月）	Ⅰ期（4～6月）	Ⅱ期（7～9月）
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他（ ）	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（✓）してください。副作用の発現がない場合は、「0.なし」にチェック（✓）してください。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入ください。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	2015年度		2016年度	
	Ⅲ期（10～12月）	Ⅳ期（1～3月）	Ⅰ期（4～6月）	Ⅱ期（7～9月）
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. アトバコン	☐	☐	☐	☐
その他（ ）	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（✓）してください。ニューモシスチス肺炎予防薬の投与がない場合は、「0.実施していない」をチェック（✓）してください。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入ください。

G. 眼底検査実施の有無	2015年度		2016年度	
	Ⅲ期（10～12月）	Ⅳ期（1～3月）	Ⅰ期（4～6月）	Ⅱ期（7～9月）
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（✓）してください。

5. 生活状況報告書（エイズ発症者調査）

2016年－健2

生 活 状 況 報 告 書

(本人記入用)

		個人番号	-0
氏名		記入日	年 月 日現在

記入要領

1. この報告書は、発症者健康管理手当の受給者が今年度の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書とともに8月1日から31日までの間に提出**してください。
2. 現況届（様式第3号）のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら、治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかんがみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
3. あなたの日常生活の状態について、問1～問14の回答方法に応じて、最も良く当てはまると思われる状態の数字を○で囲むか、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなたの現在のお住まいはどこですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等） | 3. 社会福祉施設等に入居中 |
| 2. 病院・診療所に入院中 | 4. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、**あなたを含めて**何人ですか。（一時的に不在の方を含みます。）

	人
--	---

2人以上 と答えた方に伺います。

問2-1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|------------|---------|
| 1. 配偶者 | 3. 子ども（成人） | 5. 兄弟姉妹 |
| 2. 子ども（未成年） | 4. 父母 | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 失業・求職中 |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 家事（専業） |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. その他（ ） |
| 4. 仕事あり（1～3以外） | |

※収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4（仕事あり）、まったく仕事をしなかった方は5～7（仕事なし）の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4（仕事あり）とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7（仕事なし）とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

〔1/4〕

問8 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 身体障害者手帳 2. 療育手帳（愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳） 3. 精神障害者保健福祉手帳 4. 取得していない	等級に○をつけてください。 ア. 1級 エ. 4級 イ. 2級 オ. 5級 ウ. 3級 カ. 6級
4. 取得していない と答えた方に伺います。	種別に○をつけてください。 ア. 肢体不自由 イ. 免疫機能障害 ウ. その他

問8-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない 2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない 3. とくに手帳がなくても困らない 4. 手帳を持ちたくない 5. その他

問9 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか※。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 認定を受けている 2. 認定調査は受けたが、非該当だった 3. 認定を受けていない 4. わからない	区分に○をつけてください。 ア. 区分1 エ. 区分4 イ. 区分2 オ. 区分5 ウ. 区分3 カ. 区分6
--	---

※障害者（身体障害者手帳をお持ちの方等）は、市町村への申請により「障害福祉サービス受給者証」が交付され、その区分に応じた障害福祉サービスを受けることができます。

問10 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 利用している 2. 利用していない	問11へ
1. 利用している と答えた方に伺います。	

問10-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 訪問系サービス （居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援）	5. 障害者のグループホーム・ケアホーム 6. 入所施設
2. 就労支援系サービス	7. 指定相談支援
3. 訓練系サービス	8. その他
4. その他日中活動サービス	9. わからない

問11 あなたは介護保険法に基づく要介護（支援）認定を受けていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 認定を受けている | 3. 認定を受けていない |
| 2. 認定調査は受けたが、非該当だった | 4. わからない |

1. 認定を受けている と答えた方に伺います。

区分に○をつけてください。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ア. 要支援 1 | ウ. 要介護 1 | カ. 要介護 4 |
| イ. 要支援 2 | エ. 要介護 2 | キ. 要介護 5 |
| | オ. 要介護 3 | ク. わからない |

現在、介護（予防）サービスを利用していますか。

- | |
|------------|
| 1. 利用している |
| 2. 利用していない |

問12 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 2. やや苦しい | 3. 普通 | 4. ややゆとりがある | 5. 大変ゆとりがある |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|

問13 差し支えなければ、あなたの世帯の昨年のおおよその年間所得総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 200 万円未満 | 5. 800～1000 万円未満 |
| 2. 200～400 万円未満 | 6. 1000 万円以上 |
| 3. 400～600 万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800 万円未満 | |

問14 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。

以下の項目に分けて、自由にお書きください。

あなたの健康、医療、福祉に関すること

日常生活、仕事、収入に関すること

その他のこと

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）TEL. _____
 ※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式第4号）を速やかに提出して下さいようお願い致します。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

〔4/4〕

エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

平成 27・28 年度 報告書

発 行 日 平成 29 年 3 月 第 1 版

発 行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV 感染者の調査研究班 事務局
国立大阪医療センター 臨床研究センター 内
エイズ先端医療研究部 内
〒540-0006
大阪市中央区法円坂 2-1-14
TEL 06 - 6942 - 1331 FAX 06 - 6946 - 3652

編 集	班 長	国立大阪医療センター	白阪 琢磨
	班 員	国立国際医療研究センター	大金 美和
		国立国際医療研究センター	岡 慎一
		国立大阪医療センター	岡本 学
		藤田保健衛生大学	川戸美由紀
		藤田保健衛生大学	橋本 修二
		兵庫医科大学	日笠 聡
		東京医科大学	福武 勝幸
		国立長崎医療センター	八橋 弘

印刷・製本 ㈱太陽美術
